

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالئة (مستحضرات) - 1986

يُسَوِّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفاستيجمين لصقة دكسل 4.6 ملغ/24 ساعة

ريفاستيجمين لصقة دكسل 9.5 ملغ/24 ساعة

لصقة للاستعمال على الجلد (لصقة عبر الجلد)

تحتوي كل لصقة على:

ريفاستيجمين لصقة دكسل 4.6 ملغ/24 ساعة: لصقة مساحتها 4.6 سم² للإعطاء عن طريق الجلد وتحتوي على 6.9 ملغ من ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة إطلاق الدواء هي: 4.6 ملغ في 24 ساعة.

ريفاستيجمين لصقة دكسل 9.5 ملغ/24 ساعة: لصقة مساحتها 9.2 سم² للإعطاء عن طريق الجلد وتحتوي على 13.8 ملغ من ريفاستيجمين (Rivastigmine).

وتيرة إطلاق الدواء هي: 9.5 ملغ في 24 ساعة.

المواد غير الفعالة ومسيبات الأرجية في الدواء – انظر البند 6 "معلومات إضافية".

افراً النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج الخرف (مشاكل الذاكرة) الخفيف إلى المتوسط من نوع الألزهايمر.

الفصيلة العلاجية: مثبطات الأيزيم كولين إستيراز (anticholinesterases).

ينتمي ريفاستيجمين إلى فصيلة مواد تسمى مثبطات كولين إستيراز. تموت خلايا عصبية معينة في الدماغ لدى متلقي العلاج المصابين بالخرف (ديمينشيا) النافع من مرض الألزهايمر، وتؤدي إلى مستويات منخفضة من الناقل العصبي (نويروترانسميتر) أستيل كولين (مادة تمكّن الخلايا العصبية من التواصل فيما بينها). يعمل ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات التي تفكك أستيل كولين: أستيل كولين إستيراز ويوتيريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، ينتج **ريفاستيجمين لصقة دكسل** لمستويات أستيل كولين في الدماغ أن ترتفع، ويساهم في تقليل أعراض مرض الألزهايمر.

ريفاستيجمين لصقة دكسل مخصص لعلاج المرضى البالغين المصابين بالخرف الخفيف والمتوسط، وهو مرض تقدمي من اضطرابات في الدماغ يؤثر تدريجيًا على الذاكرة والقدرة الفكرية والسلوك.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (ريفاستيجمين) أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كان لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لدواء من نوع مشابه (مشتقات الكربامات - carbamate derivatives).
- كان لديك رد فعل جلدي انتشر إلى ما يجاوز مساحة اللصقة، إذا كان لديك رد فعل موضعي شديد (مثل الحوصصات، تزايد التهاب الجلد، الانتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال 48 ساعة بعد نزع اللصقة.
- إذا انطقت هذه الأعراض عليك، فيجب إعلام الطبيب ولا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل**.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بريفاستيجمين لصقة دكسل، أخبر الطبيب إذا:

- وُجدت لديك الآن أو كانت لديك في الماضي حالة قلبية، مثل نبض غير منتظم أو نبض بطيء، استئطالة المقطع QTc، سوابق عائلية من استئطالة المقطع QTc، اضطراب في النظم من نوع تسرع القلب البطيني (torsade de pointes)، أو أن لديك مستوى منخفضًا من البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم
- وُجدت لديك الآن أو كانت لديك في الماضي قرحة نشطة في المعدة
- وُجدت لديك الآن أو كانت لديك في الماضي صعوبات في التبول
- وُجدت لديك الآن أو كانت لديك في الماضي اختلاجات
- وُجد لديك الآن أو كان لديك في الماضي ربو أو مرض تنفسي خطير
- كنت تعاني من ارتفاع
- كان وزن جسمك منخفضًا
- وُجدت لديك ردود فعل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، التقيؤ والإسهال.
- قد تعاني من تجفاف (فقدان كبير جدًا للسوائل) إذا استمر التقيؤ أو الإسهال
- وُجد لديك خلل في وظيفة الكبد

في هذه الحالات، يُحتمل أن يتابع طبيبك وضعم بشكل أكثر كثبًا خلال فترة العلاج بالدواء.

إذا لم تستعمل **ريفاستيجمين لصقة دكسل** لأكثر من ثلاثة أيام، فلا تلصق اللصقة التالية دون استشارة الطبيب المعالج.

الأولاد والمراهقون

ريفاستيجمين لصقة دكسل غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين دون سن الـ 18.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

- قد يتشوش ريفاستيجمين على أدوية مضادة للكوالين، بعضها هي أدوية تُستعمل لتخفيف من تشنجات أو تقلصات المعدة (مثل ديسيكولمين)، لعلاج مرض الباركينسون (مثل أمانتادين) أو لمنع داء الحركة (دوار السفر) (مثل ديفينهيدرامين، سكروپولامين أو ميكليزين).
- لا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** في نفس الوقت مع ميتوكلوبراميد (دواء يُستعمل لتخفيف أو لمنع الغثيان والتقيؤات). استعمال الأدوية سويًا قد يسبب مشاكل مثل تصلب الأطراف وارتفاع البدين.
- إذا كنت مُعتدًا على الخضوع لعملية جراحية خلال فترة العلاج ب**ريفاستيجمين لصقة دكسل**، فيجب إبلاغ طبيبك عن استعمال هذا الدواء، إذ إن **ريفاستيجمين لصقة دكسل** قد يزيد من تأثير مُرخيات عضلية معينة أثناء التخدير.
- يجب توخي الحذر عند استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** سويًا مع حاصرات بيتا (أدوية مثل أتينولول)، وتُستعمل لعلاج فرط ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). استعمال الدواءين سويًا قد يسبب مشاكل مثل تباطؤ نظم القلب (بطء القلب) مما قد يؤدي إلى الإغماء أو فقدان الوعي.
- يجب توخي الحذر عند استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** سويًا مع أدوية أخرى يمكنها أن تؤثر على نظم قلبك أو على النظام الكهربائي القلبي (استئطالة المقطع QT)

استعمال الدواء والطعام

يمكن استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** مع الطعام والشراب.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يمكن استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** مع الكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعًا، تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين حملًا، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

لا تتوفر معلومات عن استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** لدى النساء الحوامل. إذا كنت حاملاً، فيجب النظر في أفضليات **ريفاستيجمين لصقة دكسل** مقابل التأثيرات المحتملة على الجنين. لا يجوز استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** في فترة الحمل إلا إذا كان من الواضح أن استعماله أجدى.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج ب**ريفاستيجمين لصقة دكسل**. ليس معلومًا ما إذا كان ريفاستيجمين يُفرز في حليب الأم.

السياقة واستعمال الماكناات

سيقدم لك طبيبك المشورة عمًا إذا كان مرضك يتيح لك سياقة السيارة واستعمال الماكناات بشكل آمن. قد يسبب **ريفاستيجمين لصقة دكسل** الإغماء أو الارتباك الخطير. إذا شعرت بإحساس بالإغماء أو بالارتباك، فلا يجوز سياقة السيارة أو استعمال الماكناات أو القيام بأي نشاط يتطلب اليقظة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيجدهما الطبيب فقط.

هام:

- يجب نزع اللصقة السابقة قبل لصاق لصقة واحدة جديدة.
- لصقة واحدة فقط في اليوم.
- لا يجوز قص اللصقة إلى قطع.
- يجب الضغط على اللصقة بقوة لمدة 30 ثانية على الأقل بواسطة كف اليد.
- للاستعمال الخارجي فقط.

كيف يتم البدء بالعلاج؟

سينخبرك الطبيب أي **ريفاستيجمين لصقة دكسل** هو الأنسب لك.

- يبدأ العلاج عادةً باستعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل 4.6 ملغ/24 ساعة**
- الجرعة اليومية الاعتيادية الموسمي بها هي **ريفاستيجمين لصقة دكسل 9.5 ملغ/24 ساعة**. إذا كان التحمل جيدًا، فقد يرفع الطبيب الجرعة الدوائية إلى 13.3 ملغ/24 ساعة (لا يمكن الوصول إلى جرعة 13.3 ملغ/24 ساعة بواسطة **ريفاستيجمين لصقة دكسل**. في الحالات التي يتعين فيها استعمال هذه الجرعة الدوائية، يجب استعمال مستحضرات ريفاستيجمين أخرى توجد لها لصقات لإعطاء عن طريق الجلد بجرعة 13.3 ملغ/24 ساعة).

- يجب استعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة واستبدال اللصقة بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

خلال فترة العلاج يُحتمل أن يلائم الطبيب الجرعة بحيث تناسب احتياجاتك الشخصية. **يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

إذا لم تستعمل **ريفاستيجمين لصقة دكسل** طوال أكثر من ثلاثة أيام، فلا تلصق اللصقة التالية قبل أن تستشير طبيبك. يمكن مواصلة العلاج بلصقة من نفس الجرعة، إذا لم يتم إيقاف العلاج لأكثر من ثلاثة أيام. وإلا، فسيبدأ الطبيب من جديد علاجًا ب**ريفاستيجمين لصقة دكسل 4.6 ملغ/24 ساعة**.

أين ينبغي لصاق ريفاستيجمين لصقة دكسل؟

- قبل لصاق لصقة، يجب التأكد من أن الجلد نظيف وجاف وخال من الشعر، نظيف من أي مسحوق، زيت، كريم ترطيب أو مستحلب والتي من شأنها أن تحيق التصاق اللصقة على الجلد بشكل سليم، خالٍ من الشروح، الطفوح الجلدية و/أو التهيجات.

- يجب نزع اللصقة الموجودة بحذر قبل لصاق لصقة جديدة.** إذا أصقت على جسمك عدة لصقات، فقد يكون جسمك معرضًا لكمية فائضة من الدواء، وهي حالة قد تكون خطيرة.


- يجب لصاق لصقة واحدة فقط في اليوم، **فقط في إحدى** المناطق الممكنة المعرضة في الرسوم التوضيحية أدناه:

– الجزء العلوي من الذراع اليسرى أو الجزء العلوي من الذراع اليمنى
– الجانب الأيسر العلوي من الصدر أو الجانب الأيمن العلوي من الصدر

(يجب الامتناع عن الإصاق على الثدي)

– الجانب الأيسر العلوي من الظهر أو الجانب الأيمن العلوي من الظهر
– الجانب الأيسر السفلي من الظهر أو الجانب الأيمن السفلي من الظهر

كل 24 ساعة، يجب نزع اللصقة السابقة قبل لصاق لصقة واحدة جديدة على مكان واحد فقط من الأماكن الممكنة التالية:



عندما تقوم باستبدال اللصقة، فأنت ملزم بنزع لصقة اليوم السابق قبل أن تلصق اللصقة الجديدة، كل مرة في مكان آخر على الجلد (مثلًا على الجانب الأيمن من الجسم في يوم واحد وعلى الجانب الأيسر في اليوم التالي، في الجزء العلوي من الجسم في يوم واحد وفي الجزء السفلي من الجسم في اليوم التالي).


لا يجوز لصاق لصقة جديدة في نفس المكان بالضبط مرتين خلال 14 يومًا.

كيف ينبغي لصاق ريفاستيجمين لصقة دكسل؟

لصقة رقيقة، لونها بني فاتح وتلتصق بالجلد. كل لصقة معبأة في كيس مغلق يحميها إلى أن تصبح جاهزًا للإصاقها. لا يجوز فتح الكيس أو إخراج اللصقة إلا قبل إصاقها مباشرةً فقط.

يجب نزع اللصقة الموجودة بحذر قبل لصاق لصقة جديدة.

يرجي من متلقي العلاج الذين يبدؤون بالعلاج للمرة الأولى ومتلقي العلاج الذين يبدؤون بالعلاج من جديد بعد إيقافه، أن يبدؤوا من الرسم التوضيحي التالي.



انزع طبقة الغطاء عن الجانب العلوي ذي اللون البني الفاتح من اللصقة وتخلص من الغطاء. توجد طبقة واقية تحمي الجانب اللاصق من اللصقة. انزع جانبًا واحدًا من الطبقة الواقية ولا تلمس الجزء اللاصق من اللصقة بالأصابع.

ضع الجانب اللاصق من اللصقة على منطقة الجزء العلوي أو الجزء السفلي من الظهر، على الجزء العلوي من الذراع أو على الصدر وعندها انزع الجانب الآخر من الطبقة الواقية.

بعد ذلك، يجب الضغط على اللصقة بقوة لمدة **30 ثانية على الأقل** بواسطة كف اليد للتأكد من التصاق الأطراف كما ينبغي.



إذا كان ذلك يساعداك، فيمكنك أن تكتب مثلًا اليوم من الأسبوع على اللصقة بقلم حبر جاف دقيق.

يجب إيقاف اللصقة في مكانها بشكل متواصل إلى أن يحين وقت استبدالها بلصقة جديدة. يُحتمل أن ترغب بتجريب أماكن مختلفة لإصاق اللصقة الجديدة لكي تجد أريح الأماكن والأماكن التي لن تحكك فيها الملابس باللصقة.

كيف ينبغي نزع ريفاستيجمين لصقة دكسل؟

يجب سحب طرف واحد من **ريفاستيجمين لصقة دكسل** بلطف وبيبطه لنزع اللصقة عن الجلد.

في حالة بقاء آثار صمغ على الجلد، بلّل المنطقة بلطف بالماء الدافئ والصابون اللطيف أو استعمال زيت الأطفال من أجل إزالتها. لا يجوز استعمال الكحول أو السوائل المنذية الأخرى (مزيل طلاء الأطفال أو المنظيات الأخرى).

يجب عليك غسل اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. في حالة لامسة العينين أو إذا ظهر احمرار في العينين بعد معالجة اللصقة، فيجب شطف العينين فورًا بالكثير من الماء والتوجه لتلقي الإسعاف الطبي إذا لم تكن الأعراض عابرة.

هل يمكن استعمال ريفاستيجمين لصقة دكسل أثناء الاستحمام، السباحة أو عند المكوث تحت أشعة الشمس؟

- لا يُقترح أن يؤثر الاستحمام في حوض الاستحمام (البانيو)، أو السباحة أو الاستحمام بالدوش على اللصقة. يجب مراقبة اللصقة لتلألأ ترتخي عند القيام بهذه النشاطات.

- لا يجوز تعريض اللصقة لأي مصدر حرارة خارجي (مثل ضوء الشمس الشديد، حمام البخار (ساونا)، غرفة التدسييم) لفترات زمنية طويلة.

ما الذي ينبغي فعله إذا سقطت اللصقة؟

إذا سقطت اللصقة، فيجب لصاق لصقة جديدة لليقبة اليوم، ثم استبدالها في اليوم التالي في الموعد المحدد.

متى ولأي مدة يجب استعمال ريفاستيجمين لصقة دكسل؟

- للاستفادة من العلاج عليك استعمال لصقة جديدة كل يوم، يُفضل استبدال اللصقة في نفس الساعة كل يوم.

- يجب استعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة واستبدالها بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

إذا استعملت خطأ أكثر مما يلزم من ريفاستيجمين لصقة دكسل

إذا استعملت خطأ أكثر من لصقة واحدة، فيجب نزع جميع اللصقات عن جلدك ثم إعلام الطبيب المعالج أنك استعملت خطأ أكثر من لصقة واحدة.

يُحتمل أن تحتاج إلى مراقبة طبية. لدى بعض الأشخاص الذين استعملوا خطأ أكثر من اللازم من ريفاستيجمين نشأ غثيان، تقيؤ، إسهال، ضغط دم مرتفع وهلوسات. قد يحدث أيضًا نبض بطيء وإغماء.

إذا استعملت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد بلدع الدواء خطأ أو بلصاق لصقة على جسمه، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال ريفاستيجمين لصقة دكسل

إذا اكتشفت أنك نسيت استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل**، فألصق لصقة جديدة على الفور. بإمكانك لصاق اللصقة التالية في الوقت الاعتيادي في يوم الغد. لا يجوز استعمال لصقتين معًا لتعويض عن تلك المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال ريفاستيجمين لصقة دكسل

أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا توقفت عن استعمال اللصقة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال **ريفاستيجمين لصقة دكسل** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يكون شيوع الأعراض الجانبية أعلى عند البدء بالعلاج أو عند رفع الجرعة الدوائية. في معظم الحالات تختفي الأعراض الجانبية بالتدرج، إذ إن الجسم يتكيف مع الدواء.

انزع اللصقة وأعلم الطبيب المعالج فورًا إذا شعرت بواحد أو أكثر من بين الأعراض الجانبية التالية التي قد تصبح خطيرة:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 10-11 مستعملين من بين 100):

- فقدان الشهية
- إحساس بالدوار

- إحساس بالهيجان
- عدم السيطرة على التبول (عدم القدرة على حبس البول كما ينبغي)
- التهاب في المسالك البولية

قلق

- اكتئاب
- ارتباك
- صداع
- إغماء

مشاكل في البطن مثل غثيان أو تقيؤ، إسهال

حرقة

ألم في البطن

طفح جلدي

رد فعل تحسسي في مكان لصاق اللصقة، مثل الحوصصات أو الجلد الملتهب

إحساس بالتعب أو بالضعف

انخفاض الوزن

حمّى

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1000):

مشاكل في دقات قلبك مثل تباطؤ دقات القلب

الغثاء

قرحة المعدة

تجفاف (فقدان كبير جدًا للسوائل)

فرط النشاط (مستوى مرتفع من النشاط، تملعل)

عدوانية (ضراوة)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10000):

سقوط

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10000):

تصلب النزاعين أو الرجلين وارتفاع اليدين

أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- تفاقم في أعراض مرض الباركينسون (الرعاش) – مثل الارتجاف، التصلب والهيجان في المشي
- التهاب في البنكرياس – تشتمل الأعراض على ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، مصحوب غالبًا بالغثيان أو التقيؤات

دقات قلبية سريعة أو غير منتظمة

ضغط دم مرتفع

نوبات اختلاجات

اضطرابات في الكبد (جلد أصفر، اصفرار بياض العينين، بول غامق بشكل شاذ أو غثيان، تقيؤ، تعب وفقدان الشهية دون مجبر)

تغيرات في نتائج الفحوص التي تدل على وظائف الكبد

إحساس بعدم الهدوء

كوابيس ليلية

متلازمة بيزا (حالة تشتمل على تقلص لا إرادي في العضلات مع انحناء شاذ

للجسم والراس إلى جانب واحد)

رؤية أشياء غير موجودة في الحقيقة (هلوسات)

ارتفاعات

ميل إلى النوم

طفح جلدي، حكة

احمرار الجلد

حوصصات

انزع اللصقة وراجع طبيبك فورًا إذا أحسست بأحد الأعراض الجانبية الواردة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية تم التبليغ عنها بخصوص ريفاستيجمين كبسولات أو ريفاستيجمين محلول وقد تحدث عند استعمال اللصقات:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100):

فائض من اللعاب

إحساس بعدم الهدوء

شعور عام سيئ

ارتفاع

فرط التعرق

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1000):

نظم قلبي غير منتظم (مثل نظم القلب السريع)

صعوبات في النوم

حالات سقوط عارضة

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10000):

نوبات اختلاجات

قرحة في الأمعاء

ألم في الصدر قد ينبع من تشنج في القلب

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10000):

ضغط دم مرتفع



- التهاب البنكرياس – تشتمل الأعراض على ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، مع الغثيان أو التقيؤات في أحيان متقاربة
- نزيف دموي في الجهاز الهضمي – يظهر على شكل دم في البراز أو في القيء

رؤية أشياء غير موجودة في الحقيقة (هلوسات)

بعض متلقي العلاج الذين عانوا من تقيؤات خطيرة عانوا من تمزق في

أنبوب المريء الذي يصل بين الفم والمعدة

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فليكن استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دييوق عل توفעות لؤواي علقب تسيول تروفتي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**תאריך תפוגה**) المدخون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين فيما دون 25°C. يجب التخزين في العبوة الأصلية.

احفظ باللصقة داخل كيسها إلى أن تستعملها.

لا يجوز استعمال اللصقة إذا كانت متضررة أو إذا وُجدت علامات على فتح العبوة.

بعد نزع اللصقة، قم بطيها إلى طبقتين بحيث تتجه الجوانب اللاصقة إلى الداخل، يجب الضغط عليها ورسها معًا. أرجع اللصقة المستعملة إلى كيسها وتخلص منها بحيث لا يستطيع الأولاد لمسها. لا يجوز لمس العينين بأصابعك، يجب شطف اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Polyester film fluoropolymer-coated, polyethylene/thermoplastic resin/aluminum coated polyester film, poly [(2-ethylhexyl) acrylate, vinylacetate], high molecular weight polyisobutene, paraffin light liquid, medium molecular weight polyisobutene, silica colloidal anhydrous, orange printing color.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

لصقة مستديرة، الطبقة الخارجية لونها بني فاتح وعليها