

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה מושקטת ללא מרשם רופא

קלמין תרחיץ פלוריש תרחיץ

החומרים הפעילים וריכוזם:

קלמין Calamine 15% W/W

אבץ חמצני Zinc Oxide 5% W/W

לרשימת החומרים הבלתי פעילים – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה מיועדת למבוגרים, ילדים וקשישים. על-יך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
על-יך לפנות לרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת גירוי עור.

קבוצה תרופוטי: מכוון שא העור מוגיע גירוי.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- העור שלך פצוע.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני הטיפול בקלמין תרחיץ פלוריש, ספר לרופא אם:**
- הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- הנך עומד לבצע צילום רנטגן, התרופה עלולה לשנות את תוצאות צילום הרנטגן בנסיבות מסוימות.
- יש להימנע ממגע עם עיניים, רקמות ריריות. אם נוצר מגע כזה, יש לשטוף היטב במים.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:

לא נמצאה הוכחה בנוגע לבטיחות התכשיר בשימוש בקרב נשים הרות או מניקות. עם זאת, התכשיר מצוי בשימוש במשך שנים רבות, ללא השפעות מזיקות.

נהיגה ושימוש במכונית:

לא ידוע מהי השפעת התרופה על נהיגה ושימוש במכונית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

על-יך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המוקבל בהעדף הוראה אחרת מרופא הוא:

יש לנער את הבקבוק לפני השימוש ולמרוח שכבה דקה על המקום הנגוע מספר פעמים ביום (או לפי הוראות הרופא) ולהשאיר את התכשיר על העור עד לייבוש.

אין לבלוע. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד!

משך הטיפול – אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מינון יתר נחשב כפחות סביר עם תרופה זו. עם זאת, אם מרחת בטעות מינון גבוה יותר, ייתכן ותחוה הקאות, דלקת בריריות הפה והומעי, חולשה, גבול נפשי, זיעה קרה, האטת דופק והתכווצות ברגליים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מה התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושרן! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלמין תרחיץ פלוריש עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

- עלולות להופיע תופעות לוואי כגון פריחה.
- יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם** מופיעות תופעות לוואי כגון: גירוי, פריחה או דלקת מקומית שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר.
- תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות:** על ההוריה לדווח לרופא על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנה בעלון, על-יך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש.
- יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Purified Water, Glycerol, Bentonite, Sodium Citrate, Liquefied Phenol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: תרחיץ בצבע ורוד בהיר בנפח של 100 מ"ל בבקבוק.

יצרן ובעל הרישום: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017400.

עלון זה נערך בתאריך 12/2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 125-47-28879-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.