

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

پارامول تارچت، حبسولات

تحتوي كل حبسولة على:

حمض الأسيتيل ساليسيليك 250 ملغ

پاراسيتامول 250 ملغ

Paracetamol 250 mg

Caffeine (anhydrous) 65 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل **إستعمالك** للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. يجب عليك تناول المستحضر وفقاً للتعليمات في الفقرة 3 – **"كيفية إستعمال الدواء؟"**. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك التوجه إلى الطبيب في حال تفاقم أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام من علاج الألم أو بعد 3 أيام من علاج الألم المترافق بالسخونة (أنظر الفقرة 3 **"كيفية إستعمال الدواء؟"**).

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

پارامول تارچت مخصص للتخفيف المؤقت من الصداع، الصداع الخفيف حتى المتوسط المرتبط بالشفقة، آلام الطمث وآلام المترافق بسخونة.

الفصيلة العلاجية:

حمض الأسيتيل ساليسيليك – مضاد للإلتهاب لاستيروئيدي (NSAID).

پاراسيتامول – مسكن للألم وخافض للسخونة.

كافئين – من قلويدات الكسانتین، منبّه للجهاز العصبي المركزي.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال پارامول تارچت إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية")
• كان لديك في الماضي أو فعلت تحسسي تجاه ألم آخرى تستعمل لعلاج الألم، الإلتهاب أو السخونة، مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك، الساليسيلات، ديكلوبيناك أو إيبوبروفين.
• أعراض **دو الفعل التحسسي** قد تشمل: ربو، صفيري أو ضيق التنفس، طفح جلدي أو شرى، إنتفاخ الوجه أو اللسان، رشح. إذا لم تكن واثقاً، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك •
• وُجدت لديك قرحة في المعدة أو قرحة في الأمعاء، أو إذا وُجدت لديك سابقة لقرحة هضمية (**peptic**) • لاحظت وجود دم في البراز أو براز أسود (أعراض نزف أو ثقب في الجهاز الهضمي) • كنت تعاني من أمراض (**hemophilia**) أو من إضطرابات أخرى في الدم • كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب، الكبد والكلى • كنت تتناول أكثر من **15 ملغ** من الميثوتريكسات أسبوعياً (أنظر فقرة "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية") • كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ پارامول تارچت، أخبر الطبيب إذا:

• لم يتم تشخيصك سابقاً بأنك تعاني من الشفقة، لأنه يجب إستبعاد حالات من شأنها أن تكون خطيرة تتعلق بالدماغ أو بالجهاز العصبي قبل العلاج •
كنت تعاني من شقيقة شديدة جداً لدرجة تتطلب الراحة في السرير، أو إذا وُجد لديك صداع يختلف عن حالات الشقيقة المعتادة لديك، أو إذا كنت تعاني من تقيؤات تترافق للصداع النابض من **الشقيقة** • بدأت تعاني من صداع بعد أو جراء إصابة في الرأس، مجهود، سعال أو إحناء •
وُجد لديك صداع مزمن (خمسة عشر يوماً أو أكثر في الشهر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر)، أو إذا قاسمت أول صداع لك بعد عمر الـ 50 •
كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى، نقص في الوزن أو سوء تغذية أو كنت تشرب الكحول بشكل دائم. قد تحتاج الإمتناع التام عن إستعمال المنتج أو تحتاج للحد من إستهلاك الباراسيتامول •
كنت تعاني من تلوث خطير، سوء تغذية شديد، نقص شديد في الوزن أو كنت تشرب الكحول بشكل دائم. قد يزيد هذا من خطورة الإصابة بالحماض الإستقلابي. علامات الحماض الإستقلابي: صعوبات في التنفس (تنفس عميق، سريع)، غثيان، تقيؤات وفقدان الشهية للطعام. يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا قاسمت من هذه الأعراض •
كنت تعاني من حالة وراثية تُسمى نقص إنزيم G6PD (جلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز) والتي تؤثر على كريات الدم الحمراء وقد تسبب فقر دم، بقران أو تضخم الكبد.
• كنت تتعرض لأشعة معينة لأدوية مثل بعض الأدوية المضادة للإلتهاب [مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين)].
• أو تسبب أمراض أخرى •
عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة، نزيف أو براز أسود. إذا شعرت بإزعاج في البطن أو حرقان بعد تناول مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للإلتهاب •
كنت تعاني من إضطرابات أبت أو من نزف من مهبلي غير طبيعي يختلف عن الطمث (مثل نزف طمثي مطول وشدفي بشكل إستثنائي) •
إجتمزت مؤخراً عملية جراحية (بما في ذلك عمليات جراحية بسيطة مثل جراحة الأسنان) أو كنت مقدماً على إجتيان عملية جراحية خلال الأيام السبعة القريبة •
كنت تعاني من الربو لدى الكبار، حمى القش (التهاب الأنف التحسسي)، سلائل في الأنف، مرض تنفسي مزمن أو تطورت لديك أعراض تحسسية (مثل ردود فعل جلدية، حكة، شرى) •
تعاني من النقرس (**gout**)، السكري، فرط نشاط الغدة الدرقية، اضطرابات في نظم القلب، فرط ضغط دم غير المرتقب، خلل في وظيفة الكلى أو الكبد •
كنت تعاني من الإمان على الكحول (أنتظر في السياق الفقرة – "إستعمال الدواء والطعام" و"إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول") •
كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين) أو پاراسيتامول، أو أدوية أخرى، نظراً لأن بعض الأدوية قد تعيق عمل پارامول تارچت وتسبب أعراضاً جانبية (أنظر في السياق "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية") •
كنت معرضاً لخطورة حدوث نجفاف (على سبيل المثال: تقيؤات، إسهال أو قبل أو بعد عملية جراحية كبيرة) •
عمرك دون **18 سنة**. هناك علاقة محتملة بين حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين) وملازمة راندنم عند إعطاؤه للأطفال والمراهقين. ملازمة رمي هاي من ملازمة نادرة، تؤثر على الدماغ والكبد وقد تكون قاتلة. لذا، السبب، لا يجوز إستعمال پارامول تارچت من قبل المراهقين والأطفال دون عمر 18 سنة بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

تحذيرات إضافية

كما هو الحال عند تناول أي نوع من مسكنات الصداع، فإن تناول پارامول تارچت في أوقات متقاربة جداً (أي، أكثر من عشرة أيام في الشهر لهذا الدواء) عندما يكون هنالك صداع مزمن (خمسة عشر يوماً أو أكثر في الشهر)، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، قد يؤدي لتفاقم الصداع أو الشقيقة لديك.

إذا كنت تعتقد بأن ذلك هو الحال، فتوجه لطبيبك للاستشارة. قد يتوجب عليك التوقف عن تناول پارامول تارچت من أجل حل المشكلة.

قد يقلل پارامول تارچت من أعراض التلوث (مثل صداع، إرتفاع حرارة الجسم) وذلك فإنه قد يسبب صعوبة أكبر في تشخيص التلوث. إذا كنت تشعر بسوء عليك التوجه للطبيب، تذكر أن تخبره بأنك تتناول پارامول تارچت.

الأطفال والمراهقين

پارامول تارچت ليس مخصصاً للأطفال والمراهقين دون عمر 12 سنة.

الفحوص والمتابعة

قد يؤثر پارامول تارچت على نتائج الفحوص المخبرية. إذا طُلب منك إجراء فحوص دم، بول أو فحوص مخبرية أخرى، فتذكر أن تخبر بأنك تتناول پارامول تارچت.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

بالأخص إذا كنت تتناول:

• **أي مستحضر آخر يحتوي على پاراسيتامول، حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين)، أو أي مسكن الألم/خافض السخونة** •
أدوية لمنع تخثر الدم مثل مضادات التخثر الفموية (على سبيل المثال، وارفارين)، هيبارين، أدوية لإنابة الخثرات (على سبيل المثال سترتينوكيناز)، أو أدوية أخرى مضادة للصفحات الدموية (تيكلوپيديين، كلوبيدوجريل، سيلوستازول) •
كورتيكوستيروئيدات (تستعمل لتخفيف الإلتهاب) •
باربيتورات ونزوديازيبينات (لعلاج التلوث والارق) •
ليثيوم، منبطات إعادة السيروتونين الإنتقائية (**SSRI**) أو فلووكسامين (لعلاج الإكتئاب) •
سوفونيل يوريا وإسولين (لعلاج السكري) •
ميثوتريكسات (لعلاج أنواع معينة من السرطان، إلتهاب المفاصل أو الصدفية) •
أدوية معينة لعلاج التلوث (مثل ريفامپيسين، إيزونيازيد، كلورامفينيكول، سيبروفلوكساسين أو موكسوكسيميد) •
ليفوثيروكسين (لعلاج نقص نشاط الغدة الدرقية) •
ميثوكوربايميد (لعلاج الغثيان والتقيؤات) •
أدوية لعلاج الصداع •
أدوية لعلاج فرط ضغط الدم و**مرض القلب** •
أدوية مدرة للبول (لزيادة إنتاج البول وتقليل فرط السوائل) •
أدوية لعلاج النقرس (**gout**) •
وسائط علاج حمل فموية •
زيدوفودين (لعلاج فيروس عوز المناعة البشري) •
أدوية علاج التفريح المعددي البطني (مثل بربيناثلين) •
كلوزابين (لعلاج الفصام) •
أدوية مقلدة لعملية الحساسية الودية (رفع ضغط الدم أو لعلاج إحتقان الأنف) •
أدوية مضادة للحساسية (لعلاج أو للتخفيف من حالات الحساسية) •
ثيوفيلين (لعلاج الربو) •
تيربينافين (لعلاج التلوثات الفطرية) •
سيسميتيدين (لعلاج الحرقان والقرحة الهضمية) •
ديسولفيرام (لعلاج التعلق بالكحول) •
نيكوتين (القطان من التدخين) •
كوليستيرامين (لعلاج نسب الكوليسترول المرتفعة) •
فلوكساسولين (مضاد حيوي)، وذلك بسبب وجود خطورة جارية محتملة على إضطرابات الدم والسوائل high anion gap metabolic acidosis) والذي يتطلب علاجاً عاجلاً وقد يحدث خاصة في حالات تضرر الكلى الشديد، إلتان الدم (حالة تتواجد فيها الجراثيم وسموها في الدم وتؤدي إلى تضرر الأعضاء)، سوء التغذية، إدمان الكحول المزمن وفي الحالات التي يتم فيها إستعمال الحد الأقصى من المقدار الدوائي اليومي من پاراسيتامول.

إستعمال الدواء والطعام

يشمل المقدار الدوائي الموصى به من هذا الدواء كمية كافئين مشابهة لكمية الموجودة في كأس من القهوة. خلال فترة إستعمال الدواء، عليك الحد من إستهلاك الأدوية الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافئين، وذلك لأن كمية كافئين زائدة عن الحد قد تسبب العصبية، عدم الهود، ارق، وفي بعض الأحيان خفقان قلب سريع.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

يجب الإمتناع عن إستهلاك الكحول خلال إستعمال الدواء. إذا كنت تستهلك ثلاثة أو أكثر من المشروبات الكحولية في اليوم، فاسأل طبيبك إن كان عليك تناول هذا الدواء أو أدوية أخرى لتسكين الألم/خفض الحرارة. قد يسبب الباراسيتامول وحمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين) ضرراً للكبد ونزيفاً في المعدة.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء أثناء الحمل.

إذا كنت حاملاً، تعتقدین أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فأخبري طبيبك ولا تتناولي پارامول تارچت.

الحمل – الثلث الأخير

من المهم جداً عدم تناول پارامول تارچت خلال آخر ثلاثة أشهر من الحمل، لأن الأمر قد يسبب مشاكل للجنين أو أن يسبب مشاكل خلال الولادة. قد يسبب ذلك مشاكل في الكلى أو القلب لدى الجنين. قد يؤثر ذلك على قابليتك أو قابلية طفلك للنزف أو يتسبب في تأخر الولادة عن المتوقع.

الحمل – الثلث الأول والثاني

نظراً لإحتوائه على الأسبيرين، لا يجوز تناول هذا الدواء خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحمل، إلا إذا كان العلاج ضرورياً وبتوصية طبيبك فقط.

إذا كنت بحاجة إلى علاج خلال هذه الفترة، فيجب إستعمال أقل مقدار دوائي ممكن ولأقصى فترة ممكنة. إذا تناولت هذا الدواء لاكثر من بضعة أيام بدءاً من عمر الـ 20 من الحمل وصاعداً، فقد يسبب الأدوية مشاكلً في الكلى لدى طفلك الذي لم يولد بعد، مما يؤدي إلى إخفاض مستويات السائل الأمنيوسي المحيط بطفلك أو تضيق الأوعية الدموية في قلب طفلك (ductus arteriosus). إذا إحتجت إلى علاج مطول أكثر من بضعة أيام، فقد يوصي الطبيب بإجراء فحوص مراقبة إضافية.

پارامول تارچت غير موصى به أثناء الإرضاع.

إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال أي دواء.

ينبغي پارامول تارچت إلى فصيلة الأدوية (NSAIDs) التي قد تُضعف الخصوبة لدى النساء. هذا التأثير قابل للعكس عند التوقف عن تناول الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنت

ليس هنالك أي تأثير معروف لتناول پارامول تارچت على قدرتك على السياقة وإستعمال الماكنتات.

إذا لاحظت أعراضاً جانبية مثل دوام أو نعاس، فعليك الإمتناع عن السياقة وإستعمال الماكنتات. أخبر طبيبك بأسرع ما يمكن.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

لعلاج الصداع المرتبط بالشفقة:

الكبار: 2 حبسولات. إذا تم تناول الدواء لعلاج الشقيقة ولم يطرأ تحسن أو طرأ تفاقم يعد المقدار الدوائي الأول، فيجب إستشارة الطبيب.

الأطفال دون عمر 18 سنة: يجب إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الدواء لأكثر من 48 ساعة للشقيقة.

للصداع، آلام الطمث والآخر من المترافق بسخونة:

الكبار والأطفال فوق عمر 12 سنة: 2 حبسولات كل 6 ساعات.

قد يتم الشعور بتحسن الألم خلال 15 دقيقة من تناول المقدار الدوائي.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات في الـ 24 ساعة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز إستعمال الدواء لفترة زمنية تزيد عن 5 أيام للألم أو 3 أيام المترافق بسخونة دون إستشارة الطبيب.

المستون:

ليست هنالك توصية بمقدار دوائي خاص. إذا كان لديك وزن جسم منخفض، فعليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

يجب بلع الحسولة بشكلها الكامل مع كأس مليء بالماء.

لا يجوز شطر أو سحق الحسولة. لا تتوفر معلومات حول الشطر/السحق/المضغ. لا يجوز الإستلقاء، خلع الملابس، سخونة مرتفعة، غثيان، تقيؤات، صداع، إرتباك أو عدم

تحتوي حبسولات پارامول تارچت على حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين)، پاراسيتامول وكافئين. لا يجوز تناول أكثر من المقدار الدوائي الموصى به ولا يجوز تناول أدوية أخرى التي قد تحتوي على هذه المركبات أو مركبات أخرى تستعمل لعلاج الألم، الإلتهاب أو الحرارة المترفعة (أدوية مضادة للإلتهاب لاستيروئيدية) خلال إستعمال پارامول تارچت.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضر معك علبة الدواء. يعتبر العلاج الطبي الفوري بالغ الأهمية. على ضوء الخطورة المحتملة لحصول ضرر غير قابل للعكس للكبد بسبب الباراسيتامول. لا تنتظر ظهور الأعراض لأنه من شأن المقدار الدوائي المفرط ألا يسبب في البداية أية أعراض بالامكان ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض المقدار الدوائي المفرط، فإنها قد تكون:

• بالنسبة لحمض الأسيتيل ساليسيليك (**أسبيرين**): دوام، طنين في الأذنين، صمم، تفرق، فرط التنفس، سخونة مرتفعة، غثيان، تقيؤات، صداع، إرتباك أو عدم الراحة، إنبهار الدورة الدموية (تدفق الدم) أو فشل تنفسي •
بالنسبة للباراسيتامول: الأعراض الأولى التي من شأنها أن تظهر – غثيان، تقيؤات، فقدان الشهية للطعام، شحوب، ميل للنوم، تفرق وقد ذلك ألم البطن •
بالنسبة لكافئين: قلق، عصبية، عدم الراحة، أرق، إنفعال، تقلص العضلات، إرتباك، إختلاجات، فرط سكر الدم، تسرع القلب (نظم سريع القلب) أو إضطرابات في نظم القلب.

حتى لو لم تظهر هذه الأعراض أو إذا إختفت، فمن الضروري التوجه لتلقي مساعدة طبية بشكل فوري.

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول الدواء لحظة تذكرك ذلك لكن لا تتناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المسموح.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات خلال فترة زمنية قدرها 24 ساعة.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر!

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال پارامول تارچت قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه فوراً للطبيب إذا كنت تقاسي من واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية الشديدة هذه:

• رد فعل تحسسي مع إنتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة. الأمر الذي قد يسبب صعوبات في البلع، صفيير أثناء التنفس، صعوبات في التنفس، وشعور بالضغط في الصدر (علامات الربو) •
قد يكون لديك أيضاً طفح أو حكة، أو قد تقاسي إغماغ •
طفح جلدي (بما في ذلك الشرى، حكة)، إحمرار الجلد، حويصلات في الشفتين، في العينين أو في الفم، تقشر الجلد، جروح، تقرحات في الفم •
نزيف في المعدة أو في الأمعاء، قرحة معدية أو قرحة في الأمعاء، والتي من شأنها أن تكون مصحوبة بألم بطن حاد، تقيؤ دموي، براز دموي أو أسود أو تقيؤ دموي. كما هو الحال عند العلاج مع أي نوع من مسكنات الألم وخافضات السخونة، قد تحصل هذه الأعراض في أي وقت خلال العلاج، دون وجود تاريخ سابق وقد تكون قاتلة. يكون هذا العرض الجانبي شديداً خاصة لدى المسنين •
إصفرار الجلد أو العينين (علامات لفشل كبدي) •
دوار أو صداع خفيف (علامات إخفاض ضغط الدم) •
مشاكل قلب غير منتظم •
ضبابت من تنفس في التنفس عند تناول حمض الأسيتيل ساليسيليك أو مضاد إلتهاب لاستيروئيدي، وإرتفاع في عدد حالات الرباع أو الكدمات •
إنتفاخ أو إحتباس الماء •
طنين في الأذنين أو فقدان سمع مؤقت •
تغيرات في السلوك، غثيان وتقيؤات – قد تكون هذه علامة لملازمة راي.

أعراض جانبية إضافية

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في إطار 16 بحثاً سريرياً تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متعالج.

أخبر طبيبك إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض الجانبية:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض التي تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين:

- عصبية، دوام •
غثيان، إزعاج في البطن

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض التي تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل:

•أرق، إرتجاج، شعور بالتئمل، صداع •
جفاف في الفم، إسهال، تقيؤات •
إرهاق، شعور بعصبية •
إرتفاع نظم القلب

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض التي تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل:

• ألم في الحنجرة، صعوبات في البلع، شعور بتئمل أو وخز حول الفم، فرط اللعاب •
تراجع الشهية للطعام، تغيريات في حاسة الذوق •
قلق، نشوة، توتر •
إضطرابات في الإصغاء، فقدان الذاكرة، تغيريات في التنسيق (تناسق الحركات) •
شعور بألم في الخدين والجبين •
ألم في العينين، اضطرابات في الرؤية •
هبات من الحر، مشاكل في الأوعية الدموية المحيطية (مثل في الذراعين أو الرجلين) •
رعاف، تنفس بطيء وسطحي، سيلان الأنف •
تجشؤات، فغخة (غازات) •
فرط التعرق، حكة، طفح حاد، زيادة حساسية الجلد •
تصلب العضلات، العظام أو المفاصل: ألم في الرقبة، ألم في الظهر، تقلصات عضلية •
ضعف، إزعاج في الصدر

أعراض جانبية شيعوية غير معروف (أعراض لم يحدد شيعوها بعد):

تم التلخيص كذلك عن الأعراض الجانبية التالية منذ بدء تسويق الدواء بصورة عامة ليس بالإمكان تحديد الشيعو بصورة دقيقة خلال فترة المتابعة في فترة ما بعد التسويق، وذلك فإن شيعوها معرّف على أنه "غير معروف".

• عدم الراحة، شعور عام سيء أو غير سليم •
ميل للنوم، شقيقة •
إحمرار الجلد، طفح. تم التبليغ عن حالات نادرة جداً من ردود فعل جلدية شديدة •
خفقان القلب، ضيق التنفس، صعوبات مفاجئة في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع صفيير أو سعال (ربو) •
ألم في البطن، إزعاج في البطن بعد وجبات طعام •
إرتفاع في إنزيمات الكبد •
إنتفاخ وتوهج داخل الأنف •
مشاكل في الكلى

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس عبر العنوان التالي: **padagis.co.il**

5. كيفية تحزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال، أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب •
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) التي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من صلاحية الشهر •
طروف التخزين:
حُزن في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية •
بالإمكان الإستعمال لمدة 9 أشهر بعد الفتح للمرة الأولى، لكن بما لا يتجاوز تاريخ الصلاحية •
لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو الإستعمال.
تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: يتوفر الدواء ضمن قناني صغيرة تحتوي على 24 أو 50 حبسولة بضياع مع حتم "L374" في جانب واحد.

من الجائز ألا تتساق كافة أحجام العلبة. تحتوي العلبة على ماص للرطوبة. لا يجوز بلع ماص الرطوبة أو إخراجها من القنينة.

صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض، شارع راكيفيت 1 شوهام.

إسم المنتج وعنوانه: شركة بيريچو، أليجان، ميشيجان، الولايات المتحدة. تم إعادةاها في آذار 2025.

رقم سجل الدواء في السجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 14079.32024

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

<p>لمزيد من المعلومات حول المستحضر والنشرات المحدّثة باللغات العبرية، العربية والإنجليزية، قوماو بمسح الكود التالي:</p> <p>For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:</p>  <p>بالإمكان التوجه إلى صاحب الإمتياز للمستحضر لطلب نشرة للمستهلك مطبوعة باللغة الإنجليزية عبر عنوان البريد الإلكتروني: cs_pharma@padagis.com</p> <p>في هاتف رقم: 1-800-388-288</p> <p>You can contact the registration holder by email: cs_pharma@padagis.com or by telephone: 1-800-388-288.</p>
--