



## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **לייקליר קרם לעור**

השפופרת מכילה פרמתרין 5% w/w (permethrin).

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.  
התרופה אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל חודשיים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

לייקליר קרם לעור מיועדת לטיפול בגרדת (סקביאס).  
**קבוצה תרפויטית:** לייקליר קרם לעור שייכת לקבוצת תרופות הנקראות פירתרואידים, שהינם חומרים נגד טפילים.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לפרמתרין, פירתרינים אחרים, לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6) או לחרציות.

##### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

##### **לפני השימוש בלייקליר קרם לעור, ספר לרופא אם:**

- אתה מטפל בתינוקות, ראה מטה את הסעיף "ילדים עד גיל 23 חודשים".
- ידוע שאתה אלרגי לחרציות או לצמחים אחרים ממשפחת המורכבים (compositae), עליך להשתמש בלייקליר קרם לעור רק לאחר שתפנה לרופא.
- לייקליר קרם לעור מיועדת לשימוש עורי בלבד. אין לבלוע תרופה זו.
- הימנע ממגע עם העיניים או עם רקמות ריריות (בתוך האף או הגרון, אזור איברי המין) או פצעים פתוחים. במקרה של מגע בעין, שטוף מיד עם מים או סליין (תמיסת מלח 0.9%, אם היא זמינה מיידית).
- מומלץ שמטפלים המעורבים באופן שגרתי בטיפול באחרים יעטו כפפות כדי להימנע מכל גירוי אפשרי לידיים.

הפסק את השימוש בלייקליר קרם לעור אם אתה חווה גירוי בעור והיוועץ ברופא אם זה לא משתפר.

לייקליר קרם לעור עלולה להחמיר סימפטומים של אסתמה או אקזמה.

### **ילדים עד גיל 23 חודשים:**

אין להשתמש בלייקליר קרם לעור בילודים ובתינוקות מתחת לגיל חודשיים, אלא אם כן הרופא אומר לך כך. אין מספיק ניסיון בתינוקות ובפעוטות. טיפול בילדים עד גיל 23 חודשים צריך להינתן רק תחת השגחה רפואית צמודה.

### **אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח כעת סוג של תרופה הנקראת קורטיקוסטרואיד לפני שתשתמש בתרופה זו.

### **היריון והנקה**

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שייתכן שאת בהיריון או אם את מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

### **נהיגה ושימוש במכוונות**

לייקליר קרם לעור לא ידועה כמשפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

**לייקליר קרם לעור מכילה formaldehyde** העלול לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור ממגע).

**לייקליר קרם לעור מכילה butylhydroxytoluene** העלול לגרום לתגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור ממגע) או גירוי לעיניים ולרקמות ריריות.

### **לייקליר קרם לעור מכילה גם פרפין נוזלי.**

חומר לא פעיל זה של הקרם עלול להפחית את היעילות ולכן את האמינות של מוצרי לטקס (למשל קונדומים, דיאפרגמה) אשר בשימוש באותו הזמן.

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- ודא שהעור נקי, יבש וקריר.
- אם אתה מתרחץ במים חמים לפני הטיפול, עליך לאפשר לעור להתקרר לפני מריחת הקרם.
- מרח בזהירות שכבה דקה של הקרם על העור (ראה "כיצד ומתי יש להשתמש בלייקליר קרם לעור?").
- הקרם נספג בקלות בעור. אין צורך למרוח עוד קרם עד שתוכל לראות אותו על פני העור.
- לרוב מריחה אחת מרפאת את הזיהום. אם יש לך ספק לגבי הצלחת הטיפול, היוועץ ברופא.
- לייקליר קרם לעור אינה מתאימה לטיפול בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.
- ילדים גדולים יותר צריכים להיות תחת פיקוח מבוגר כאשר שמים את הקרם.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים:** עד שפופרת אחת

**ילדים:** **6 עד 12 שנים:** עד חצי שפופרת

**1 עד 5 שנים:** עד רבע שפופרת

**חודשיים עד שנה:** עד שמינית שפופרת

### **ילודים ותינוקות מתחת לגיל חודשיים:**

ישנו מידע מוגבל זמין לגבי קבוצת גיל זו ולא ניתן להמליץ על מינון (ראה בנוסף סעיף 2 תחת "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

המידע מעלה הוא רק הנחיה. המינון יכול להיות מותאם בהתאם לצרכיו של המטופל ולשטח פני הגוף של המטופל. לדוגמה, מבוגרים מסוימים יצטרכו כמות גדולה יותר של קרם. ישנם מבוגרים שייתכן שיצטרכו להשתמש בשפופרת נוספת, אך אין למרוח יותר משתי שפופרות.

### כיצד ומתי יש להשתמש בלייקליר קרם לעור?

לייקליר קרם לעור היא לשימוש עורי בלבד.

הקפד לא לאפשר לקרם להיכנס לעיניים או לבוא במגע עם רקמות ריריות (בתוך האף או הגרון, אזור איברי המין) או פצעים פתוחים. אם מגע מקרי מתרחש, יש לשטוף ביסודיות עם מים.

מבוגרים צריכים למרוח את הקרם על כל הגוף, כולל הצוואר, כפות הידיים וכפות הרגליים. ניתן שלא לכלול את הראש והפנים אלא אם כן אזור זה מכיל מקומות נגועים בגרדת-סקביאס (קרדית הגרב). כאשר מורחים את הקרם, האזור שבין אצבעות הידיים והרגליים (גם מתחת לציפורני הידיים והרגליים), פרקי שורש כף היד, המרפקים, בתי השחי, איברי המין החיצוניים והישבן צריכים להיות מטופלים בזהירות יתרה.

בנשים, הקרם צריך להימרח גם על החזה.

לאחר מריחת הקרם יש ללבוש בגדים נקיים.

### *ילדים*

ילדים צריכים למרוח את הקרם באופן אחיד על כל הגוף, כולל כפות הידיים, כפות הרגליים, צוואר, פנים, אוזניים וקרקפת. אין לכלול חלקים בעור מסביב לפה (מאחר שניתן ללקק את הקרם) והעיניים.

שמור על ילדך שלא ילקק את הקרם מהידיים. במידת הצורך, ילדים צריכים ללבוש כפפות. אין מספיק ניסיון בתינוקות ובפעוטות. לכן טיפול בילדים עד גיל 23 חודשים צריך להיעשות רק תחת השגחה רפואית צמודה.

### *קשישים*

מטופלים קשישים (מעל 65 שנים) צריכים להשתמש בקרם באותה הצורה כמו מבוגרים אבל בנוסף, יש לטפל גם בפנים, באוזניים ובקרקפת. יש להקפיד להימנע ממריחת הקרם על האזורים מסביב לעיניים.

למשך כמה זמן עליך להשתמש בלייקליר קרם לעור?

מריחה אחת של לייקליר קרם לעור בדרך כלל מספיקה. השאר את הקרם על העור למשך שמונה שעות לפחות, לדוגמה, ללילה. הימנע מרחצה, מקלחת או שטיפה במהלך תקופת זמן זו, משום שזה יכול לסכן את הצלחת הטיפול. אם, באופן יוצא מן הכלל, אתה צריך לשטוף את ידיך במהלך שמונה השעות הללו, אז מרח מחדש את הקרם על אזור הידיים ופרקי שורש כף היד. אותו הדבר חל אם אתה צריך לשטוף חלקים אחרים של העור המטופל (ישבן, איברי מין חיצוניים).

לאחר שמונה שעות לפחות, התקלח או שטוף את העור עם סבון ומים. בהנחה שהוראות שימוש אלו מתקיימות, מריחה אחת בדרך כלל מספיקה לטיפול מוצלח. אולם, במקרים של נגע עיקש או מחדש, ייתכן שיהיה צורך לחזור על הטיפול לאחר 7 ימים.

### **אין לעבור על המנה המומלצת**

לשימוש חיצוני בלבד

### **מה לעשות במקרה של בליעת הקרם בטעות**

במקרה של בליעת הקרם בטעות, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם השתמשת בכמות גדולה יותר מהנדרש, שטוף את הקרם העודף בסבון ובמים חמים. אם יש סימני גירוי כלשהם, היוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בלייקליר קרם לעור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם תגובות רגישות יתר חמורות מתרחשות, היוועץ מיד ברופא. במקרה זה אין להשתמש יותר בלייקליר קרם לעור.

### **תופעות לוואי שכיחות**

אלה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10 אנשים:**

גרד (Pruritus), אדמומיות של העור או תחושות לא רגילות בעור (Paraesthesia) כמו גדגוג, עקצוץ, תחושת צריבה בעור כמו גם עור יבש הן תופעות לוואי שכיחות. אולם, סימפטומים כאלה יכולים גם להתרחש כתוצאה מהמחלה עצמה. קרמי לחות ושמני אמבט מומלצים כטיפול עוקב לעור יבש. הגרד והפריחה בעור (אקזמה לאחר גרדת-סקביאס)

יכולים להימשך עד 4 שבועות לאחר תום הטיפול. זה נגרם בעקבות תגובה לקרדיות הגרדת-סקביאס המתות.  
אם לאחר השימוש בלייקליר קרם לעור יש לך הרושם שהמחלה עדיין ממשיכה, היוועץ ברופא לפני מריחת הקרם שוב.

#### **תופעות לוואי נדירות מאוד**

אלה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10,000 אנשים**:  
נגעים בעור (excoriations), דלקת של זקיקי שיער (דלקת זקיק) ופיגמנטציה מופחתת של העור דווחו בזמן השימוש בלייקליר קרם לעור.  
אנשים אלרגיים/רגישים דיווחו על קשיי נשימה בזמן שרכיבים מקבוצת פירתרין היו בשימוש.

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**  
סרפדת אשר עלולה להתפשט מעבר לאזור העור המטופל.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

#### **דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. אין להקפיא.
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים, ולא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

#### **6. מידע נוסף**

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:  
Triglycerides (medium chain), glyceryl monostearate, macrogol (2) cetyl ether, glycerol, isopropyl myristate, cetomacrogol 1000, wool alcohols,

formaldehyde solution, paraffin liquid, carbomer 974P-NF4,  
butylhydroxytoluene (E321), sodium hydroxide and purified water.

- ראה גם סעיף 2 בעלון – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  
לייקליר קרם לעור הוא קרם לבן עד אוף-וויאט (off-white) ומגיע בשפופרת המכילה 30 גרם של קרם.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
- יצרן: גלקסוסמיתקליין טריידינג סרביסס לימיטד, דבלין, אירלנד.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 060-18-27015
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בספטמבר 2025.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.  
©2025 קבוצת החברות של GSK או הזכייין שלה.

*Lyc PT v9A*