

لايكلير كريم للجلد

تحتوي الأنبوبة على بيرميثرين 5% w/w (permethrin).

لقائمة المواد غير فعّالة والمثيرة للحساسية في المستحضر، انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
الدواء غير مخصص للرضع دون عمر الشهرين.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لايكلير كريم للجلد مخصص لعلاج الجرب (scabies).
الفصيلة العلاجية: لايكلير كريم للجلد ينتمي لفصيلة الأدوية المسماة بيريتروئيدات، وهي مواد مضادة للطفيليات.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
• كنت حساساً (ألبرجي) لـ بيرميثرين، بيريتريونات أخرى، لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6) أو للأقحوان.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- أخبر الطبيب قبل إستعمال لايكلير كريم للجلد إذا:
- كنت تعالج الرضع، أنظر أدناه الفقرة "الأطفال حتى عمر 23 شهراً".
 - كان معلوماً بأن لديك حساسية للأقحوان أو لنباتات أخرى من فصيلة المركبة (compositae)، فعليك إستعمال لايكلير كريم للجلد فقط بعد أن تراجع الطبيب.
 - لايكلير كريم للجلد مخصص للإستعمال على الجلد فقط. لا يجوز بلع هذا الدواء.
 - تجنب التماس مع العينين أو مع الأغشية المخاطية (داخل الأنف أو الحنجرة، منطقة الأعضاء التناسلية) أو الجروح المفتوحة. في حال التماس مع العين، إغسل مباشرة بالماء أو محلول ملحي (محلول ملح 0.9%)، إذا كان متوفرأ بشكل فوري).
 - من المفضل أن يقوم الأشخاص الضالعون بعلاج الآخرين بشكل روتيني بإرتداء القفازات وذلك لتجنب أي تهيج محتمل لليدين.
- توقف عن إستعمال لايكلير كريم للجلد إذا قاسيت من تهيج في الجلد وإستشر الطبيب في حال عدم تحسن ذلك.
قد يؤدي لايكلير كريم للجلد إلى تفاقم أعراض الربو أو الإكزيما.

أطفال حتى عمر 23 شهراً:

لا يجوز إستعمال لايكلير كريم للجلد لدى حديثي الولادة والرضع دون عمر شهرين، إلا إذا أخبرك الطبيب بفعل ذلك. لا توجد تجربة كافية بخصوص الرضع والأطفال الصغار. إن علاج الأطفال حتى عمر 23 شهراً يجب أن يتم فقط تحت مراقبة طبية حثيثة.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. لا سيما إذا كنت تستعمل حالياً نوعاً من الدواء يسمى كورتيكوستيروئيد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنات

لايكليز كريم للجلد غير معروف تأثيره على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي لايكليز كريم للجلد على formaldehyde الذي قد يؤدي إلى حدوث رد فعل جلدي موضعي (مثل إتهاب الجلد التماسي).

يحتوي لايكليز كريم للجلد على butylhydroxytoluene الذي قد يؤدي إلى حدوث رد فعل جلدي موضعي (مثل إتهاب الجلد التماسي) أو تهيج العينين والأنسجة المخاطية.

لايكليز كريم للجلد يحتوي أيضاً على پارافين سائل.

هذه المادة غير الفعالة في الكريم قد تضعف من نجاعة وكذلك من موثوقية منتجات اللاتكس (مثلاً كوندومات، ديافر اغما) التي تستعمل في نفس الوقت.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

- تأكد بأن الجلد نظيف، جاف وبارد.
- إذا كنت تستحم بماء ساخن قبل العلاج، عليك ترك الجلد حتى يبرد قبل دهن الكريم.
- إدهن بحذر طبقة رقيقة من الكريم على الجلد (أنظر "كيف ومتى يجب أن تستعمل لايكليز كريم للجلد؟")
- يُمتص الكريم بسهولة في الجلد. لا توجد حاجة لدهن المزيد من الكريم لكي تستطيع رؤيته على سطح الجلد.
- غالباً، يُعالج الدهن مرة واحدة التلوث. إذا كان لديك شك بخصوص نجاح العلاج، إستشر الطبيب.
- لايكليز كريم للجلد غير ملائم للعلاج لدى الرضع دون عمر شهرين.
- الأطفال الأكبر سناً يتوجب عليهم أن يكونوا تحت إشراف شخص بالغ عندما يضعون الكريم.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

حتى أنبوية واحدة	الكبار والمراهقون فوق عمر 12 سنة:
حتى نصف أنبوية	الأطفال: 6 حتى 12 سنة:
حتى ربع أنبوية	1 حتى 5 سنوات:
حتى ثمن أنبوية	شهرين حتى سنة:

حديثي الولادة والرضع دون عمر شهرين:

تتوفر معلومات محدودة حول هذه الفئة من العمر ولا يمكن التوصية على مقدار دوائي (بالإضافة أنظر الفقرة 2 أسفل "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

المعلومات المتوفرة أعلاه هي فقط بمثابة تعليمات. يمكن ملائمة المقدار الدوائي وفقاً لإحتياجات المعالج ومساحة سطح جسم المعالج. مثلاً، سيحتاج بعض الكبار لكمية أكبر من الكريم. هنالك بعض الكبار الذي من الجائز أن يحتاجوا لإستعمال أنبوية إضافية، لكن لا يجوز دهن أكثر من أنبويتين إثنين.

كيف ومتى يجب أن تستعمل لايكليز كريم للجلد؟

لايكليز كريم للجلد هو للإستعمال على الجلد فقط.

إحرص على ألا تسمح للكريم أن يدخل للعينين أو أن يلامس الأغشية المخاطية (داخل الأنف أو الحنجرة، منطقة الأعضاء التناسلية) أو الجروح المفتوحة. إذا حدث تماس بالصدفة، يجب الغسل جيداً بالماء.

يتوجب على الكبار دهن الكريم على كافة الجسم، بما في ذلك الرقبة، راحتي اليدين وراحتي القدمين. يمكن ألا يشمل ذلك الرأس والوجه إلا إذا كانت هذه المنطقة تحتوي على أماكن مصابة بالجرب – scabies (عثة الجرب).

عند دهن الكريم، يجب توخي الحذر الزائد عند علاج منطقة ما بين أصابع اليدين والقدمين (أيضاً تحت أظافر اليدين والقدمين)، رسغي اليدين، الأكواع، الإبطين، الأعضاء التناسلية الخارجية والألية.

لدى النساء، يجب أيضاً دهن الكريم على الصدر.

يجب إرتداء ملابس نظيفة بعد دهن الكريم.

الأطفال

يتوجب على الأطفال دهن الكريم بشكل متجانس على كافة الجسم، يشمل راحتي اليدين، راحتي القدمين، الرقبة، الوجه، الأذنين وفروة الرأس. يجب ألا يشمل ذلك أجزاء من الجلد المحيط للحم (نظراً لإمكانية لعق الكريم) والعينين.

حافظ على ألا يعلق طفلك الكريم الموجود على اليدين. يتوجب على الأطفال إرتداء القفازات إذا دعت الحاجة. لا توجد تجربة كافية لدى الرضع والأطفال الصغار. لذا فإن العلاج لدى الأطفال حتى عمر 23 شهراً يجب أن يتم فقط تحت مراقبة طبية حثيثة.

المسنون
يتوجب على المعالجين المسنين (فوق عمر 65 سنة) إستعمال الكريم بنفس الطريقة كما هو لدى الكبار لكن وبالإضافة لذلك، يجب أيضاً علاج الوجه، الأذنين وفروة الرأس. يجب الحرص على تجنب دهن الكريم على المناطق حول العينين.

لأي فترة من الزمن عليك إستعمال لايكليز كريم للجلد؟
عادة يكفي الدهن مرة واحدة من لايكليز كريم للجلد. أترك الكريم على الجلد لمدة ثماني ساعات على الأقل، مثلاً، خلال الليل. إمتنع عن الإغتسال، الإستحمام أو الشطف خلال هذه الفترة الزمنية، لأن ذلك قد يعرض نجاح العلاج للخطر. إذا، وفي حالة إستثنائية، توجب عليك غسل يديك خلال الثمانية ساعات تلك، حينئذ يجب دهن الكريم مجدداً على منطقة اليدين ومعصمي اليدين. نفس الأمر ينطبق إذا توجب عليك غسل أجزاء أخرى من الجلد المعالج (الألية، الأعضاء التناسلية الخارجية).
بعد مرور ثماني ساعات على الأقل، إستحم أو أشطف الجلد بالصابون والماء.
إفتراضاً بأن تعليمات الإستعمال هذه تطبق، فإن الدهن مرة واحدة عادة يكفي ليكون العلاج ناجحاً. لكن، في حالات حدوث أفة مستعصية أو متجددة، فمن الجائز أن يتطلب الأمر تكرار العلاج بعد 7 أيام.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به للإستعمال الخارجي فقط

كيفية التصرف في حالة بلع الكريم بالخطأ
في حال بلع الكريم بالخطأ، توجه مباشرة إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا إستعملت كمية أكبر من المطلوب، إغسل فائض الكريم بالصابون والماء الساخن. إذا وجدت أي علامات تهيج فإستشر الطبيب.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لايكليز كريم للجلد قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
إذا حصلت ردود فعل شديدة لفرط الحساسية، إستشر الطبيب حالاً. في هذه الحالة لا يجوز بعد إستعمال لايكليز كريم للجلد.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

حكة (Pruritus)، إحمرار الجلد أو شعور غير إعتيادي في الجلد (Paraesthesia) مثل دغدغة، وخز، الشعور بحرقة في الجلد كذلك أيضاً جفاف الجلد هي أعراض جانبية شائعة. لكن، مثل هذه الأعراض يمكن أن تحدث نتيجة المرض ذاته. إن كريمات الترطيب وزيت الإستحمام موصى بها كعلاج تالي لجفاف الجلد. إن الحكة والطفح في الجلد (إكزيما بعد جرب) يمكن أن يستمر حتى 4 أسابيع بعد إنتهاء العلاج. ذلك ينتج جراء رد فعل لعثة الجرب الميتة.

إذا كان لديك إنطباع بأن المرض ما زال مستمرًا حتى بعد إستعمال لايكليز كريم للجلد، راجع الطبيب قبل دهن الكريم مجدداً.

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:
بلغ عن آفات جلدية (excoriations)، التهاب جريبات الشعر (إلتهاب الجريب) وقلة تصبغ الجلد أثناء فترة إستعمال لايكليز كريم للجلد.
الأشخاص لديهم أليرجيا/الحساسين بآلغوا عن صعوبات في التنفس أثناء إستعمالهم لمركبات من فصيلة بيريترين.

أعراض جانبية شيوها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد توأرها بعد):
شرى الذى قد يتجاوز منطقة الجلد المعاللة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. لا يجوز التجميد.
- بالإمكان الإستعمال لمدة 6 أشهر بعد عملية الفتح الأولى، ولا يتأخر عن تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر.
- لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:
Triglycerides (medium chain), glyceryl monostearate, macrogol (2) cetyl ether, glycerol, isopropyl myristate, cetomacrogol 1000, wool alcohols, formaldehyde solution, paraffin liquid, carbomer 974P-NF4, butylhydroxytoluene (E321), sodium hydroxide and purified water.
- انظر أيضاً البند 2 في النشرة – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
لايكليز كريم للجلد هو كريم أبيض حتى أوف - وايت (off-white) متوفر ضمن أنبوبة تحتوي على 30 غرام من الكريم.
- صاحب الإمتياز: چلاكوسميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكوسميثكلاين تريدينج سيرفيسز م.ض.، دبلن، إيرلندا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 060-18-27015
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في أيلول 2025.

العلامات التجارية بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
©2025 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.