

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רינבוק® 15 מ"ג

רינבוק® 30 מ"ג

רינבוק® 45 מ"ג

רינבוק® אל.קיו

### המרכיב הפעיל וכמותו:

כל טבליה לשחרור ממושך של רינבוק 15 מ"ג מכילה אופדסיטיניב (כהמיהדרט) 15 מ"ג  
Upadacitinib (as hemihydrate) 15 mg

כל טבליה לשחרור ממושך של רינבוק 30 מ"ג מכילה אופדסיטיניב (כהמיהדרט) 30 מ"ג  
Upadacitinib (as hemihydrate) 30 mg

כל טבליה לשחרור ממושך של רינבוק 45 מ"ג מכילה אופדסיטיניב (כהמיהדרט) 45 מ"ג  
Upadacitinib (as hemihydrate) 45 mg

כל 1 מ"ל של תמיסה למתן דרך הפה של רינבוק אל.קיו מכילה אופדסיטיניב (כהמיהדרט) 1 מ"ג  
Upadacitinib (as hemihydrate) 1 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ו"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2 בעלון זה.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר רינבוק קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ברינבוק ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

### 1. למה מיועדת התרופה?

- רינבוק 15 מ"ג מיועד לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid arthritis) פעילה בינונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול בתרופה אנטי-ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק כטיפול יחיד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).
- רינבוק 15 מ"ג מיועד לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis) פעילה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול בתרופה אנטי-ראומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק כטיפול יחיד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).
- ספונדילוארתריטיס אקסיאלית (Axial spondyloarthritis)
  - רינבוק 15 מ"ג מיועד לטיפול בספונדילוארתריטיס אקסיאלית פעילה ללא עדויות רדיוגרפיות (Non-radiographic axial spondyloarthritis [nr-axSpA]) במבוגרים עם סימני דלקת אובייקטיביים, שבאו לידי ביטוי על ידי רמות מוגברות של חלבון מגיב C (C-reactive protein – CRP) ו/או בהדמיה בתהודה מגנטית (MRI), אשר חוו תגובה לא מספקת לתרופות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

○ רינבוק 15 מ"ג מיועד לטיפול בדלקת חוליות מקשחת פעילה ( Ankylosing spondylitis )  
[AS]; radiographic axial spondyloarthritis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת  
לטיפול מקובל.

- רינבוק 15 מ"ג מיועד לטיפול בדלקת עורקים של הרקה ( Giant cell arteritis ) במבוגרים.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק 30 מ"ג מיועד לטיפול בדלקת עור אטופית ( Atopic dermatitis ) בינונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה אשר מועמדים לטיפול סיסטמי.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק 30 מ"ג/רינבוק 45 מ"ג מיועד לטיפול בקוליטיס כיבית ( Ulcerative colitis ) פעילה בינונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי-סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק 30 מ"ג/רינבוק 45 מ"ג מיועד לטיפול במחלת קרוהן ( Crohn's disease ) פעילה בינונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי-סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק אל.קיו מיועד לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה של גיל הילדות ( JPsA )  
( Juvenile psoriatic arthritis ) בילדים מגיל שנתיים ומעלה, אשר חוו תגובה לא מספקת, או אי-סבילות  
לאחד או יותר מחוסמי TNF.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק אל.קיו לא מומלץ לשימוש בשילוב עם מעכבי JAK אחרים, תכשירים ביולוגיים  
מקבוצת DMARDs או תרופות פוטנטיות לדיכוי מערכת החיסון כגון אזאתיופרין וציקלוספורין.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק אל.קיו מיועד לטיפול בדלקת מפרקים אידיופטית פוליארתריקולרית פעילה של גיל  
הילדות ( pJIA ) Polyarticular juvenile idiopathic arthritis) בילדים מגיל שנתיים ומעלה, אשר חוו  
תגובה לא מספקת, או אי סבילות לאחד או יותר מחוסמי TNF.
- רינבוק 15 מ"ג/רינבוק אל.קיו לא מומלץ לשימוש בשילוב עם מעכבי JAK אחרים, תכשירים ביולוגיים  
מקבוצת DMARDs או תרופות פוטנטיות לדיכוי מערכת החיסון כגון אזאתיופרין וציקלוספורין.

**קבוצה תרפויטית :** מדכאי מערכת חיסון סלקטיביים, מעכבי ג'אנוס קינאז.

רינבוק פועל על ידי הפחתת הפעילות של אנזימים בגוף הנקרא "ג'אנוס קינאז" אשר מוריד דלקת.

#### **דלקת מפרקים שגרונית**

רינבוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית במבוגרים. דלקת מפרקים שגרונית זוהי מחלה הגורמת למפרקים מודלקים. אם אתה סובל מדלקת מפרקים שגרונית פעילה בינונית עד חמורה, ייתכן שתחילה תקבל תרופות אחרות, אשר אחת מהן תהיה ככל הנראה מתוטרקסאט. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק עם או ללא מתוטרקסאט לטיפול בדלקת המפרקים השגרונית שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך, להפחית עייפות, ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היומית-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

#### **דלקת מפרקים ספחתית**

רינבוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית במבוגרים. דלקת מפרקים ספחתית הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים ולפסוריאזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, ייתכן שתחילה תקבל תרופות אחרות. אם

תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק עם או ללא מתוטרקסאט לטיפול בדלקת המפרקים הספחתית שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונוקשות בעמוד השדרה, נגעים ספחתיים בעור ועייפות ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היומית-יומית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

**ספונדילוארתריטיס אקסיאלית (ספונדילוארתריטיס אקסיאלית ללא עדויות רדיוגרפיות ודלקת חוליות מקשחת)**  
רינבוק משמש לטיפול בספונדילוארתריטיס אקסיאלית במבוגרים. ספונדילוארתריטיס אקסיאלית היא מחלה הגורמת בעיקר לדלקת בעמוד השדרה. אם אתה סובל מספונדילוארתריטיס אקסיאלית פעילה, ייתכן שתחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל רינבוק לטיפול בספונדילוארתריטיס האקסיאלית שלך.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת כאבי גב, נוקשות ודלקת בעמוד השדרה. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היומית-יומית שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

### **דלקת עורקים של הרקה**

רינבוק משמש לטיפול בדלקת עורקים של הרקה במבוגרים. דלקת עורקים של הרקה הינה מחלה שגורמת לדלקת בכלי הדם, המשפיעה בדרך כלל על העורקים הבינוניים והגדולים בראש, בצוואר ובזרועות.

רינבוק יכול לעזור בשליטה בסימנים ובתסמינים של דלקת עורקים של הרקה כולל כאב ראש, רגישות בקרקפת, כאבי לסת ועייפות. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היומית-יומית שלך ובכך לשפר את איכות חייך. דלקת עורקים של הרקה מטופלת לעיתים קרובות באמצעות תרופות הנקראות סטרואידים. הן בדרך כלל יעילות, אך עלולות להיות להן תופעות לוואי אם משתמשים בהן במינונים גבוהים או אם משתמשים בהן למשך זמן ארוך. הפחתת מינון הסטרואידים עלולה גם להוביל להתלקחות של דלקת העורקים של הרקה. הוספת רינבוק לטיפול משמעותה שניתן להשתמש בסטרואידים לזמן קצר יותר, תוך שליטה במחלה.

### **דלקת עור אטופית**

רינבוק משמש לטיפול בדלקת עור אטופית בינונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה. רינבוק ניתן לשימוש עם תרופות למריחה על העור שניתנות לדלקת עור אטופית או כטיפול יחיד.

נטילת רינבוק יכולה לשפר את מצב העור, להפחית גרד והתלקחויות. רינבוק יכול לסייע בשיפור תסמינים של כאב, חרדה ודיכאון אשר יכולים להופיע בחולים עם דלקת עור אטופית. רינבוק יכול גם לסייע בשיפור הפרעות שינה ואיכות החיים הכוללת.

### **קוליטיס כיבית**

קוליטיס כיבית זו מחלה דלקתית של המעי הגס. רינבוק משמש לטיפול במבוגרים הסובלים מקוליטיס כיבית אשר הגיבו בצורה לא מספקת או שטיפול קודם לא היה נסבל עבורם.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת סימנים ותסמינים של המחלה הכוללים דימום צואתי, כאב בטני, דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקינה והקלה בתשיות.

### **מחלת קרוהן**

מחלת קרוהן זו מחלה דלקתית העלולה לערב כל חלק במערכת העיכול, אך בדרך כלל משפיעה על המעי. רינבוק משמש לטיפול במבוגרים הסובלים ממחלת קרוהן אשר הגיבו בצורה לא מספקת או שטיפול קודם לא היה נסבל עבורם.

רינבוק יכול לעזור בהפחתת סימנים ותסמינים של המחלה הכוללים דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים, כאב בטני ודלקת של רירית המעי שלך. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקינה והקלה בתשיות.

## **דלקת מפרקים ספחתית של גיל הילדות (JPsA)**

רינבוק משמש לטיפול בילדים מגיל שנתיים ומעלה עם דלקת מפרקים ספחתית של גיל הילדות. דלקת מפרקים ספחתית של גיל הילדות הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים ולפסוריאזיס.

רינבוק צפוי לסייע בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונוקשות בעמוד השדרה שלך, פריחה ספחתית בעור, עייפות, ולעזור להאט את הנזק לעצם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות לעזור לך לבצע פעילויות יום-יומיות רגילות ובכך לשפר את איכות החיים שלך בכל הנוגע לבריאותך.

## **דלקת מפרקים אידיופטית פוליארטיקולרית של גיל הילדות (pJIA)**

רינבוק משמש לטיפול בילדים מגיל שנתיים ומעלה עם דלקת מפרקים אידיופטית פוליארטיקולרית פעילה של גיל הילדות. דלקת מפרקים אידיופטית פוליארטיקולרית פעילה של גיל הילדות הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים.

רינבוק צפוי לסייע בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך, עייפות, ולעזור להאט את הנזק לעצם ולסחוס במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות לעזור לך לבצע פעילויות יום-יומיות רגילות ובכך לשפר את איכות החיים שלך בכל הנוגע לבריאותך.

## **2. לפני השימוש בתרופה**

### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לאופדסיטיניב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- יש לך זיהום חריף (כגון דלקת ריאות או זיהום עור חיידקי)
- יש לך שחפת פעילה (TB)
- יש לך בעיות כבד חמורות
- הינך בהריון (ראי סעיף "הריון, הנקה ופוריות" מטה)

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

#### **לפני הטיפול ובמהלך הטיפול ברינבוק ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום או אם אתה מפתח זיהומים לעיתים תכופות. ספר לרופא שלך אם אתה מפתח תסמינים כגון חום, פצעים, הרגשת עייפות גדולה יותר מהרגיל או בעיות דנטליות, מאחר שאלה יכולים להיות סימנים לזיהום. רינבוק יכול להפחית את יכולת הגוף להילחם בזיהומים ועלול להחמיר זיהום קיים או להגביר את הסיכון להתפתחות זיהום חדש. אם אתה סובל מסוכרת או בן 65 ומעלה, אתה עלול להיות בסיכון מוגבר להתפתחות זיהומים.
- סבלת משחפת או שהיית במגע קרוב עם מישהו חולה שחפת. הרופא שלך יבצע בדיקה לשחפת לפני התחלת הטיפול ברינבוק וייתכן שיחזור על הבדיקה בזמן הטיפול.
- סבלת מזיהום הרפס זוסטר (שלבקת חוגרת), כיוון שרינבוק יכול לאפשר לזיהום לחזור. ספר לרופא שלך אם יש לך פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות, כיוון שאלו יכולים להיות סימנים לשלבקת חוגרת.
- הייתה לך אי פעם דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג B או C.
- קיבלת לאחרונה או שאתה עתיד לקבל חיסון – זאת כיוון שחיסונים חיים אינם מומלצים בזמן השימוש ברינבוק.
- יש לך סרטן או סבלת מסרטן בעבר, אתה מעשן או עישנת בעבר, מאחר שהרופא ידון עימך אם רינבוק מתאים עבורך.
- סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים הנוטלים רינבוק. הרופא עשוי להמליץ לך על בדיקות עור סדירות במהלך נטילת רינבוק. אם במהלך או לאחר הטיפול מתפתחים נגעי עור חדשים או אם המראה של נגעים

קיימים משתנה, ספר לרופא.

- יש לך, או היו לך בעיות לב, מאחר שהרופא ידון עימך אם רינבוק מתאים עבורך.
- הכבד שלך אינו מתפקד כמו שצריך.
- היו לך בעבר קרישי דם בוורידים הרגליים (פקקת ורידים עמוקים) או בריאות (תסחיף ריאתי) או שאתה בעל סיכון מוגבר לפתח קרישי דם מסוג זה (לדוגמה: אם עברת ניתוח נרחב לאחרונה, אם את משתמשת באמצעי מניעה הורמונליים/בטיפול הורמונלי חלופי, אם זוהתה הפרעה בקרישת דם אצלך או אצל בני משפחה קרובים). הרופא ידון עימך אם רינבוק מתאים עבורך.
- ספר לרופא שלך, אם אתה מפתח קוצר נשימה פתאומי או קושי בנשימה, כאב בחזה או כאב בגב העליון, נפיחות ברגל או ביד, כאב ברגל, רגישות, או אודם או שינוי צבע ברגל או ביד, כיוון שאלו יכולים להיות סימנים לקרישי דם בוורידים.
- אתה חווה שינויים פתאומיים בראייה שלך. פנה מיד לקבלת ייעוץ רפואי אם יש לך תסמינים פתאומיים כמו ראייה מטושטשת, אובדן ראייה חלקי או מלא, כיוון שאלו עלולים להיות סימן לחסימת זרימת הדם בעיניים.
- יש לך בעיות בכליות.
- יש לך כאב בטן בלתי מוסבר, יש או הייתה לך דלקת סעיף (דיברטיקוליטיס, דלקת כואבת של כיסים קטנים בדופן המעי שלך) או כיבים בקיבה או במעי, או הינך נוטל תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות.
- אתה רואה טבליה או חלקי טבליה בצואה שלך בצורה חוזרת ונשנית.

אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות, פנה מיד לרופא שלך:

- תסמינים כגון פריחה (סרפדת), קשיים בנשימה או נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, ייתכן שאתה חווה תגובה אלרגית. חלק מהאנשים שנטלו רינבוק חוו תגובות אלרגיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים במהלך הטיפול עם רינבוק, הפסק ליטול רינבוק ופנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי.
- כאבי בטן עזים, במיוחד אלו המלווים בחום, בחילות והקאות.

#### **בדיקות ומעקב**

תצטרך לבצע בדיקות דם לפני התחלת הטיפול ברינבוק או בזמן נטילת התרופה. זאת כדי לבדוק אם קיימת ספירת תאי דם אדומים נמוכה (אנמיה), ספירת תאי דם לבנים נמוכה (נויטרופניה או לימפופניה), רמת שומנים גבוהה בדם (כולסטרול) או רמות גבוהות של אנזימי כבד. הבדיקות הן כדי לוודא שהטיפול ברינבוק אינו גורם לבעיות.

#### **קשישים**

קיים שיעור גבוה יותר של זיהומים בקרב חולים בגילאי 65 ומעלה. ספר לרופא שלך ברגע שאתה מבחין בסימנים או בתסמינים של זיהום.

מטופלים בגילאי 65 ומעלה עלולים להיות בסיכון מוגבר לזיהומים, לבעיות לב כולל התקף לב ולסוגי סרטן מסוימים. הרופא ידון עימך אם רינבוק מתאים עבורך.

#### **ילדים ומתבגרים**

רינבוק טבילות לא מומלץ לשימוש בילדים מתחת לגיל 12 או במתבגרים השוקלים פחות מ-30 ק"ג הסובלים מדלקת עור אטופית, מכיוון שהוא לא נחקר בחולים אלו.

הבטיחות והיעילות של רינבוק אל.קיו בילדים עם דלקת עור אטופית לא נקבעו.

רינבוק טבילות לא מומלץ לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 עם ספונדילוארתריטיס אקסילית (ספונדילוארתריטיס אקסילית ללא עדויות רדיוגרפיות ודלקת חוליות מקשחת), קוליטיס כיבית או מחלת קרוהן זאת מכיוון שהוא לא נחקר בקבוצת גיל זו.

הבטיחות והיעילות של רינבוק 15 מ"ג/רינבוק אל.קיו בילדים מתחת לגיל שנתיים עם דלקת מפרקים אידיופטית פוליארטיקולרית של גיל הילדות או דלקת מפרקים ספחתית של גיל הילדות לא נקבעו.

#### **אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא**

**או לרוקח.** זאת מכיוון שתרופות מסוימות יכולות להפחית את יעילות הטיפול ברינבוק או עלולות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

- תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים (כגון איטראקונאזול, פוסאקונאזול או ווריקונאזול)
- תרופות לטיפול בזיהומים חיידקיים (כגון קלריתרומיצין)
- תרופות לטיפול בתסמונת קושינג (כגון קטוקונאזול)
- תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפיצין)
- תרופות לטיפול בפרוכוסים או התקפים (כגון פניטואין)
- תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלך (כגון אזאתיופרין, 6-מרקפטופורין, ציקלוספורין וטאקרולימוס)
- תרופות העלולות להעלות את הסיכון להתנקבות (פרפורציה) במערכת העיכול או לדלקת סעיף (דיברטיקוליטיס) כמו תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (לרוב משמשות לטיפול בכאב ו/או מצבי דלקת של השרירים או המפרקים), ו/או אופיואידים (משמשים לטיפול בכאבים עזים), ו/או קורטיקוסטרואידים (לרוב משמשים לטיפול במצבי דלקת)
- תרופות לטיפול בסוכרת או אם יש לך סוכרת. הרופא שלך עשוי להחליט אם אתה זקוק לפחות מהתרופה נגד סוכרת בזמן נטילת אופדסיטיניב (upadacitinib)

אם אתה לוקח את אחת מהתרופות מהרשימה מעלה או שאינך בטוח, ספר לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת רינבוק.

## **הריון, הנקה ופוריות**

### הריון

אין להשתמש ברינבוק בזמן הריון.

### הנקה

אם את מניקה או מתכננת להניק, דברי עם הרופא שלך לפני לקיחת תרופה זו. אין להשתמש ברינבוק בזמן הנקה כיוון שלא ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב אם. את והרופא שלך תחליטו אם תניקי או תשתמשי ברינבוק. אל תעשי את שניהם.

### מניעת הריון

אם את אישה בגיל הפוריות, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעילים כדי להימנע מהריון בזמן נטילת רינבוק ולמשך 4 שבועות לפחות לאחר מנת רינבוק האחרונה שלך. אם הרית בפרק זמן זה, עלייך לפנות מיד לרופא שלך.

אם הילדה שלך קיבלה לראשונה את המחזור החודשי בזמן נטילת רינבוק, עליך לעדכן את הרופא.

### **נהיגה ושימוש במכוונות**

אין לנהוג או להשתמש במכוונות אם אתה חווה סחרחורת או תחושת סחרור (ורטיגו) בעת נטילת רינבוק עד שהן חולפות.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

**רינבוק אל.קיו מכיל נתרן בנזואט (סודיום בנזואט).** התמיסה מכילה 0.3 מ"ג נתרן בנזואט בכל 1 מ"ל של תמיסה למתן דרך הפה.

**רינבוק אל.קיו מכיל נתרן (סודיום).** התמיסה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בכל מנה, ולכן נחשבת 'נטולת נתרן'.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה ?**

**יש להשתמש בתכשיר תמידי בהתאם להוראות הרופא.** עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע

למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

**דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים ספחתית, ספונדילוארתריטיס אקסיאלית (ספונדילוארתריטיס אקסיאלית ללא עדויות רדיוגרפיות ודלקת חוליות מקשחת) או דלקת עורקים של הרקה**

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

#### **דלקת עור אטופית**

מבוגרים:

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם אחת ביום, כפי שנרשם על ידי הרופא שלך. הרופא עשוי להחליט אם להעלות או להוריד את המינון שלך בהתאם לפעולת התרופה בגוף. קשישים:

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

מתבגרים (גילאי 17-12) השוקלים לפחות 30 ק"ג:

המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

#### **קוליטיס כיבית**

המינון המקובל בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום למשך 8 שבועות. הרופא שלך עשוי להחליט להאריך את המינון ההתחלתי של 45 מ"ג למשך 8 שבועות נוספים (סה"כ 16 שבועות). לאחר מכן המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום כטיפול ארוך-טווח. הרופא עשוי להחליט להעלות או להוריד את המינון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

קשישים:

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום כטיפול ארוך-טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון אם יש לך בעיות בכליות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

#### **מחלת קרוהן**

המינון המקובל בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום למשך 12 שבועות. לאחר מכן המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום כטיפול ארוך-טווח. הרופא עשוי להחליט להעלות או להוריד את המינון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

קשישים:

אם אתה בן 65 ומעלה, המינון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום כטיפול ארוך טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המינון אם יש לך בעיות בכליות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

**דלקת מפרקים ספחתית של גיל הילדות או דלקת מפרקים אידיופטית פוליאורטיקולרית של גיל הילדות**

המינון המקובל למטופלים מגיל שנתיים ומעלה מבוסס על משקל הגוף.

- משקל מטופל של 10 ק"ג עד פחות מ-20 ק"ג :  
רינבוק אל.קיו 3 מ"ג (3 מ"ל של תמיסה למתן דרך הפה) פעמיים ביום.  
רינבוק 15 מ"ג (טבליות) אינו מומלץ.

- משקל מטופל של 20 ק"ג עד פחות מ-30 ק"ג :  
רינבוק אל.קיו 4 מ"ג (4 מ"ל של תמיסה למתן דרך הפה) פעמיים ביום.  
רינבוק 15 מ"ג (טבליות) אינו מומלץ.

- משקל מטופל של 30 ק"ג ומעלה :  
רינבוק אל.קיו 6 מ"ג (6 מ"ל של תמיסה למתן דרך הפה) פעמיים ביום.  
רינבוק 15 מ"ג (טבליות אחת של 15 מ"ג) פעם אחת ביום.

### אין לעבור על המנה המומלצת

#### צורת הנטילה

- יש לבלוע את טבליות רינבוק בשלמותן עם מים. אין לחצות, לכתוש, ללעוס או לשבור את הטבליה לפני הבליעה כיוון שזה יכול לשנות את כמות התרופה הנכנסת לגופך.
- כדי לעזור לך לזכור לקחת רינבוק, קח אותו כל יום באותו הזמן.
- קח את טבליות רינבוק פעם ביום.
- קח את תמיסת רינבוק אל.קיו פעמיים ביום.
- ניתן לקחת טבליות רינבוק/תמיסת רינבוק אל.קיו עם או ללא מזון.
- הימנע ממזון או משקאות המכילים אשכוליות בזמן שאתה נוטל (או מטופל ב) רינבוק שכן אלו עלולים להגדיל את הסיכוי להופעת תופעות לוואי, על ידי הגדלת כמות התרופה בגופך.
- תמיסת רינבוק אל.קיו אינה זהה לטבליות רינבוק. אין להחליף בין תמיסת רינבוק אל.קיו לטבליות רינבוק אלא אם השינוי בוצע על ידי הרופא שלך.

**קרא את סעיף 7 'הוראות שימוש' בסוף עלון זה לפני מתן מנה של רינבוק אל.קיו.**

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עליך לפנות לרופא שלך. ייתכן שתחווה מספר תופעות לוואי המפורטות בסעיף 4. אם אתה או ילדך נטלתם מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

#### אם שכחת ליטול את התרופה

- אם פספסת מנה אחת, קח אותה מיד כשזכרת.
- אם שכחת את המנה שלך במשך יום שלם, דלג על המנה שהפסדת וקח את המנה המומלצת כרגיל ביום למחרת.
- אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אל תפסיק לקחת רינבוק אלא אם הרופא שלך הורה לך להפסיק לקחת אותו.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברינבוק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

### תופעות לוואי חמורות

דבר עם הרופא שלך או פנה מיד לקבלת עזרה רפואית אם אתה חווה סימנים כלשהם של:

- זיהום כגון שלבקת חוגרת או פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות (הרפס זוסטר) - תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100
- זיהום בריאות (דלקת ריאות), אשר יכול לגרום לקוצר נשימה, חום ושיעול עם ליחה - תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100
- זיהום בדם (ספסיס) - תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000
- תגובה אלרגית (לחץ בחזה, צפצופים, נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, סרפדת) - תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000

### תופעות לוואי אחרות

דבר עם הרופא שלך אם הבחנת באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה

- זיהומים בגרון ובאף
- אקנה

### תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- סרטן עור שאינו מלנומה
- שיעול
- חום
- פצעי קור (הרפס סימפלקס)
- בחילה
- עלייה ברמת אנזים אשר נקרא קראטין קינאז, הנראית בבדיקות דם
- ספירת תאי דם לבנים נמוכה, הנראית בבדיקות דם
- עלייה ברמות כולסטרול (סוג של שומן בדם) כפי שנראה בבדיקות
- עלייה ברמות אנזימי הכבד, הנראית בבדיקות דם (סימן לבעיות כבד)
- עלייה במשקל
- דלקת (נפיחות) של זקיקי השיער
- שפעת
- אנמיה
- כאב בטן
- עייפות (תחושת עייפות בלתי רגילה וחולשה)
- כאב ראש (כאב ראש הינו שכיח מאד בדלקת עורקים של הרקה)
- סרפדת (אורטיקריה)
- זיהום בדרכי השתן
- פריחה
- תחושת סחרור (ורטיגו)
- סחרחורת
- זיהום בריאות (ברונכיטיס)
- נפיחות של כפות הרגליים והידיים (בצקת היקפית)

## תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000

- פטרת הפה (כתמים לבנים בפה)
- עלייה ברמות טריגליצרידים (סוג של שומן) בדם כפי שנראה בבדיקות
- דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס, התפתחות דלקת כואבת בכיסים קטנים שנוצרים בדופן המעי שלך)
- התנקבות במערכת העיכול (חור במעי)

### **תופעות לוואי נוספות אצל מתבגרים עם אטופיק דרמטיטיס**

## תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- יבלות (פפילומה של העור)

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### **דיווח תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והבליסטר. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- עבור רינבוק 15 מ"ג ורינבוק 30 מ"ג: יש לאחסן בטמפרטורה עד 30°C.
- עבור רינבוק 45 מ"ג: יש לאחסן בטמפרטורת החדר. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.
- יש לאחסן בבליסטר המקורי כדי להגן מלחות.
- עבור רינבוק אל.קיו: יש לאחסן מתחת ל-30°C. ניתן לשמור בקירור (2°C -8°C). אין להקפא. יש לאחסן את הבקבוק במצב זקוף בתוך קרטון, במקום קריר וחשוך.
- יש להשליך את שארית התמיסה 60 יום לאחר פתיחת הבקבוק.
- אין להשליך תרופות כלשהן דרך הביוב או האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות אשר אינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

### **מה מכיל רינבוק**

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

### רינבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

- ליבת הטבליה:

Microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

- ציפוי הפילם:

Polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

רינבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

- ליבת הטבליה:

Microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

- ציפוי הפילם:

Polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172)

רינבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

- ליבת הטבליה:

Microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

- ציפוי הפילם:

Polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, titanium dioxide (E171), talc, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172)

רינבוק אל.קיו תמיסה למתן דרך הפה

Sucralose, citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium benzoate (E211), purified water

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**

רינבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

רינבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הינן סגולות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a15'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באריזות המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך ובמארז של 84 טבליות המכיל 3 קופסאות, כל אחת מכילה 28 טבליות לשחרור ממושך. כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

רינבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

רינבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הינן אדומות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a30'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באריזות המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך. כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

רינבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

רינבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הינן צהובות עד צהובות מנוקדות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a45'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באריזות המכילות 28 טבליות לשחרור ממושך. כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכיל 7 טבליות.

רינבוק אל.קיו תמיסה למתן דרך הפה

רינבוק אל.קיו תמיסה למתן דרך הפה היא תמיסה שקופה, חסרת צבע עד צהובה בהירה.

התמיסה מסופקת בבקבוק שמכיל 180 מ"ל תמיסה באריזות קרטון. אריזות הקרטון מכילה בנוסף לבקבוק גם מזרק רב פעמי ומתאם.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

- **בעל הרישום וכתובתו:** אבווי ביופארמה בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל
- **שם היצרן וכתובתו:**
  - **רינבוק 15 מ"ג / 30 מ"ג / 45 מ"ג טבליות:**  
אבווי דויטשלנד גיי.אמ.בי.אינץ' אנד קו. קיי.גיי, קנולשטרסה, 67061, לודויגשפן, גרמניה
  - **רינבוק אל.קיו תמיסה לבליעה:**  
אבווי בע"מ, צפון שיקגו, IL 60064, ארה"ב
- נערך בדצמבר 2025
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**
  - רינבוק 15 מ"ג 164-29-36194
  - רינבוק 30 מ"ג 168-69-37036
  - רינבוק 45 מ"ג 172-42-37344
  - רינבוק אל.קיו 179-64-38152

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.


## 7. הוראות שימוש

הוראות שימוש אלה מכילות מידע על אופן ההכנה והמתן של רינבוק אל.קיו תמיסה למתן דרך הפה. קרא את הוראות השימוש לפני שאתה נותן רינבוק אל.קיו לילדך, ובכל פעם שאתה מקבל בקבוק חדש. ייתכן שיהיה מידע חדש. מידע זה אינו מחליף שיחה עם הרופא שלך על מצבו הרפואי של ילדך או הטיפול בו.

### מידע חשוב שעליך לדעת לפני מתן רינבוק אל.קיו

- ⚠ שמור את הבקבוק והציוד הרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.
- ⚠ השתמש אך ורק במזרק המצורף. אל תשתף את המזרק עם אנשים אחרים או תשתמש בו עם תרופות אחרות.
- ⚠ פנה לרופא שלך אם ילדך נטל יותר מדי מהתמיסה או לא קיבל את המנה המלאה.
- השתמש ברינבוק אל.קיו תוך 60 יום מפתחת הבקבוק. כדי לעזור לך לזכור, רשום את התאריך בו פתחת את הבקבוק על הקרטון.
- אל תפתח בקבוק חדש של רינבוק אל.קיו עד שתסיים את הבקבוק הקודם. יש להשתמש במזרק חדש בעת פתיחת בקבוק חדש.
- תמיסה למתן דרך הפה רינבוק אל.קיו היא שקופה וחסרת צבע עד צהובה בהירה.
- שמור הוראות אלו ואת הקרטון שבו הגיעה תמיסת רינבוק אל.קיו והציוד לשימוש עתידי.

### ציוד בכל קרטון



איור A

### השלכת רינבוק אל.קיו


- ⚠ השלך (זרוק) את המזרק ואת הבקבוק לאחר שתסיים את השימוש בבקבוק או לאחר 60 יום מהפתיחה.
- שאל את הרוקח כיצד להשליך (לזרוק) תרופה שלא נעשה בה שימוש.
- שטוף את המזרק ולאחר מכן השלך אותו לפח האשפה הביתי.

1. בדוק את המינון שנרשם.

- א. בדוק את המינון שנרשם לילדך במ"ל ומצא את סימון המ"ל על גבי המזרק.
- ב. השתמש במזרק המצורף אך ורק כדי לתת את המינון שנרשם.

2. בדוק את תאריך התפוגה.


- א. בדוק את הבקבוק וודא שתאריך התפוגה לא חלף (ראה איור B).
- ⚠ אל תשתמש ברינבוק אל.קיו לאחר שחלף תאריך התפוגה המודפס על גבי הקרטון והבקבוק אחרי הכיתוב "EXP".



איור B

3. בדוק את הציוד.


- א. בדוק את הציוד וודא שאינו פגום (ראה איור C).
- ב. השתמש במזרק רק אם הוא נקי ויבש.
- ג. וודא שהבוכנה משוכה עד קצה המזרק.
- ⚠ אל תשתמש בציוד אם הוא רטוב, פגום, או נראה שנפתח או נפגעה שלמותו.



איור C

4. פתח את הבקבוק.

- א. לחץ כלפי מטה וסובב את המכסה כדי להסירו מהבקבוק (ראה איור D). אל תזרוק את המכסה.




איור D

5. הכנס את המתאם (בפעם הראשונה בלבד).

א. תוך כדי אחיזת הבקבוק בחוזקה, דחוף את המתאם בעזרת האגודל שלך עד לקצה שפת הבקבוק (ראה איור E).

הערה: ייתכן שתצטרך להפעיל לחץ על המתאם.

⚠ אל תסיר את המתאם לאחר הכנסתו.




איור E

מדידת המנה

6. הכנס את המזרק לתוך הבקבוק ולאחר מכן הפוך את הבקבוק.

א. הכנס את קצה המזרק לתוך המתאם.

ב. כאשר המזרק מחובר לבקבוק, הפוך את הבקבוק (ראה איור F).



איור F

7. שאב את התמיסה לתוך המזרק.

א. משוך את הובכנה באיטיות כלפי מטה (ראה איור G).

ב. בדוק אם יש בועות אוויר במזרק.


הערה: ייתכן שתרגיש לחץ בעת משיכת הובכנה.



איור G

8. הסר בועות אוויר גדולות (ראה איור H).


- א. תוך כדי אחיזת הבקבוק, הקש על צידי המזרק כדי לשלוח בועות אוויר גדולות לקצה.
  - ב. כאשר המזרק מחובר לבקבוק, הזז את הבוכנה למעלה ולמטה כדי להחזיר בועות אוויר חזרה לבקבוק.
  - ג. חזור על שלב 8 עד שכל בועות האוויר הגדולות ייעלמו.
- הערה: בועות אוויר קטנות הן נורמליות.



H איור

9. מדוד את המנה.


- א. לאחר הסרת בועות אוויר גדולות, משוך את הבוכנה עד שתהיה בקו אחיד עם סימון המנה על גבי המזרק (ראה איור I).



I איור

10. הפוך את הבקבוק בחזרה למצב עמידה, ואז הוצא את המזרק.


- א. כאשר המזרק מחובר לבקבוק, הפוך את הבקבוק למצב עמידה.
  - ב. החזק במרכז המזרק והוצא אותו בזהירות מהבקבוק (ראה איור J).
- ⚠ אל תיגע בבוכנה כדי למנוע יציאה מקרית של תמיסה מהמזרק לפני שאתה מוכן לתת את התרופה.



J איור

11. בדוק את המינון.

- א. וודא שהמזרק מכיל את המינון הנכון של התמיסה למתן דרך הפה (ראה איור K).
- ב. בדוק את המזרק לאיתור בועות אוויר גדולות.
- ג. אם המינון אינו נכון או שאתה רואה בועות אוויר גדולות, חזור לשלב 6.



איור K

12. תן את התמיסה.

- א. הנח את המזרק כנגד החלק הפנימי של לחיו של הילד.
  - ב. לחץ על הבוכנה כדי לתת את כל המנה לפיו של הילד (ראה איור L).
  - ג. תן לילד לשתות מים.
- הערה: יש לתת את התמיסה תוך שעה ממילוי המזרק.




איור L

אחסון רינבוק אל.קיו

13. סגור ואחסן את הבקבוק.


- א. כאשר המתאם עדיין מוכנס לבקבוק, הברג את המכסה בחזרה על הבקבוק כדי לאטום אותו (ראה איור M).
- ב. אחסן את הבקבוק במצב זקוף בקרטון בין שימושים.
- ג. אחסן את הבקבוק במצב זקוף בתוך קרטון מתחת ל- $30^{\circ}\text{C}$  במקום קריר וחשוך. ניתן לשמור בקירור ( $2^{\circ}\text{C}$  -  $8^{\circ}\text{C}$ ). אין להקפיא.
- ד. שמור את הבקבוק, הציוד, ואת כל התרופות הרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.



**איור M**

**14. שטוף ואחסן את המזרק.**

- א. הוצא את הבוכנה מהמזרק ולאחר מכן שטוף את שני חלקיו במים (ראה איור N).
- ⚠ אל תשתמש בסבון ואל תכניס את המזרק למדיח כלים לניקויו.
- ב. אפשר לחלקיו המופרדים של המזרק להתייבש באוויר על משטח נקי.
- ג. אחסן את המזרק במקום נקי ויבש.



**איור N**

לאחר שסיימת את הבקבוק, עיין בסעיף "השלכת רינבוק אל.קיו".