

<div>نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986 <p>يُسوّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط</p></div>

أملوفال 5/80 ملغ أقراص مطلية

المادتان الفعالتان:

يحتوي كل قرص مطلي على:

أملودييين (على شكل بيسيلات) 5 ملغ
فالسارتان 80 ملغ

Amlodipine (as besylate) 5 mg
Valsartan 80 mg

المواد غير الفعالة ومسيبات الأرجية في المستحضر: انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعمله لأخريين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

علاج فرط ضغط الدم الأولي.

أملوفال مخصص للمعالجين الذين لم تتم موازنة ضغط دمهم على نحو لائق بواسطة علاج وحيد.

الفصيلة العلاجية:

أملودييين – حاصر لقنوات الكالسيوم.

فالسارتان – مناهض لمستقبل الأنجيوتنسين II.

تحتوي أقراص أملوفال على مركبين يسميان أملودييين وفالسارتان. هاتان المادتان مخصصتان لعلاج فرط ضغط الدم لدى البالغين عندما لا يعطي العلاج بكل مركّب على حدة نتائج مُرضية.

- ينتمي أملودييين لفصيلة مواد تسمى "حاصرات قنوات الكالسيوم". يوقف أملودييين دخول الكالسيوم إلى جدران الأوعية الدموية، مما يمنع تضيقّ الأوعية الدموية.
- ينتمي فإلسارتان لفصيلة مواد تسمى "مناهضات مستقبل الأنجيوتنسين II". الأنجيوتنسين II هو مادة تُنتج من قبل الجسم وتسبب تضيقّ الأوعية الدموية وبذلك تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يعمل فالسارتان على حصر تأثير الأنجيوتنسين II.

كلتا المادتين تساهمان في منع تضيقّ الأوعية الدموية. نتيجةً لذلك، يتم إرخاء الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) لأملودييين أو لأي من الحاصرات الأخرى لقنوات الكالسيوم. قد يتمثل ذلك بحكة، باحمرار الجلد أو بصعوبات تنفسية.
- وُجدت لديك حساسية (أرجية) لفالسارتان أو لأي من المركّبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (المفصلة في البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركّبات الدواء").
- إذا اعتقدت أنه قد تكون لديك أر حية، فراجع الطبيب قبل استعمال أملوفال.
- وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو مشاكل في القنوات الصفراوية مثل التشنّج الصفراوي أو الانسداد في جريان الصفراء داخل الكبد.
- كنت حاملاً لأكثر من ثلاثة أشهر (يُفضّل الامتناع عن استعمال أملوفال أيضًا في بداية الحمل، انظري البند "الحمل والإرضاع").
- وُجد لديك ضغط دم منخفض بشكل خطير (hypotension).
- وُجد لديك تضيقّ في الصمام الأبهري (aortic stenosis) أو صدمة قلبية (cardiogenic shock) – حالة لا يقدر فيها قلبك على تزويد الجسم بما يكفي من الدم).
- كنت تعاني من قصور القلب بعد نوبة قلبية.
- كنت مصابًا بالسكري أو لديك خلل في الوظيفة الكلوية وكنت تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على أليسكيرين.
- إذا **انطبق عليك أحد هذه البنود، فاعلم طبيبك دون أن تستعمل أملوفال.**

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بأملوفال، أخبر الطبيب إذا:

- كنت مريضًا (تقيؤات أو إسهال).
- وُجدت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلية.
- خضعت لزراعة كلية أو شُخصّ لديك تضيقّ الشرايين الكلوية.
- وُجدت لديك مشكلة تؤثر على وظيفة العدتين الكظريتين، تسمى فرط الألدوستيرونية الأولى (primary hyperaldosteronism).
- وُجد لديك قصور القلب أو أصبت في الماضي بنوبة قلبية. يجب اتباع تعليمات الطبيب بحذافيرها فيما يخص الجرعة الابتدائية. قد يفحص الطبيب أيضًا الأداء الوظيفي الكلوي لديك.
- أخبرك طبيبك أنك تعاني من تضيقّ صمامات في القلب (aortic or mitral stenosis)، أو من تضخّم غير سليم لعضلة القلب (obstructive hypertrophic cardiomyopathy).
- كان لديك ذات مرة تورّم، تحديدًا في الوجه والحلق عند استعمال أدوية أخرى (بما في ذلك مثبّطات ACE). إذا نشأت لديك هذه الأعراض، **فتوقّف عن استعمال أملوفال وراجع طبيبك فورًا. في هذه الحالة، لا يجوز أبدًا أن تعادو استعمال أملوفال.**
- إذا نشأت لديك آلام في البطن، غثيان، تقيؤات أو إسهال بعد تناول أملوفال، فسيقرر طبيبك بشأن استمرار العلاج. لا تتوقف عن استعمال أملوفال من تلقاء نفسك.
- كنت تستعمل أحد الأدوية المستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع:
 - مثبّطات ACE (على سبيل المثال: إينالابريل، ليزينابريل، رامبيريّل)، لا سيما إذا كنت تعاني من مشاكل كلوية تتعلق بالسكري.
 - اليسكيرين.

الأولاد والمراهقون:

لا يوصى باستعمال أملوفال لدى الأولاد والمراهقين الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.

الفحوص والمتابعة:

يُحتمل أن يفحص طبيبك وظائف كليتيك، ضغط الدم وكمية الكهارل (الإلكتروليتات) في دمك (مثلًا البوتاسيوم) بشكل دائم.

انظر معلومات إضافية في البند **"لا يجوز استعمال الدواء إذا"**.

إذا **انطبق عليك أحد البنود، فاعلم الطبيب قبل استعمال أملوفال.**

التفاعلات بين الأدوية:

إذا **كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.** قد يضطر طبيبك إلى تغيير الجرعة أو اتخاذ تدابير وقائية أخرى. في حالات معينة قد تضطر إلى التوقف عن استعمال أحد الأدوية.

خاصةً يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أدوية من الفصائل التالية:

- مثبّطات ACE أو أليسكيرين (انظر معلومات في البندين **"لا يجوز استعمال الدواء إذا"** و**"تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"**).
- مدرّات البول (نوع من الأدوية التي تزيد التبول).
- الليثيوم، وهو دواء يُستعمل لعلاج أنواع معينة من الاكتئاب.
- مدرات البول الممتنقية للبوتاسيوم، إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم أو مواد أخرى قد ترفع مستويات البوتاسيوم.
- أنواع معينة من مسكّنات الآلام المسماة مضادات التهاب الالاستيرويدية (NSAIDs) أو مثبّطات سيكلو أوكسيجيناز 2 الانتقائية (Cox-2 inhibitors). قد يفحص الطبيب أيضًا الوظائف الكلوية لديك.
- أدوية لعلاج الاختلاجات (مثل كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيتوين، فوسفينيتوين، بريמידون).
- خلاصة نباتية للتهدنة – العرن المنقوب (St. John's wort).
- نيتروجلوسيرين ونيتراتات أخرى أو أدوية أخرى تنتمي لفصيلة موسعات الأوعية الدموية (vasodilators).
- أدوية لعلاج الإيدز HIV/AIDS (مثل زينتونافير ، إيندينافير ، نيفينافير).
- أدوية تُستعمل لعلاج التلوثات الفطرية (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول).
- أدوية تُستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل ريفامبيسين، إيريثروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين).
- فيراياميل، ديليتازيم (دواء للقلب).
- سيماغستاتين (دواء يُستعمل لخفض مستويات الكوليسترول).
- دانترولين (تسريب مخصص لدرجات حرارة الجسم الشاذة).
- تاكروليموس (يُستعمل لمنع رفض جهازك المناعي لعضو مزروع).
- أدوية تُستعمل للحماية من رفض عضو مزروع (سيكلوسبورين).

استعمال الدواء والطعام:

لا يجوز استهلاك ثمار الجريبفروت وعصير الجريبفروت أثناء استعمال أملوفال. يعود ذلك إلى أن ثمار الجريبفروت وعصير الجريبفروت قد ترفع مستويات المركّب الفعال أملودييين في الدم، مما قد يزيد من التأثير الخافض لضغط الدم بشكل غير متوقّع. يمكن تناول أملوفال مع الطعام أو بدونه.

الحمل والإرضاع:

الحمل

عليك أن تخبري طبيبك إذا كنت تظنين أنك حامل أو إذا كان من المحتمل أن تحملي. سيوصيك طبيبك عادةً بالتوقّف عن استعمال أملوفال قبل أن تحملي أو فور اكتشافك بأنك حامل وبيوصيك بتناول دواء آخر بدلًا من أملوفال. لا يوصى باستعمال أملوفال في بداية الحمل (في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل) ولا يجوز استعماله إذا كنت حاملًا لأكثر من ثلاثة أشهر، لأنه قد يُلحق ضررًا شديدًا بالجنين إذا اُستُعمل بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعًا أو تخططين للبدء بالإرضاع. تنتقل كميات صغيرة من أملودييين إلى حليب الأم. لا يوصى باستعمال أملوفال في فترة الإرضاع وقد يوصيك طبيبك بعلاج آخر إذا كنت معنيّة بالإرضاع، خاصةً إذا وُلد الطفل للثو أو وُلد قبل الأوان.

عليك أن تستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أي استعمال لدواء.

السياقة واستعمال الماكنت:

هذا الدواء قد يسبب الدوار. يمكن أن يؤثر هذا الشيء على قدرتك على التركيز. لذلك، إذا لم تكن تعلم كيف سيؤثر الدواء عليك، فلا تُسّق السيارة، لا تستعمل الماكنت ولا تُمّ بنشاطات أخرى تستوجب التركيز.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملغ) في القرص، ولذلك يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

سيساعد ذلك في تحقيق أفضل النتائج وفي تقليل خطر نشوء أعراض جانبية.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيدحددهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتبّعة عادةً هي قرص واحد في اليوم:

- يُفضّل تناول الدواء في نفس الساعة يوميًا.

- يجب بلع الأقراص مع كأس ماء.
- يمكن تناول أملوفال مع الطعام أو بدونه. لا يجوز تناول أملوفال مع ثمار الجريبفروت أو مع عصير الجريبفروت.
- لا تتوفر معلومات بخصوص هرس الأقراص أو شطرها أو مضغها.

وفقًا لاستجابتك للعلاج، قد يقترح الطبيب تناول جرعة أعلى أو أدنى.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

أملوفال لدى المسنّين (من 65 عامًا فما فوق)

سيتوخى طبيبك الحذر عند رفع الجرعة الدوائية. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

إذا استعملت بالخطا جرعة دوائية أعنى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. قد يتراكم فائض من السوائل في رنتيك (وذمة رئوية) مما يسبب ضيق التنفس الذي قد ينشأ خلال ما لا يزيد عن 24-48 ساعة بعد تناول.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت استعمال الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول جرعة فور تتذكّرك. بعد ذلك، يجب تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعيادي. لكن، إذا حان بالتقريب وقت تناول الجرعة القادمة، فلا يجوز تناول الجرعة المنسيّة. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المتابعة على العلاج مثلما أوصى الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إيقاف العلاج بأملوفال قد يؤدي إلى تفاقم مرضك. لا تتوقف عن استعمال الدواء إلا بأمر من الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال أملوفال إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

هناك أعراض جانبية خطيرة تتطلب العلاج الطبي الفوري:

نشأت هذه الأعراض الجانبية الخطيرة لدى قلة من المتعالجين.

إذا حدث أحد الأعراض التالية، فيجب التوجه فورًا إلى الطبيب:

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000:

رد فعل تحسسي مع أعراض مثل طفح جلدي، حكة، تورّم الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبات في التنفس، ضغط دم منخفض (إحساس بالإغماء، إحساس بالدوخة).

أعراض جانبية نادرة جدًا (very rare) – أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

وذمة وعائية في الأمعاء؛ انتفاخ في الأمعاء يظهر مع أعراض مثل آلام البطن، غثيان، تقيؤات وإسهال.

أعراض جانبية أخرى يُحتمل حدوثها عند استعمال أملوفال:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:

إنفلونزا؛ انسداد الأنف، ألم في الحلق وانزعاج عند البلع؛ صداع؛ تورّم الذراعين، كَثَيّ اليدين، الرجلين، الكاحلين أو القدمين؛ تعب؛ ضعف؛ احمرار وشعور بالسخونة في الوجه و/أو في الرقبة.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000:

دوار؛ غثيان وآلم في البطن؛ جفاف الفم؛ نعاس؛ وخز أو خدر في كَثَيّ اليدين أو القدمين؛ فيرتيجو؛ نظم قلبي سريع يشمل خفقان القلب؛ دوار عند الوقوف؛ سعال؛ إسهال؛ إسهاك؛ طفح جلدي؛ احمرار في الجلد؛ تورّم المفاصل، ألم في الظهر؛ ألم في المفاصل.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000:

قلق؛ ظنين في الأذنين؛ إغماء؛ التبول بشكل أكبر من المعتاد أو الشعور بدافع متزايد للتبول؛ عدم القدرة على تحقيق انتصاب القضيب أو المحافظة عليه؛ شعور بالثقل؛ ضغط دم منخفض مع أعراض مثل دوار، إحساس خفيف بالدوخة؛ تعرق متزايد؛ طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم؛ حكة؛ تقلص العضلات.

إذا أثرت عليك الأعراض التي ذُكرت أعلاه بشكل خطير، فراجع طبيبك.

أعراض جانبية تم التبليغ عنها عند استعمال أملودييين أو فالسارتان كل على حدة ولا تظهر عند استعمال أملوفال أو تظهر بتواتر أكبر مما هو عليه مع أملوفال:

أملودييين

راجع الطبيب فورًا إذا أحسست بأحد الأعراض الجانبية النادرة جدًّا والخطيرة الواردة فيما يلي بعد تناول الدواء:

- أزيز مفاجئ عند التنفس، ألم في الصدر، ضيق التنفس أو صعوبات في التنفس.
- تورّم في الأذنان، في الوجه أو في الشفتين.
- تورّم في اللسان والحلق مما يسبب صعوبة بالغة في التنفس.
- أعراض جلدية خطيرة تشتمل على طفح جلدي شديد، شرى، احمرار الجلد في كل أنحاء الجسم، حكة شديدة، حويصلات، تقشّر وانتفاخ الجلد، التهاب النسيج المخاطي (Stevens-Johnson Syndrome، النخر الجلدي المسمي)، أو ردود فعل تحسسية أخرى.
- احتشاء عضلة القلب، نظم قلبي غير منتظم.
- التهاب البنكرياس الذي قد يسبب آلامًا شديدة في البطن والظهر مصحوبة بإحساس عام غير جيد.

تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية، إذا سببت لك الأعراض الواردة فيما يلي مشاكل أو إذا استمرت لأكثر من أسبوع، فراجع طبيبك:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:

دوار، ميل إلى النوم، خفقان القلب (إدراك الدقات القلبية)، حُمرة (تورّد)، انتفاخ الكاحلين (وذمة)، ألم في البطن، غثيان.

اعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000:

تغيرات في المزاج، قلق، اكتئاب، أرق، ارتجاف، تغيرات في حسّة الذوق، إغماء، فقدان الإحساس بالألم، اضطرابات في الرؤية، اختلال الرؤية، ظنين في الأذنين، ضغط دم منخفض، عطلان سيلان الأنف بنجمان عن التهاب نسيج الأنف (رينييتيس)، مشاكل في الهضم، تقيؤات، تساقط الشعر، تزايد التعرق، حكة جلدية، تغير لون الجلد، اضطراب في التبول، تزايد الحاجة إلى التبول في الليل، تزايد وتيرة التبول، عدم القدرة على بلوغ انتصاب القضيب، انزعاج أو تضخّم الثديين لدى الرجال، ألم، إحساس بالمرض، آلام العضلات، تقلص العضلات، ارتفاع أو انخفاض الوزن.

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000:

ارتباك

أعراض جانبية نادرة جدًا (very rare) – أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، انخفاض في عدد صفائح الدم، مما قد يسبب كدمات شاذة أو نزيفًا دمويًا بسهولة (تضرر كريات الدم الحمراء)، فائض سكر في الدم (فرط سكر الدم)، انتفاخ اللثة، انتفاخ البطن (التهاب المعدة/جاستريتيس)، وظائف شاذة للكبد، التهاب في الكبد (هيباتيتيس)، اصفرار الجلد (يرقان)، ارتفاع في إنزيمات الكبد، مما قد يؤثر على فحوص طبية معينة، ارتفاع التوتر العضلي، التهاب في الأوعية الدموية مصحوب أحيانًا بطفح جلدي، حساسية للضوء، اضطرابات تتمج بين التصلب، الارتجاف و/أو الصعوبات الحركية.

فإلسارتان

أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):

انخفاض في كريات الدم الحمراء، حمى، ألم في الحلق أو جروح في الفم نتيجةً للتلوثات؛ نزيف دموي أو كدمات بشكل تلقائي؛ مستويات مرتفعة للبوتاسيوم في الدم؛ نتائج غير سليمة لفحوص الكبد؛ انخفاض في وظائف الكليتين أو انخفاض خطير في وظائف الكليتين؛ تورّم تحديداً في الوجه والحلق؛ آلام العضلات؛ طفح جلدي، بقع بنفسجية-حمراء، حمى، حكة؛ ردود فعل تحسسية؛ حويصلات جلدية (أعراض حالة تسمى Dermatitis bullous).

إذا شعرت بهذه الأعراض، فراجع طبيبك فورًا!

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسلم هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسلم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.
- لا يجوز الاستعمال إذا كانت العبوة متضررة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبين الفعالين، يحتوي الدواء أيضًا على:

أملوفال أقراص مطلية 5/80 ملغ، 5/160 ملغ، 10/160 ملغ:

Cellulose, microcrystalline; sodium starch glycolate (type-A); starch, pregelatinised (maize starch); povidone (K-30); silica, colloidal anhydrous; magnesium stearate

أملوفال أقراص مطلية 5/80 ملغ، 5/160 ملغ – تركيبة الطلاء:

Hypromellose 2910; talc; macrogol 4000; titanium dioxide; iron oxide yellow

أملوفال أقراص مطلية 10/160 ملغ – تركيبة الطلاء:

Hypromellose 2910; titanium dioxide; macrogol 4000; talc; iron oxide yellow; iron oxide red

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

أملوفال 5/80 ملغ: قرص مطلي، مستدير، أصفر اللون، محدد من كلا الجانبين، ذو أطراف مائلة، على أحد جانبيه مطبوع "J" وعلى جانبه الآخر "79".

أملوفال 5/160 ملغ: قرص مطلي، بيضوي، أصفر اللون، محدد من كلا الجانبين، ذو أطراف مائلة، على أحد جانبيه مطبوع "J" وعلى جانبه الآخر "37".

أملوفال 10/160 ملغ: قرص مطلي، بيضوي، لونه أصفر فاتح، محدد من كلا الجانبين، ذو أطراف مائلة، على أحد جانبيه مطبوع "J" وعلى جانبه الآخر "38".

نوع العبوة: الأقراص مرزومة في لويحات/شرائط بليستر مرزومة في غلب كرتونية.

أحجام العبوات: 28 أو 30 قرصًا. يظهر على العبوة الكرتونية عدد الأقراص في كل عبوة.

قد لا تسوّق جميع أحجام العبوات.

المصنّع: أوريوندو فارما م.ض، الهند.

صاحب الامتياز والمستورد: اينوفامد م.ض، ص.ب. 62، ايغن يهودا.

خُررت النشرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

أملوفال 5/80 ملغ: 179-78-37748

أملوفال 5/160 ملغ: 179-79-37749

أملوفال 10/160 ملغ: 179-80-37750

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.