

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

مكينيست 0.5 ملغ، أقراص مطليّة

يحتوي كل قرص مطليّ على تراميتينيب (على شكل ثنائي ميثيل سولفوكسيد) 0.5 ملغ (trametinib (as dimethyl sulfoxide)

مكينيست 2 ملغ، أقراص مطليّة

يحتوي كل قرص مطليّ على تراميتينيب (على شكل ثنائي ميثيل سولفوكسيد) 2 ملغ (trametinib (as dimethyl sulfoxide)

المواد غير الفعّالة ومُسببات الحساسية: انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو الصيدليّ.

وَصِفَ هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحيّة وحالتهم.

1. لِمَ أُعِدَّ هذا الدواء؟

يُستعمل مكينيست كعلاج وحيد أو بالدمج مع دواء إضافي يحتوي على دابرافينيب لعلاج البالغين المصابين بنوع من سرطان الجلد يدعى ميلانوما وكان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، أو لا يمكن استئصاله جراحياً، مع طفرة في جين BRAF (BRAF V600 mutation).

يُستعمل مكينيست بالدمج مع دابرافينيب أيضاً كعلاج مكمل لدى البالغين المصابين بالميلانوما في المرحلة 3 مع طفرة في الجين BRAF (BRAF V600 mutation) بعد استئصال جراحي كامل للآفة.

يُستعمل مكينيست بالدمج مع دابرافينيب أيضاً لعلاج البالغين الذين في مرحلة متقدمة من سرطان الرئة الذي يدعى سرطان الرئة من نوع الخلايا غير الصغيرة (Non-Small Cell Lung Cancer [NSCLC])، مع طفرة في جين BRAF (BRAF V600 mutation).

مكينيست بالدمج مع دابرافينيب معدّ أيضاً لعلاج نوع من سرطان الغدة الدرقية الذي يدعى سرطان الغدة الدرقية الكشمي (Anaplastic Thyroid Cancer [ATC]) مع طفرة في الجين BRAF (BRAF V600E mutation)، الذي كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو الموجود في مكان واحد ومتقدم، وذلك بعد عدم التوصل إلى نتائج مرضية من إمكانيات العلاج الموضوعي.

مكينيست بالدمج مع دابرافينيب معدّ لعلاج الأورام الصلبة (Solid Tumors) لدى البالغين والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق والتي لا يمكن استئصالها جراحياً أو التي انتشرت إلى مناطق أخرى في الجسم، والتي تفاقمت (تقدّمت) ولا توجد لها إمكانيات علاج مرضية أخرى مع طفرة في الجين BRAF (BRAF V600E mutation). مكينيست غير معدّ لعلاج سرطان القولون والمستقيم.

مكينيست بالدمج مع دابرافينيب معدّ لعلاج نوع من سرطان الدماغ يسمى الورم الدبقي منخفض الدرجة (low-grade glioma, LGG)، لدى الأطفال فوق عمر 6 سنوات مع طفرة في الجين BRAF (BRAF V600E mutation) الذين يحتاجون إلى علاج جهازّي.

المجموعة العلاجية:

مثبط كينازات البروتين، عامل مضاد للأورام.

تتضمن كافة أنواع السرطان هذه تغييراً محدداً (طفرة) في جين يدعى BRAF في موقع الـ V600. قد تكون هذه الطفرة سبباً لتطور السرطان. يستهدف الدواء البروتينات الناتجة عن الجين الذي اجتاز هذه الطفرة ويبطئ أو يوقف تطور السرطان.

2. قبل استعمال الدواء

يجب استعمال مكينيست فقط لعلاج حالات الميلانوما، سرطان الرئة من نوع الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، سرطان الغدة الدرقية الكشمي (ATC)، الأورام الصلبة والورم الدبقي منخفض الدرجة مع طفرة في الجين BRAF.

لهذا، قبل بدء العلاج، سوف يجري الطبيب فحصاً لهذه الطفرة.

إذا قرر الطبيب أنك ستحصل على علاج مدمج من مكينيست وداپرافينيب، اقرأ بتمعن نشرة دابرافينيب، وهذه النشرة أيضاً.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية تتعلّق باستعمال هذا الدواء، توجه إلى الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسيّة (أرجية) لتراميتينيب أو لأحد المكونات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصّلة في البند 6 من هذه النشرة).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بمكينيسيت أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك أية مشاكل في الكبد. قد يجري الطبيب فحوصات دم لرصد أداء الكبد بينما تتناول هذا الدواء.
- كانت لديك الآن أو ذات مرة مشاكل في الكلى.
- كانت لديك الآن أو ذات مرة مشاكل في التنفس أو الرئة.
- كانت لديك مشاكل في القلب مثل قصور عمل القلب (التي قد تؤدي إلى ضيق في التنفس، صعوبة في التنفس أثناء الاستلقاء، تورم راحتي القدمين أو الساقين) أو مشاكل في طريقة عمل القلب. يجب على الطبيب أن يفحص أداء القلب قبل العلاج وخلالها.
- كانت لديك مشاكل في العينين بما في ذلك انسداد وريد يصرف الدم من العين (انسداد وريد الشبكية - retinal vein occlusion) أو تورم العين الذي قد يحدث بسبب انسداد سائل (chorioretinopathy).

قبل بدء العلاج بمكينيسيت بالدمج مَ دابرافينيب، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك سرطان من نوع غير الميلانوما، سرطان الرئة من نوع الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، سرطان الغدة الدرقية الكمشي (ATC) أو الأورام الصلبة (Solid Tumours)، لأنك قد تكون معرضاً لتطويع أنواع سرطان غير جلدية عندما تتناول مكينيسيت.

افحص مَ الطبيب إذا كنت تعتقد أن إحدى هذه الحالات تنطبق عليك.

الحالات التي يجدر الانتباه إليها

يطور بعض الأشخاص الذين يتناولون مكينيسيت حالات أخرى قد تكون خطيرة. عليك أن تعرف الأعراض الهامة التي يجب الانتباه إليها.

نزيف

قد يؤدي تناول مكينيسيت أو دمج من مكينيسيت مَ دابرافينيب إلى نزيف خطير بما في ذلك في الدماغ، الجهاز الهضمي (مثلاً: في البطن، فتحة الشرج أو الأمعاء)، الرئتين والأعضاء الأخرى، وقد يؤدي إلى الوفاة. قد تشمل الأعراض على:

- صداع، دوخة، أو شعور بالضعف
 - دم في البراز أو براز أسود
 - دم في البول
 - ألم البطن
 - سعال دموي / تقيؤ دموي
- أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أحد الأعراض التالية.

حمى

قد يؤدي تناول مكينيسيت أو دمج من مكينيسيت ودابرافينيب، إلى حمى، رغم أن هذه الحالة من المتوقع حدوثها أكثر إذا كنت تتناول علاجاً مدمجاً (انظر البند 4 أيضاً). في بعض الحالات، قد يطور الأشخاص الذين يعانون من حمى ضغط دم منخفض، دوخة أو أعراض أخرى. أخبر الطبيب فوراً إذا كانت لديك حمى أعلى من 38°C أو إذا شعرت بأن حرارتك على وشك أن ترتفع بينما تتناول هذا الدواء.

اضطراب في القلب

قد يؤدي تناول مكينيسيت أو دمج من مكينيسيت ودابرافينيب، إلى مشاكل قلبية، أو إلى تفاقم مشاكل قلب قائمة (انظر أيضاً "حالات قلبية" في البند 4).

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من اضطراب في القلب. يجري الطبيب فحوصات للتأكد من أن قلبك يعمل كما ينبغي قبل العلاج بهذا الدواء وخلالها. أخبر الطبيب فوراً إذا شعرت وكأن قلبك ينبض، نبضات القلب أسرع، أو أن ضربات قلبك غير منتظمة أو إذا شعرت بدوخة، تعب، شعور بالدوار، ضيق في التنفس أو تورم الساقين. عند الحاجة، قد يقرر الطبيب إيقاف العلاج بشكل مؤقت أو تام.

تغييرات جلدية قد تدل على سرطان جلد جديد

يفحص الطبيب جلدك قبل أن تبدأ بتناول الدواء ويفحصه أيضاً بشكل ثابت عندما تتناوله. أخبر الطبيب فوراً إذا اختبرت أية تغييرات جلدية أثناء تناول هذا الدواء أو بعد العلاج (انظر أيضاً البند 4).

مشاكل في العينين

عليك اجتياز فحص عيون لدى الطبيب أثناء تناول هذا الدواء.

أخبر الطبيب فوراً إذا عانيت من احمرار في العين وتهيج، تشوش الرؤية، ألم في العين أو تغييرات أخرى في العين خلال العلاج (انظر أيضاً البند 4).

يمكن أن يؤدي مكينيسيت إلى مشاكل في العينين بما في ذلك إلى العمى. لا يوصى بتناول مكينيسيت إذا عانيت ذات مرة من انسداد في الوريد الذي يصرف الدم من العين (انسداد وريد الشبكية). أخبر الطبيب فوراً إذا عانيت الأعراض التالية الخاصة بمشاكل في العينين: تشوش الرؤية، فقدان الرؤية أو تغييرات أخرى في الرؤية، نقاط ملونة في أثناء النظر أو هالات (رؤية خطوط هيكلية مشوشة حول الأغراض) خلال العلاج. عند الحاجة، قد يقرر الطبيب إيقاف علاجك بشكل مؤقت أو تام.

مشاكل في الكبد

قد يؤدي مكينيسيت أو مكينيسيت بالدمج مـ دابرافينيب إلى مشاكل في الكبد قد تتطور وتصبح خطيرة مثل التهاب الكبد (hepatitis) وقصور عمل الكبد التي قد تكون فتاكة. سيفحصك الطبيب بشكل دوري. قد تشمل العلامات التي تدل على أن الكبد لا يعمل كما ينبغي على:

- فقدان الشهية
 - غثيان
 - تقيؤ
 - ألم البطن
 - اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان)
 - بول داكن
 - حكة في الجلد
- أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أحد الأعراض التالية.

مشاكل في التنفس أو الرئة

أخبر الطبيب إذا كانت لديك أية مشاكل في التنفس أو الرئة، بما في ذلك صعوبة في التنفس تكون مصحوبة أحيانا بسعال جاف، ضيق في التنفس وتعب. قد يجري الطبيب فحوصات أداء الرئة قبل أن تبدأ بتناول الدواء.

ألم في العضل

قد يؤدي مكينيسيت إلى تفكك العضل (انحلال الريبيدات - rhabdomyolysis).
أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أحد الأعراض التالية:

- ألم في العضل
 - بول داكن نتيجة ضرر في الكلى
- عند الحاجة، قد يقرر الطبيب إيقاف علاجك بشكل مؤقت أو تام.

اقرأ المعلومات "أعراض جانبية خطيرة محتملة" في البند 4 من هذه النشرة.

ثقب في المعدة أو الأمعاء (انثقاب)

قد يؤدي تناول مكينيسيت أو تناول دمج من مكينيسيت ودابرافينيب إلى زيادة خطر تطور ثقب في جدار المعى.
أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت ألما خطيرا في البطن.

ردود فعل جلدية حادة

تم الإبلاغ عن ردود فعل جلدية خطيرة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكينيسيت بالدمج مـ دابرافينيب.
أخبر الطبيب فوراً إذا اختبرت أية تغييرات جلدية (انظر البند 4، الأعراض التي يجدر بك الانتباه إليها).

مرض التهابي يؤثر تحديدا في الجلد، الرئتين، العينين، والغدد الليمفاوية

مرض التهابي يؤثر تحديدا في الجلد، الرئتين، العينين، والغدد الليمفاوية (sarcoidosis). قد تشمل الأعراض المنتشرة للسلاركويد على سعال، ضيق في التنفس، تضخم الغدد الليمفاوية، اضطرابات في الرؤية، حمى، إنهاك، ألم وتورم المفاصل وتواءات جلدية حساسة. أخبر الطبيب إذا اختبرت أحد هذه الأعراض.

مشاكل في جهاز المناعة

قد يتسبب مكينيسيت بالدمج مـ دابرافينيب في حالات نادرة في حدوث حالة (haemophagocytic lymphohistiocytosis أو HLH) حيث يُنتج فيها جهاز المناعة أكثر مما ينبغي خلايا تحارب العدوى التي تسمى المنسجات والخلايا الليمفاوية. قد تشمل الأعراض تضخم الكبد و/أو الطحال، طفح جلدي، تضخم الغدد الليمفاوية، مشاكل في التنفس، ظهور كدمات بسهولة، شذوذ في الكلى ومشاكل في القلب.
أخبر الطبيب فوراً إذا كنت تعيش عدة أعراض مثل حمى، انتفاخ الغدد الليمفاوية، كدمات أو طفح جلدي، في الوقت نفسه.

متلازمة انحلال الورم (Tumour lysis syndrome)

إذا شعرت بالأعراض التالية، أخبر الطبيب فوراً لأنه من الممكن أن تكون هذه حالة تشكل خطراً على الحياة: حالات غثيا، ضيق تنفس، نبض غير منتظم، تشنجات العضلات، اختلاجات، تعكر البول، انخفاض إدرار البول والتعب.
قد تنتج هذه الأعراض عن مجموعة من المضاعفات الأيضية التي من الممكن أن تحصل أثناء علاج السرطان، والتي قد تحدث بسبب تحلل الخلايا السرطانية المحتضرة (متلازمة انحلال الورم أو TLS) وقد تسبب تغييرات في أداء الكلى (انظر أيضا البند 4).

الأطفال والمراهقون

مكينيسيت ليس معداً للأطفال دون عمر 6 سنوات. سلامة ونجاعة مكينيسيت بالدمج مـ دابرافينيب لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات غير معروفة. سلامة ونجاعة مكينيسيت بالاستعمال لوحده لدى الأطفال غير معروفة.

التفاعلات بين الأدوية

قبل بدء العلاج، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أية أدوية أخرى. يشمل ذلك أدوية دون وصفة طبية، ومكملات غذائية.

احتفظ بقائمة الأدوية التي تتناولها، بحيث يمكنك عرضها على الطبيب أو الصيدلي عندما تحصل على دواء جديد.

استعمال الدواء والغذاء

من المهم تناول مكينيسيت على معدة فارغة لأن الطعام يؤثر في طريقة امتصاص الدواء في جسمك (انظر البند 3).

الحمل، الإرضاع، والخصوبة

لا يوصى باستعمال مكينيسيت أثناء الحمل.

- إذا كنتِ حاملاً، تفكرين أنك قد تكونين حاملاً، أو تخططين للحمل، عليكِ استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. قد يلحق مكينيسيت ضرراً بالجنين.
- إذا كنتِ امرأة قد تصبحين حاملاً، عليكِ استعمال وسائل ممانع حمل موثقة بها لمنع الحمل أثناء تناول مكينيسيت وطوال 16 أسبوعاً على الأقل بعد التوقف عن تناوله.
- قد لا تعمل وسائل ممانع الحمل التي تحتوي على هرمونات (مثل أقراص ممانع الحمل، الحقن أو اللاصقات) كما ينبغي إذا تناولتِ مكينيسيت سوية مع دابرافينيب. عليكِ استعمال وسيلة ممانع حمل ناجعة أخرى، بحيث لا تصبحين حاملاً أثناء تناول هذا الدمج من الأدوية. استشيرى الطبيب أو الصيدلي.
- إذا أصبحتِ حاملاً أثناء تناول مكينيسيت، أخبرى الطبيب حالاً.

لا يوصى باستعمال مكينيسيت أثناء الرضاعة

ليس معروفاً فيما إذا كانت مركات مكينيسيت تمر عبر حليب الأم.

إذا كنتِ مرضعة، أو تخططين للرضاعة عليكِ إبلاغ الطبيب.

يوصى بعدم الإرضاع أثناء تناول مكينيسيت. أنتِ والطبيب تقرران إذا كنتِ ستتناولين مكينيسيت أو ترضعين.

الإخصاب - لدى الرجال والنساء

قد يلحق مكينيسيت ضرراً في الإخصاب لدى الرجال والنساء.

تناول مكينيسيت مع دابرافينيب: قد يقلل دابرافينيب الإخصاب لدى الرجال بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تعداد المنى لدى الرجال الذين يتناولون دابرافينيب منخفضاً، وقد لا يعود تعداد المنى لديهم إلى المستويات العادية بعد التوقف عن تناول الدواء.

قبل بدء العلاج بدابرافينيب، تحدث مع الطبيب عن الإمكانيات لتحسين احتمالاتك لولادة أطفال في المستقبل.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية، حول تأثير هذا الدواء على الإخصاب، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

السياقة واستعمال الماكينات

قد تكون هناك أعراض جانبية لمكينيسيت وقد تؤثر في قدرتك على السياقة وتشغيل الماكينات. تجنب السياقة أو تشغيل الماكينات إذا شعرت بتعب أو ضعف، إذا كانت لديك مشاكل في النظر أو مستويات منخفضة من الطاقة.

يمكن العثور على وصف لهذه الأعراض في البنود الأخرى (انظر البندين 2 و 4). اقرأ كل المعلومات في هذه النشرة للحصول على توجيه. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من أية معلومة. قد تؤثر أعراض المرض وحالة العلاج أيضاً في قدرتك على السياقة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، لهذا يعتبر في الواق "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال هذا الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بمكينيسيت. الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المتبعة من مكينيسيت كعلاج وحيد أو بالدمج مع دابرافينيب لدى البالغين هي قرص واحد مقداره 2 ملغ مرة في اليوم. الجرعة المتبعة من دابرافينيب، عند الاستعمال المدمج مع مكينيسيت، هي 150 ملغ، مرتين في اليوم. الجرعة وطريقة العلاج لدى الأطفال والمراهقين سيحددهما الطبيب، فقط.

يُحتمل أن يقرر الطبيب تقليل الجرعة إذا شعرت بأعراض جانبية.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها لأن هذه الخطوة قد تزيد خطر حدوث أعراض جانبية.

كيف يجب تناول الدواء

يجب ابتلاع القرص كاملاً مع كأس مليئة من الماء. لا يجوز مضغ الأقراص، سحقها أو شطرها لأنها مطلية، ولا تتوفر معلومات حول مضغها، سحقها، وشطرها.

تناول مكينيسٲ مرة في اليوم، على معدة فارغة (على الأقل، قبل ساعة من الوجبة أو بعد ساعتين من الوجبة) ويعني هذا:

- عليك الانتظار بعد تناول مكينيسٲ، على الأقل ساعة واحدة قبل تناول الطعام.
- أن عليك الانتظار بعد تناول الطعام، على الأقل ساعتين قبل أن تتناول مكينيسٲ.

عليك تناول مكينيسٲ في ذات الساعة تقريبا من كل يوم.

إذا تناولت جرعة أعلى من مكينيسٲ

إذا تناولت كمية أكبر مما ينبغي من أقراص مكينيسٲ، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. إذا كان ممكنا، اعرض عليهما عبوة الدواء والنشرة.

- إذا تقيأت بعد تناول الدواء، لا تتناول جرعة إضافية. تناول جرعتك التالية في الوقت الاعتيادي.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا مضى أقل من 12 ساعة منذ موعد التناول المحدد، تناول الدواء فور تذكرك.

إذا مضى أكثر من 12 ساعة منذ موعد التناول المحدد، فتخطى هذه الجرعة وتناول الجرعة التالية الخاصة بك في الوقت الاعتيادي. بعد ذلك،

واصل تناول القرص في الأوقات الثابتة كالمعتاد.

يُمنح تناول جرعة مضاعفة تعويضا عن الجرعة المنسية.

يجب المداومة على العلاج تبعا لتوصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

عليك تناول مكينيسٲ طالما أن الطبيب يوصي لك بذلك. لا تتوقف عن تناوله، إلا إذا أوصى لك الطبيب بذلك.

كيف يتعين عليك تناول مكينيسٲ بالدمج مع دابرافينيب

- تناول مكينيسٲ بالدمج مع دابرافينيب وفق توصيات الطبيب تماما. لا يجوز تغيير الجرعة أو التوقف عن تناول مكينيسٲ أو دابرافينيب، إلا إذا أوصى لك الطبيب بذلك.
- تناول مكينيسٲ مرة في اليوم، وداپرافينيب مرتين في اليوم. قد يكون من الأفضل لك أن تعتاد على تناول كلا الدواءين في ذات الوقت كل يوم. يجب تناول مكينيسٲ سوية مع جرعة الصباح من دابرافينيب أو سوية مع جرعة المساء من دابرافينيب. يجب تناول جرعات دابرافينيب بفارق مدته نحو 12 ساعة.
- تناول مكينيسٲ وداپرافينيب على معدة فارغة، على الأقل، قبل ساعة من الوجبة أو بعد ساعتين من الوجبة. يجب تناول القرصين بالكامل مع كأس مليئة بالماء.
- لا يجوز مضغ الأقراص، سحقها أو شطرها لأنها مطلية، ولا تتوفر معلومات حول مضغها، سحقها، وشطرها.

إذا نسيت تناول جرعة دوائية من مكينيسٲ أو دابرافينيب

- مكينيسٲ: إذا ظل أكثر من 12 ساعة حتى الجرعة التالية المخطط لها من مكينيسٲ (التي تؤخذ مرة في اليوم) - تناول الدواء فور تذكرك.
 - دابرافينيب: إذا ظل أكثر من 6 ساعات حتى الجرعة التالية المخطط لها من دابرافينيب (التي تؤخذ مرتين في اليوم) - تناول الدواء فور تذكرك.
- في أية حالة أخرى، استمر في تناول الجرعة التالية في وقتها الاعتيادي. لا يجوز تعويض الجرعات المنسية.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة أعلى من مكينيسٲ أو دابرافينيب توجه إلى الطبيب فوراً، أحضر الدواءين معك، بما في ذلك العبوتين والنشرتين الدوائيتين لكل منهما. إذا ابتل طفل من الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبا عبوة الدواء معك.

إذا اخترت أعراضا جانبية، يُحتمل أن يقرر الطبيب أن عليك تناول جرعة منخفضة أكثر من مكينيسٲ وداپرافينيب. تناول جرعات مكينيسٲ وداپرافينيب كما أوصى لك الطبيب تماما.

يُمنح تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجمي الأدوية، قد يسبب استعمال مكينيسٲ أعراضا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية خطيرة محتملة

حالات قلبية

يمكن أن يؤثر مكنيست في قدرة قلبك على ضخ الدم. من المتوقع أكثر أن يؤثر في أشخاص لديهم مشكلة في القلب. ستحتاج فحوصات لكل مشكلة قلبية محتملة أثناء تناول مكنيست. تشمل علامات وأعراض المشاكل في القلب على:

- شعور بأن القلب ينبض، تسرع القلب أو ضربات قلبية غير منتظمة
- دوخة
- تعب
- إحساس بالدوار
- ضيق في التنفس
- تورم الساقين

أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت هذه الأعراض، سواء حدث ذلك للمرة الأولى أو سواء تفاقمت الأعراض.

ضغط دم مرتفع

قد يؤدي مكنيست إلى ضغط دم مرتفع أو إلى تفاقمه (فرط ضغط الدم). يفحص الطبيب أو الممرضة ضغط الدم خلال العلاج بمكنيست. اتصل بالطبيب فوراً أو بالممرضة إذا عانيت من ضغط دم مرتفع، تفاقم ضغط الدم أو إذا عانيت من صداع شديد، دوخة أو إذا شعرت بدوار.

مشاكل نزيف

يمكن أن يؤدي مكنيست إلى مشاكل نزيف خطيرة، لا سيما في الدماغ أو البطن. اتصل بالطبيب واحصل على مساعدة طبية فورية إذا عانيت من أية علامات نزيف شاذة، بما في ذلك:

- صداع، دوخة، أو ضعف
- سعال دموي أو سعال يحتوي على خثرات دموية
- تقيؤ يحتوي على دم أو يبدو مثل "حبيبات القهوة"
- براز أحمر أو أسود يبدو مثل القطران

مشاكل في العينين (النظر)

يمكن أن يؤدي مكنيست إلى مشاكل في العينين. لا يوصى بتناول مكنيست إذا عانيت ذات مرة من انسداد في الوريد الذي يصرف الدم من العين (انسداد وريد الشبكية). قد يوصي الطبيب بإجراء فحص عيون قبل أن تتناول مكنيست وأثناء تناوله. قد يطلب الطبيب منك التوقف عن تناول مكنيست أو يطلب منك زيارة طبيب اختصاصي إذا تطورت لديك العلامات والأعراض الخاصة بالنظر والتي تشمل على:

- فقدان الرؤية
- احمرار وتهيج العين
- نقاط ملونة أثناء النظر
- هالة (رؤية خطوط هيكلية مشوشة حول الأغراض)
- تشوش الرؤية

تغييرات في الجلد

تم الإبلاغ عن ردود فعل جلدية خطيرة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكنيست بالدمج مع دابرافينيب (وتيرة غير معروفة). إذا اختبرت أحد ما يلي:

- بقعا جلدية لونها ضارب إلى الحمرة، مستديرة أو على شكل لعبة الهدف، مع بثرات في المركز. تقشر الجلد. قروح في الفم، الحنجرة، الأنف، الأعضاء التناسلية والعيون. قد تحدث حالات الطفح الجلدي الخطير هذه بعد حمى وأعراض شبيهة بالزكام (متلازمة ستيفنز جونسون/ Stevens-Johnson syndrome).
- طفح منتشر، حمى وتضخم الغدد الليمفاوية (DRESS-syndrome) أو متلازمة فرط التحسس للأدوية).

← توقف عن استعمال الدواء وتوجه لتلقي مساعدة طبية طارئة.

قد يطور حتى 3 أشخاص من بين كل 100 شخص يتناولون مكنيست بالدمج مع دابرافينيب نوعاً مختلفاً من سرطان الجلد يدعى سرطان الخلايا الحرشفية (*cutaneous squamous cell carcinoma - cuSCC*). وقد يطور الآخرون نوعاً من سرطان الجلد يدعى سرطان الخلايا القاعدية (*basal cell carcinoma - BCC*). تظل هذه التغييرات غالباً في الجلد موضعية ويمكن إزالتها جراحياً، ويمكن متابعة العلاج بمكنيست ودايرافينيب دون أية مشكلة.

قد يختبر أيضاً بعض الأشخاص الذين يتناولون مكنيست بالدمج مع دابرافينيب حدوث حالات ميلانوما جديدة. يمكن إزالة حالات الميلانوما هذه غالباً جراحياً، ويمكن متابعة العلاج بمكنيست ودايرافينيب دون أية مشكلة.

يفحص الطبيب الجلد قبل أن تبدأ بتناول دابرافينيب، ثم يفحصه ثانية كل شهر خلال تناولك دابرافينيب، وكذلك لمدة 6 أشهر بعد أن تتوقف عن تناوله. كل ذلك بهدف البحث عن أية أنواع سرطان جلد جديدة.

يفحص الطبيب أيضا رأسك، عنقك، فمك، والغدد الليمفاوية، وتجتاز أيضا فحوصات مسح للصدر ومنطقة البطن (تدعى مسوحات CT) بشكل ثابت. قد تجتاز فحوصات دم أيضا. تهدف هذه الفحوصات إلى العثور عن أي سرطان، بما في ذلك سرطان الخلايا الحرشفية الذي يتطور في الجسم. يوصى أيضا بإجراء فحوصات الحوض (للنساء) وفحوصات شرجية قبل العلاج وبعد انتهائه.

قد يؤدي مكينيسيت كعلاج وحيد أو بالدمج مع دابرافينيب إلى طفح أو طفح شبيه بحب الشباب. اتبِ تعليمات الطبيب لمعرفة ما عليك القيام به للمساعدة على منع حدوث طفح. أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أحد هذه الأعراض، سواء حدث ذلك للمرة الأولى أو سواء تفاقمت الأعراض.

توجه إلى الطبيب فوراً إذا اختبرت طفح جلدي خطير مصحوب بأي من الأعراض التالية: بثرات جلدية، بثرات أو جروح فموية، تقشر الجلد، حمى، احمرار أو تورم الوجه أو راحتي القدمين.

أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أي طفح جلدي أو إذا تفاقم طفح لديك.

ألم في العضل

قد يؤدي مكينيسيت إلى تفكك العضل (انحلال الريبيدات - rhabdomyolysis). أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض جديدة أو إذا تفاقمت أعراض تشتمل على:

- ألم في العضل
- بول داكن نتيجة ضرر في الكلية

مشاكل في التنفس أو الرئة

قد يؤدي مكينيسيت إلى التهاب الرئة (التهاب الرئة أو مرض رئوي خلالي). أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أية أعراض جديدة أو إذا تفاقمت أعراض مشاكل في الرئة أو في التنفس، تشتمل على:

- ضيق في التنفس
- سعال
- تعب

مشاكل في جهاز المناعة

أخبر الطبيب فوراً إذا كنت تعاني عدة أعراض مثل حمى، انتفاخ الغدد الليمفاوية، كدمات أو طفح جلدي، في الوقت نفسه. يمكن أن تكون هذه مؤشرات لحالة يُنتج فيها جهاز المناعة أكثر مما ينبغي خلايا تحارب العدوى التي تسمى المنسجات والخلايا الليمفاوية وهذا يمكن أن يتسبب في حدوث أعراض متنوعة (haemophagocytic lymphohistiocytosis)، انظر البند 2 (شيوخ نادر).

متلازمة انحلال الورم (Tumour lysis syndrome)

أخبر الطبيب فوراً إذا شعرت بالأعراض التالية: غثيان، ضيق تنفس، نبض غير منتظم، تشنجات العضلات، اختلاجات، تعكر البول، انخفاض إدرار البول والتعب. قد تكون هذه الأعراض مؤشرات لحالة ناتجة عن التحلل السريع للخلايا السرطانية والتي قد تكون فتاكة لدى بعض الأشخاص (متلازمة تحلل الورم أو TLS)، انظر البند 2 (وتيرة غير معروفة).

أعراض جانبية قد تحصل لدى متلقي العلاج الذين يتناولون مكينيسيت كعلاج وحيد

أعراض جانبية قد تختبرها عندما تتناول مكينيسيت كعلاج وحيد هي:

أعراض جانبية شائعة جدا (قد تحدث لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10):

- ضغط دم مرتفع
- نزيف في مناطق مختلفة من الجسم، قد يكون طفيفاً أو خطيراً
- سعال
- ضيق في التنفس
- إسهال
- غثيان، تقيؤ
- إمساك
- ألم في البطن
- جفاف الفم
- طفح جلدي، طفح شبيه بحب الشباب، احمرار الوجه، جلد جاف أو حاك (انظر أيضا "تغييرات جلدية" في بداية البند 4)
- تساقط أو ترقق الشعر بشكل شاذ
- نقص الطاقة أو إحساس بالضعف أو التعب
- تورم اليدين أو كفتي القدمين (وذمة محيطية)
- حمى

أعراض جانبية شائعة جدا قد تظهر في فحوصات الدم
• نتائج غير سليمة في فحوصات الدم المتعلقة بالكبد

أعراض جانبية شائعة (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- التهاب بصيالات الشعر في الجلد
- مشاكل في الأظافر مثل تغييرات في فراش الظفر، ألم في الظفر، عدوى وتورم في ثنايا الجلد حول الظفر
- عدوى في الجلد (cellulitis)
- طفح جلدي، مَثَثرات مليئة بالقبح (انظر أيضا "تغييرات جلدية" في بداية البند 4)
- رد فعل تحسسي (فرط التحسس)
- جفاف (مستويات منخفضة من الماء أو السوائل)
- تشوش الرؤية
- تورم حول العينين
- مشاكل في النظر (انظر أيضًا "مشاكل في العينين (النظر)" في بداية البند 4)
- تغييرات في الطريقة التي يضح فيها القلب الدم (قصور عمل البطين الأيسر في القلب) (انظر أيضا "حالات قلبية" في بداية البند 4)
- وتيرة نظم قلب منخفضة أكثر من المعتاد و/أو انخفاض وتيرة نظم القلب
- تورم موضعي في الأنسجة
- التهاب الرئة (التهاب الرئة أو التهاب رئوي خلالي)
- ألم في الفم أو قروح فموية، التهاب في الأنسجة المخاطية
- احمرار، تمزق أو شقوق في الجلد
- احمرار وألم في راحتي القدمين واليدين
- تورم الوجه
- التهاب الأغشية المخاطية
- شعور بالضعف
- تضرر الأعصاب الذي قد يسبب ألمًا أو فقدان الإحساس أو وخز في اليدين وكفات القدمين و/أو ضعف العضلات (اعتلال عصبي محيطي)

أعراض جانبية شائعة قد تظهر في فحوصات الدم

- انخفاض تعداد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، نتائج شاذة في قيم الكرياتينين وفسفوكيناز (إنزيم موجود تحديدا في القلب، الدماغ، وعضلات الهيكل العظمي).

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- تورم العين بسبب تسرب سائل (اعتلال المشيمية والشبكية – chorioretinopathy) (انظر أيضًا "مشاكل في العينين (النظر)" في بداية البند 4)
- تورم الأعصاب في الجزء الخلفي من العين (وذمة حلزمة العصب البصري – Papilloedema) (انظر أيضًا "مشاكل في العينين (النظر)" في بداية البند 4)
- انفصال الغشاء الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) عن الطبقات الداعمة له (انفصال الشبكية) (انظر أيضًا "مشاكل في العينين (النظر)" في بداية البند 4)
- انسداد الوريد الذي يصرف الدم من العين (انسداد وريد الشبكية) (انظر أيضًا "مشاكل في العينين (النظر)" في بداية البند 4)
- انخفاض نجاعة قدرة القلب على الضخ ما يؤدي إلى ضيق في التنفس، تعب متطرف، وتورم الكاحلين والساقين (قصور في عمل القلب)
- ثقب (انتقاب) في المعدة أو الأمعاء
- التهاب الأمعاء الغليظة (colitis)
- انحلال العضل الذي قد يؤدي إلى ألم في العضل وضرر في الكلية (انحلال الريبيدات – rhabdomyolysis)

أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد توأثرها بعد):

- عدم انتظام النبض (إحصار أذيني بطيني - atrioventricular block)

الأعراض الجانبية عند تناول مكينيست ودابرافينيب معا

عندما تتناول مكينيست ودابرافينيب معا، فقد تختبر كل واحد من الأعراض الجانبية الواردة في القوائم أعلاه، رغم أن وتيرة شيوعها قد تتغير (ترتفع أو تنخفض).

قد تعاني أيضا من أعراض جانبية إضافية تظهر في القائمة أدناه، وذلك بسبب تناول دابرافينيب سوية مَثَث مكينيست. أخبر الطبيب في أسرع وقت إذا اختبرت أحد هذه الأعراض، سواء حدث ذلك للمرة الأولى أو سواء تفاقمت الأعراض.

يرجى أن تقرأ النشرة في عبوة دابرافينيب للحصول على تفاصيل حول الأعراض الجانبية التي قد تختبرها أثناء تناول هذا الدواء.

الأعراض الجانبية التي قد تختبرها بينما تتناول مكينيسيت بالدمج مع دابرافينيب:

أعراض جانبية شائعة جدا (قد تحدث لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10):

- التهاب الأنف والحنجرة
- انخفاض الشهية
- صداع
- دوخة
- ضغط دم مرتفع
- نزيف في مناطق مختلفة من الجسم، قد يكون طفيفا أو خطيرا (كدمة)
- سعال
- ألم في البطن
- إمساك
- إسهال
- غثيان، تقيؤ
- طفح، جفاف الجلد، حكة، احمرار الجلد
- آلام في المفاصل، آلام في العضلات، أو ألم في اليدين أو راحتي القدمين
- تقلص العضلات
- شعور بالضعف، نقص الطاقة
- قشعريرة
- تورم اليدين أو كفتي القدمين (وذمة محيطية)
- حمى
- مرض شبيه بالانفلونزا

أعراض جانبية شائعة جدا قد تظهر في فحوصات الدم:

- نتائج شاذة في فحوصات الدم المتعلقة بالكبد

أعراض جانبية شائعة (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- تلوث في جهاز البول
- تأثيرات جلدية تشمل على عدوى الجلد (cellulitis)، التهاب بصيلات الشعر في الجلد، مشاكل في الأظافر مثل تغييرات في فراش الظفر، ألم في الظفر، عدوى وتورم في ثنايا الجلد حول الظفر، طفح جلدي مع بثرات كاملة متقبة، سرطان الخلايا الحرشفية (نوع من سرطان الجلد)، ورم حليمي (نوع من سرطان الجلد لا يكون ضارا غالبا)، أورام شبيهة بالتؤلؤل، فرط حساسية الجلد للشمس (انظر أيضا "تغييرات جلدية" في بداية البند 4)
- جفاف (مستويات منخفضة من الماء أو السوائل)
- تشوش الرؤية، مشاكل في الرؤية، التهاب العين (uveitis)
- انخفاض نجاعة قدرة القلب على الضخ
- ضغط دم منخفض
- تورم موضعي في الأنسجة
- ضيق في التنفس
- جفاف الفم
- ألم في الفم أو قروح فموية، التهاب في الأنسجة المخاطية
- مشاكل شبيهة بحب الشباب
- زيادة سماكة طبقة الجلد الخارجية (hyperkeratosis)، بقع جلدية سميكة، ذات قشرة أو غير ملساء (التقران السفعي [actinic keratosis])، شقوق جلدية أو تمزق الجلد
- تعرق مفرط، تعرق ليلي
- تساقط أو ترقق الشعر بشكل شاذ
- احمرار وألم في اليدين وكفتي القدمين
- التهاب الطبقة الدهنية أسفل الجلد (panniculitis)
- التهاب الأغشية المخاطية
- تورم الوجه
- تضرر الأعصاب الذي قد يسبب ألما، فقدان الإحساس أو وخز في اليدين وكفاتي القدمين و/أو ضعف العضلات (اعتلال عصبي محيطي)

أعراض جانبية شائعة قد تظهر في فحوصات الدم:

- مستويات منخفضة من خلايا الدم البيضاء

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، انخفاض تعداد الصفائح الدموية (خلايا تساعد على تخثر الدم) وانخفاض نوع من خلايا الدم البيضاء (leukopenia)
- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (hyponatremia) أو فوسفات (hypophosphatemia) في الدم
- ارتفاع مستوى السكر في الدم
- ارتفاع مستوى الكرياتين فوسفوكيناز (creatin phosphokinase)، إنزيم موجود تحديداً في القلب، الدماغ، وعضلات الهيكل العظمي
- ارتفاع الإنزيمات التي ينتجها الكبد

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- ظهور سرطان جلد جديد (ميلانوما)
- ثآليل معلقة (skin tags)
- ردود فعل تحسسية (فرط التحسس)
- تغييرات جلدية تشتمل على تورم العين بسبب تسرب سائل (اعتلال المشيمية والشبكية – chorioretinopathy)، انفصال الغشاء الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) عن الطبقات الداعمة له (انفصال الشبكية) وتورم حول العينين
- وتيرة نظم قلب منخفضة أكثر من المعتاد و/أو انخفاض وتيرة نظم القلب
- التهاب الرئة (pneumonitis)
- التهاب البنكرياس
- التهاب الأمعاء (colitis)
- قصور عمل الكلى
- التهاب الكلى
- مرض التهابي يؤثر تحديداً في الجلد، الرئتين، العينين، والغدد الليمفاوية (ساركويد)
- عدم انتظام النبض (إحصار أذيني بطيني - atrioventricular block)
- بقع جلدية أو جروح مرتفعة، مؤلمة، حمراء حتى تميل للأحمر - بنفسجية داكنة، تظهر بالأساس في اليدين، الرجلين، الوجه والعنق، مصحوبة بالحمى (علامات على الجلاد النويتروفيلي الحموي الحاد - acute febrile neutrophilic dermatosis)

أعراض جانبية نادرة (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- ثقب (انتقاب) في المعدة أو الأمعاء

أعراض جانبية وتيرة شيوعها غير معروفة (أعراض لم يُحدّد شيوعها بعد):

- التهاب عضل القلب (myocarditis) الذي قد يتجلى بضيق في التنفس، حمى، ضربات قلب وألم في الصدر
- التهاب الجلد، تقشر الجلد (exfoliative dermatitis)
- ردود فعل جلدية موضعية في منطقة الوشم

الأعراض الجانبية الشائعة جداً لدى الأطفال عند تناول مكينيسيت سوية م □ دابرأفنيب:

- حمى
- طفح
- تقبؤ
- تعب
- جلد جاف
- سعال
- إسهال
- حبُّ الشَّبَاب
- صداع
- ألم بطن
- غثيان
- نزيف
- إمساك
- التهاب الجلد حول الأظافر في اليدين أو الساقين
- آلام في العضلات والعظام
- دوام
- عدوى في الطرق التنفسية العلوية
- زيادة الوزن
- تقرحات في تجويف الفم
- ألم الحنجرة

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال عند تناول مكينيسيت ودابرأفينيب معاً:

- اعتلال عصبي محيطي
- صلابة
- ألم في الفك
- انخفاض الشهية
- قلق
- نبض قلب غير منتظم (إحصار أذيني – بطيني - atrioventricular block)

شذوذ يمكن أن يظهر في فحوصات الدم لدى الأطفال عند تناول مكينيسيت ودابرأفينيب معاً:
كيمياء الدم:

- مستوى سكر مرتفع في الدم
- مستوى منخفض من الألبومين
- مستوى منخفض من الكالسيوم
- انخفاض مستوى الفوسفات
- انخفاض مستوى المغنيزيوم
- ارتفاع مستوى المغنيزيوم
- مستوى مرتفع من الصوديوم
- انخفاض مستوى الصوديوم
- مستوى منخفض من البوتاسيوم
- مستوى مرتفع من البوتاسيوم

الكبد:

- ارتفاع في ناقلة أمين الأسيرتات
- ارتفاع في ناقلة أمين الألاتين
- ارتفاع الفوسفاتاز القلوي
- ارتفاع البيليروبين

أمراض الدم:

- انخفاض مستوى الهيموغلوبين
- فقر دم
- انخفاض في مستوى الصفيحات في الدم
- انخفاض في مستوى خلايا الدم البيضاء
- ارتفاع في مستوى خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية)

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

5. كيف يُخزّن الدواء؟

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

كذلك بالإمكان إبلاغ شركة نوفارتيس عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: safetydesk.israel@novartis.com

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنّى استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من ذات الشهر المُشار إليه.

شروط التخزين: يجب التخزين بالتبريد (2°C حتى 8°C).

يُحتفظ به في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة.

احتفظ بالقنبنة مغلقة بإحكام مّا ماص الرطوبة في داخلها (عبوة أسطوانية صغيرة).

بعد فتح القنبنة للمرة الأولى: يجب الاحتفاظ بها بدرجة حرارة أقل من 30°C واستعمالها خلال 30 يوماً.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في النفايات المنزلية. استشر الصيدلي لمعرفة كيف يمكنك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

لب القرص:

Mannitol (E421), Microcrystalline cellulose (E460), Hypromellose (E464), Croscarmellose sodium (E468), Magnesium stearate (E470b), Sodium lauryl sulfate, Colloidal silicon dioxide (E551)

طلاء قرص 0.5 ملغ

Hypromellose (E464), Titanium dioxide (E171), Polyethylene glycol, Iron oxide yellow (E172)

طلاء قرص 2 ملغ

Hypromellose (E464), Titanium dioxide (E171), Polyethylene glycol, Polysorbate 80 (E433), Iron oxide red (E172)

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص مطلية من مكينيس 0.5 ملغ لونها أصفر، بيضوية ومحدبة من كلا الجانبين، وعليها شعار الشركة في جانب واحد والكتابة 'TT' في الجانب الآخر.
أقراص مطلية من مكينيس 2 ملغ لونها وردي، مستديرة ومحدبة من كلا الجانبين، وعليها شعار الشركة في جانب واحد والكتابة 'LL' في الجانب الآخر.
تسوق الأقراص المطلية في قنن بلاستيكية قاتمة اللون، بيضاء مغطاة بلاستيكي.
تحتوي قنينة واحدة على 30 قرصاً.
تحتوي القناني أيضاً على جل السيليكا الماص للرطوبة في وعاء أسطواني صغير. يجب الاحتفاظ بـ الماص الرطوبة في القنينة ولا يجوز ابتلاعه.

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 9240، تل أبيب.

تم تحريرها في كانون الأول 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

مكينيس 0.5 ملغ: 154 95 34309

مكينيس 2 ملغ: 154 96 34322

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.