

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סלאטאק ג'ל

חומרים פעילים

חומצה סליצילית 12%, חומצה לקטית 4% (salicylic acid 12%, lactic acid 4%)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים אחרי 12 שבועות.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להסרת יבלות וירליות, יבלות והתקשיות עור בצורת יבלות. החומרים הפעילים גורמים לריכוך ולהמסת העור הקרני של היבלת.

קבוצה תרפויטית: שילוב קרטוליטי של חומרים פעילים.

- **יבלות וירליות על העור ובסוליית כף הרגל** הן גידולים קטנים של עור עודף הנגרמים מנגיף מסוים. יבלות וירליות מופיעות על פי רוב באצבעות או בגב כפות הידיים. ניתן לזהות יבלת נפוצה על ידי מראה "דמוי כרובית" על פני שטח היבלת. יבלות וירליות בכף הרגל מופיעות רק בסוליית כף הרגל. הן יכולות להיות מכאיבות, ובמקרים רבים נראות כמו טבעת עור לבנה קטנה עם נקודה שחורה במרכזה. הנגיף מידבק מאוד. זה אומר שיבלות וירליות יכולות לגדול ולהתפשט, במיוחד אם לא מטפלים בהן. הנגיף יכול גם לעבור מאדם לאדם.

- **יבלות והתקשיות עור בצורת יבלות** הן אזורים של עור קשה ועבה הנגרמות מלחץ או חיכוך. הן נגרמות בדרך כלל בכפות הרגליים עקב נעליים לא מתאימות. הן יכולות להופיע גם בכפות הידיים.

החומרים הפעילים עובדים על ידי:

- ריכוך העור הקשה, כך שקל יותר להסיר אותו עם אבן ספוגית או פצירת ציפורניים;
- הם גם מסייעים בקטילת הנגיף שגורם ליבלות בעור ובכף הרגל.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (חומצה סליצילית, חומצה לקטית) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת המרכיבים הבלתי פעילים בפרק 6).
- על או בקרבת הפנים, בית שחי, שדיים, הישבן ובאזור איברי המין.
- על כתמי לידה, שומות, יבלות שעירות או על כל כתם אחר.
- אם אתה חולה סוכרת או סובל מאספקת דם ירודה לכפות הידיים והרגליים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם אתה לא בטוח שיש לך יבלת/התקשות עור שמתאימה לטיפול באמצעות סלאטאק ג'ל - שאל את הרופא או הרוקח לפני תחילת הטיפול.

- יש למרוח את הג'ל **בזהירות רק** על היבלת באמצעות לחיצה על השפופרת **בעדינות רבה:**

- יש להימנע ממגע הג'ל עם עור בריא המקיף את היבלת, במיוחד בעור העדין של ילדים צעירים, מכיוון שעלול להיגרם גירוי. אם הג'ל נוגע בטעות בעור בריא, יש לנקות מייד עם טישו ובמידת הצורך לשטוף את האזור.

- **אל תשתמש בכמות רבה מדי של הג'ל.**

- יש להימנע ממגע עם העיניים, אף, פה, עור פצוע, חתכים ושריטות. אם הג'ל נכנס בטעות לעיניים או לפה עלול להיגרם נזק. יש לשטוף את העיניים או הפה בהרבה מים. אם שוטפים עין אחת, יש להקפיד להימנע משטיפת התכשיר לתוך העין השנייה. אחר כך פנה לטיפול דחוף בבית החולים.

- **הימנע משפיכה** של החומר משום שעלול להיגרם נזק לך, לבגדיך ולרכושך (ראה פרק 4):
 - אל תקפל את השפופרת כי זה עלול לפגוע בה ולגרום לה לדלוף.

- התרופה נדיפה ודליקה מאוד. אין להשתמש בתרופה סמוך ללהבות או למקורות הצתה (כגון סיגריות דולקות או כל דבר אחר שעלול להצית את התרופה). אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיר.
 - יש להימנע משאיפת התכשיר.
- אם שאפת כמות גדולה מהאדים של הג'ל, ייתכן שזה יגרום לך לתחושת עילפון. אם זה קורה, שאף הרבה אוויר צח.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. לא ידוע כי תכשיר זה משפיע על תרופות אחרות או מושפע מהן.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

אין להשתמש בסלאטאק ג'ל במהלך ההיריון, למעט טיפול קצר טווח ביבלת וירלית קטנה אחת, ביבלת או בהתקשות עור בצורת יבלת. צורות פומיות (כגון טבליות) של קבוצת תכשירים זו יכולות לגרום לתופעות לוואי בעובר. לא ידוע אם אותם הסיכונים רלוונטיים לסלאטאק ג'ל כאשר נעשה בו שימוש על פני יבלות וירליות, יבלות והתקשיות עור בצורת יבלות.

נהיגה ושימוש במכונות

לא ידוע כי שימוש בתכשיר זה משפיע על היכולת לנהוג או על השימוש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה כ-0.30 גרם אלכוהול (אתנול) ב-1 גרם ג'ל, ששווה ערך לריכוז של 31% w/w, ועלולה לגרום לתחושת צריבה במריחה על עור פגוע.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא פעם ביום בעקביות, בדרך כלל בערב לפני השינה, עד לריפוי הסופי.

אופן השימוש:

כיצד יש לטפל ביבלת ובהתקשות עור בצורת יבלת?

1. הסר כל אגד מדבק.
 2. רחץ את האזורים הנגועים, השרה במים חמים למשך 2-3 דקות.
 3. יבש את האזור היטב במגבת אישית.
 4. מרח 1-2 טיפות מהג'ל ישירות על היבלת. המתן עד להיווצרות קרום על היבלת. הקרום יופיע תוך פרק זמן קצר לאחר התייבשות החומר. שים לב ומנע את מגע הג'ל עם העור שמסביב ליבלת. אין צורך לכסות באגד מידבק.
 5. הסר למחרת בערב בזהירות את הקרום שנוצר מהטיפול בערב הקודם. חזור שנית על הטיפול.
 6. אחת לשבוע לפני הטיפול שפשף בעדינות את האזור המטופל על ידי שימוש בפצירת הציפורניים המצורפת לאריזה או באבן ספוגית, ואחר כך המשך בטיפול.
- זכור: יש להתמיד ולהשתמש בסלאטאק ג'ל עד להיעלמותן המוחלטת של היבלות. הסרת יבלות וירליות יכולה להימשך עד 12 שבועות.
- הערה: לפני פתיחת השפופרת, החזק אותה במצב אנכי עם הפתח למעלה למשך 30 שניות. פתח את המכסה, הסר את הצווארון האדום והשלך אותו באופן בטוח. הפוך את המכסה ונקב באמצעותו את פתח השפופרת. סגור באמצעותו את השפופרת היטב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שים לב:

- אין לבלוע!
- תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם שכחת ליטול את התרופה:

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסלאטאק ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

- בעת השימוש בג'ל אתה עלול להרגיש תחושת עקצוץ קלה ו/או רגישות קלה באזור המטופל. תחושה זו בדרך כלל זמנית, ובמקרים נדירים עלולה להופיע כפגם זמני בעור.
- אם בטעות התאפשר לג'ל להתפשט ולהישאר במגע עם אזורים של עור בריא (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בפרק 2), עלול להיגרם גירוי.
- שפיכה של התרופה על בגדים, בדים, תכשיטים, מתכות או משטחים מלוטשים, עלולה לפגוע בהם לצמיתות.

הפסק את השימוש וספר לרופא או לרוקח אם אתה חש אי נוחות בלתי נסבלת או אם הגירוי מתמשך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה ועל גבי התווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

אין לאחסן מעל 25°C.

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן נדרשות עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

זהירות! חומר דליק, הרחק מאש! ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בפרק 2. יש לסגור היטב את השפופרת באמצעות המכסה, עם סיום השימוש.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Ethyl acetate, ethanol (96%), pyroxylin (contains isopropyl alcohol as a damping solvent), camphor

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

ג'ל שקוף, חסר צבע.

התרופה משווקת בשפופרת המכילה 8 גרם של ג'ל. לשפופרת יש מוליך מיוחד. כל אריזה כוללת גם פצירה לציפורניים.

בעל הרישום וכתובתו: תרופא שיווק 1985 בע"מ, פארק תעשיות פולג, ת.ד. 8105, אזור תעשייה דרום נתניה

שם היצרן וכתובתו: מעבדות דרמל בע"מ, גוסמור, הרטס, אנגליה.

נערך בדצמבר 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 053-62-26348

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.