

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة**

**(مستحضرات) 1986**

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبية

## أكامول تصينون وشبّاعَت لليل

## حيسولات التريكية

تحتوي كل حيسولة على:

پاراسيتامول 500 ملغ

پيسودو إيفيرين هيدروكلوريد 30 ملغ

ديكستروميثورفان هيدروبروميد 15 ملغ

كلورفينيرامين ماليات 2 ملغ

Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg
Chlorpheniramine maleate 2 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرقية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية"

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. يجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام.

هذا الدواء مخصص للبالغين وللأولاد من سن 12 عاماً فما فوق.

### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الزكام، السعال واحتقان الأنف، التي تصحبها الحمى والالام - للعلاج في الليل.

**الفصلية العلاجية:**

پاراسيتامول - مسكّن للآلام وخافض للحرارة.

پيسودو إيفيرين - مخفف لاحتقان الأنف.

ديكستروميثورفان - كابئ للسعال.

كلورفينيرامين - مضاد للهيستامين.

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال هذا الدواء:**

- لا تستعملي الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.
- إذا كانت لديك حساسية (أرجية) لپاراسيتامول، لپيسودو إيفيرين، لديكستروميثورفان، لكلورفينيرامين، لمضاد آخر للهيستامين أو لمزليات أخرى للاحتقان، أو لأحد مركبات الدواء الأخرى (انظر البند 6).
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بأدوية من فصيلة منبّهات منو أمين أوكسيداز (MAOI) (للاكتئاب) أو بالأدوية المضادة لمنو أمين أوكسيداز الكوسمة (RIMAS) أو خلال 14 يوماً منذ إيقاف العلاج بها.
- إذا كنت تستعمل الأدوية المنبّهة لاسترداد السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو الفلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية نفسية، أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الباركنسون.
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بمزيلات احتقان أخرى، أدوية إضافية للسعال والزكام.
- إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتا لعلاج مشاكل القلب.
- إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جداً (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مرضية من السكتة الدماغية.
- إذا وُجد لديك سكري.
- إذا كنت ولداً عمرك دون الـ 12 عاماً.
- بالتزامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تستعمله يحتوي على پاراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما - زرق).
- إذا وُجد لديك مرض كلوي حاد (فجائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكليتين.
- إذا كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).
- إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية، أو أدوية للربو (الأدوية المحاكية للودية).
- إذا وُجد لديك ثلوث في الصدر، تفاقم في الربو أو مشاكل تنفسية خطيرة.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

- تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أقباع استعمال أدوية تحتوي على پيسودو إيفيرين. PRES وRCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بتزايد دموي متدنّ للدماغ. توقف فوراً عن استعمال أكامول تصينون وشبّاعَت لليل وتوجه لتلقي المساعدة الطبية الفورية إذا نشأت لديك أعراض يمكن أن تكون علامات لـ PRES أو RCVS (للاطلاع على الأعراض انظر البند 4 "أعراض جانبية محتملة").
- إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.
- يجتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً للكبد عندما:
  - يُعطى بجرعة نوانية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة متواصلة.
  - يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
  - يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الآلام أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة النوانية أو التسمم من پاراسيتامول. يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت على وشك الخضوع لفحوص مخبرية، لأن العلاج بالدواء قد يؤثر على النتائج.
- لا يجوز استعمال أدوية إضافية من "فصلية أكامول" وأو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول. يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- إذا وُجدت لديك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.
- استعمال هذا الدواء بشكل دائم لفترة زمنية طويلة قد يسبب الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو منكوّر في هذه النشرة. العلامات المحتملة للإدمان على هذا الدواء:
  - تحتاج إلى استعمال الدواء لمدة أطول مما أوصى به.
  - تشعر بالحاجة إلى استعمال جرعة أعلى من الجرعة الموصى بها.
  - تستعمل الدواء لما لا يتناسب مع دواعي الاستعمال.
  - عندما تتوقف عن استعمال الدواء تشعّر بأنك لست على ما يرام، وتبحسن شعورك بعد أن تستعمل الدواء مجدداً.
- إذا لاحظت وجود إحدى هذه العلامات، فمن المهم أن تكلم الطبيب المعالج أو الصيدلي.
- قبل العلاج بأكامول تصينون وشبّاعَت لليل، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:**
  - مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشريان التاجي - انسداد الشرايين أو الأوردة)
  - مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: ربو، التهاب القصبات، سعال متواصل، سعال مصحوب بالحمى، بالطفح أو بالصداع المتواصل أو أي مشكلة أخرى في الرئتين
  - مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
  - خلل في وظيفة الكلية
  - مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (يسبب التبول بوتيرة عالية)
  - خلل في وظيفة الغدة الدرقية (ثيرويد)
- كنت مدمنًا الآن أو قد أمتدت في الماضي على الأفيونات، الكحول، أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المخدرات غير القانونية
- عانيت مؤخرًا من أعراض انسحاب الكحول أو المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرّج أو ارتجاجات
- صرع

- يرقان

خلال فترة استعمال الدواء، أخبر طبيبك فورًا إذا:

كنت تعاني من مرض يشعل يشمل الاختلال الكلوي الخطير أو الإبتان (حالة تتجول فيها الجراثيم وسومها في التيار الدموي وتؤدي إلى ضرر في الأعضاء)، سوء التغذية، الحولية الزمنة، أو إذا كنت تستعمل أيضاً فولوكساسيلين (مضاد حيوي). تم الإبلاغ عن حالة خطيرة تسمى الحماض الاستقلابي (اختلال في الدم وفي سوائل الجسم) لدى المرضى في هذه الحالات عندما استعملوا پاراسيتامول بالجرعة المتبّعة لفترة مطولة أو عندما استعملوا پاراسيتامول بالدمج مع فولوكساسيلين. قد تشتمل أعراض الحماض الاستقلابي على: صعوبات تنفسية شديدة مع تنفس عميق وسريع، نعاس، إحساس بالغثيان وتقيؤات. **التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية وفييتامينات، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواءً من الفصائل التالية، أو إذا أنبهت للتو علاجًا بهذه الأدوية:

- أدوية مضادة للكلولين (علاج للتشنجات والتقلصات، مثل الأتروپين)
- أدوية منبّهة لاسترداد السيروتونين انتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو الفلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")
- أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصةً وارفارين
- أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك منبّهات MAO).
- RIMAS** - لانظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء") أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأمراض النفسية، للباركنسون، أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")
- ميكلوزيمبيد - دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية أخرى مضادة للهيستامين بما في ذلك الأدوية المضادة للسعال والزكام (مثل: أدوية أخرى مضادة لاحتقان الأنف، انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء") والتي تسبب لك شعورًا بالنعاس
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جرانيتينيد، ميثل دوبا، adrenergic neuron blocker، ديبيريسوكوين، بريتيليم وبيتاندين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا - انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")
- مستحضرات تحفز عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: الباربيورات)
- أدوية مضادة للتشنجات (علاج الصرع) مثل: فينيوتوين، كاربامازيبين
- ميثوكلوراميد أو دومبيريدون (علاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم)
- كلورامفينيكول أو ريفامبيسين (مضاد حيوي)
- بروبينيسيد (علاج الفرس)
- كوليستيرامين (للتقليل فرط الدهون في الدم)
- مستحضرات مضادات الالتهاب الالستيرويدية
- أدوية للفلق وللوم
- حبوب منع الحمل
- أدوية لعلاج الصداع النصفي - الميجرينا Ergot (alkaloids)
- جليكوزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب، أو قصور القلب، مثل ديجوكسين)
- أدوية لمشاكل القلب مثل: جرانيتينيد وأميدوارون
- أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم)
- تيريبينافين لعلاج التلوثات الفطرية
- سينكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي
- ميثادون لعلاج الألم الشديد
- فولوكساسيلين flucloxacillin (مضاد حيوي)، بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم وفي السوائل (الحماض الاستقلابي) مما يستوجب العلاج المستعجل (انظر البند 2)

إذا كنت تستعمل سويًا مع أكامول تصينون وشبّاعَت أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، فقد تنشأ لديك تغيرات نفسية (مثل: هياج نفسي، هلوسات، غيبوبة)، وأعراض إضافية مثل: حتى فوق 38 درجة مئوية، ازدياد في وتيرة القلب، ضغط دم غير مستقر، منعكسات مبالغ فيها، تصلب العضلات، انعدام التنسيق الحركي و/أو أعراض ترتبط بالمعدة والأمعاء (غثيان، تقيؤات، إسهال).

**استعمال الدواء والطعام**

يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام.

**استعمال هذا الدواء واستهلاك الكحول**

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك الكحول بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

**الحمل والإرضاع**

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

**السياسة واستعمال الماكنات**

لا يجوز السياسة أو تشغيل الماكنات الخطرة خلال فترة استعمال الدواء لأن هذا الدواء قد يخل باليقظة، قد تشعّر بالنعاس، بالدوار أو بنشوش الزكام. بالنسبة للأولاد، فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

**الاستعمال لدى الأولاد**

هذا الدواء مخصص للأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

**معلومات إضافية**

تكمن في المادة الفعالة پيسودو إيفيرين إمكانية معاقتها. الجرعة الدوائية الممزّدة قد تكون سامة. قد يؤدي الاستعمال المطول إلى تناول جرعة أعلى من الموصى بها من أجل بلوغ التأثير المطلوب، وبالتالي يؤدي إلى تزايد خطر التعرض لفرط الجرعة الدوائية. يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية ومدة العلاج الموصى بهما (انظر البند 3).

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**
تحتوي كل حيسولة على 0.588-0.882 ملغ من الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الحيسولة، ولذلك يُعتبر خاليًا من الصوديوم.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.
**الجرعة الدوائية المتبّعة عادةً في:**
اليافعون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا: 2-1 حيسولات قبل النوم.

**عند الاستعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشبّاعَت**
للنهار يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حيسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. (عند الاستعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار، يجب استبدال جرعة من أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار بجرعة من أكامول تصينون وشبّاعَت لليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية الفصوى الموصى بها أعلاه من أكامول تصينون وشبّاعَت لليل).

**المرضى الذين عمرهم فوق 60 عامًا:** يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنه قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها:**
**يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقت علامات المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.**

**كيفية الاستعمال**

لا يجوز المضغ! يمكن شطر الحيسولة في خط الشطر.

يجب بلع الحيسولة مع كأس ماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معه.
حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر تطوّر ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية: الغثيان والتقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، آلام البطن، الانتفاخ، التعرّج المتزايد، الألم أو الحساسية في الجزء العلوي من البطن. من المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضرر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-ارادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التنسيق الحركي، اضطراب نفسي شديد مصحوب بالهلوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء، فتناول الجرعة القادمة حسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية عن استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نشوء أعراض جانبية. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

**أعراض جانبية خطيرة**

**يجب إيقاف العلاج بشكل فوري والتوجه لتلقّي العلاج الطبي المستعجل:**

إذا تطوّرت لديك أعراض يمكنها أن تكون علامات لمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS). تشتمل العلامات على:

- ظهور فجائي لصداع خطير
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- اختلاجات
- تغيرات في الرؤية

**يجب إيقاف العلاج والتوجه فورًا إلى الطبيب:**

إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل: الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق و/أو الأطراف مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع قد يؤدي لپاراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أمراض جلدية حادة قد تكون علاماتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحويصلات، التضضر الجلدي الموسع. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض حساسية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري

- انزعاج في البطن
- دوار، نعاس، ارتباك
- هلوسات (نادر) (سماع أصوات ورؤية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية)
- مشكلة في التبول، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة في غدة البروستاتا
- إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الدموي مثل: تعب غير مفسر، حالات نازف إلى ظهور فقر الدم، ظهور كدمات، نشوء التهابات بسهولة أكبر
- نظم قلبي غير منظم، ضغط في الصدر
- آلم فجائي وخطير في البطن أو نزيف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كاف
- انخفاض في جريان الدم إلى القلب مما قد يسبب الذبحة الصدرية (انزعاج أو ألم في الصدر، الرقبة، الظهر، الكف، الكتفين، الذراعين) أو النوبة القلبية
- سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلم)
- ثوران فجائي للحمى، احمرار الجلد، أو بثور صغيرة عديدة (أعراض محتملة لـ Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - AGEP) والتي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا المستحضر
- فقدان فجائي للصر
- مشاكل في الكبد بما في ذلك اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)
- انعدام التنسيق الحركي
- ارتباك لدى المسنين

**أعراض جانبية إضافية:**

**أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين**

**أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10 مستعملين**

- صعوبات في النوم، عصبية، دوار

**أعراض جانبية مدى شوبوها غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها مدى شوبوها بعد)**

حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) و

- قلق، شعور بعدم الهدوء، تهيجيّة، تؤثر أو شعور بالسعادة المنطرفة
- اضطرابات في النوم
- نضض سريع أو غير منظم أو خفقان القلب
- نعاس
- صعاب دم مرتفع
- آلم البطن، إسهال، تقيؤ
- آلم عند التبول
- تتميل في راحتي اليدين والقدمين
- ارتجاج

انخفاض في التيار الدموي إلى العصب البصري (Ischaemic optic neuropathy)

الاعتماد والإدمان - عند إيقاف استعمال الدواء قد تشعّر بأعراض الانسحاب، التي تشتمل على: شعور بعدم الهدوء، صعوبات في النوم، تهيجيّة، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤات وغثيان، إسهال، ارتجاج، تعرّج

تعب

جفاف الفم، انعدام الشهية، حرقة المعدة

كوابيس، اكتئاب، انخفاض ضغط الدم، طفح جلدي، حساسية للضوء، غثيان، تزايد لزوجة المخاط (قد يسبب السعال أو الالهم)

طين في الأنئين، نشوش الرؤية، عدم القدرة على التركيز، الشعور بالمرض، ضعف العضلات، تقلص العضلات، فرط الحركة لدى الأولاد، مشاكل في مقاييس الدم مثل فقر الدم

عد دموي منخفض، التهاب الكبد - هيباتيتيس (آلم شديد في البطن، غثيان، تقيؤات وفقدان الشهية)

حالة خطيرة يمكنها أن تجعل الدم أكثر حموضاً (تسمى الحماض الاستقلابي)، لدى المرضى المصابين بمرض صعب ويستعملون هذا الدواء (انظر البند 3)

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.iw)، والذي يوجّه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.iw/

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسلسم هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك تستمع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date). المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.**
- لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:**

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, hypromellose, silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, macrogol 3350 (polyethylene glycol), talc, titanium dioxide, erythrosine aluminum lake, FD&C blue #1/brilliant blue FCF aluminum lake.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:**

حيسولة مطبّعة على شكل كيسولة، محبّدة من كلا جانبيها، مغطّية اللون، على أحد جانبيها خط للشرط وجانبيها الآخر أبيض.

تحتوي العبوة على 14 حيسولة.

**اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:**

تيفع إسرائيل م.ض، شارع دقوره هاتيفيه 124، تل أبيب 6944020.

**تم تحرير هذه النشرة في تموز/ يوليو 2025.**

**رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**
136.48.31129
أول التيسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الملكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.