

نشرة طبية للمستعمل بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) 1986

يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيية

أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار

حسولات

التركيبية

تحتوي كل حيسولة على:

پاراسيتامول 500 ملغ

پسيودو إفيدرين هيدروكلوريد 30 ملغ

ديكستروميثورفان هيدروبروميد 15 ملغ

Paracetamol 500 mg

Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg

Dextromethorphan hydrobromide 15 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

عليك مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام.

هذا الدواء مخصص للبالغين وللاولاد من سن 12 عاماً فما فوق.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الزكام، السعال واحتقان الأنف، التي تصحبها الحمى والالام - للعلاج في النهار.

الفصيلة العلاجية:

پاراسيتامول - مسكن للألام وخافض الحرارة.

پسيودو إفيدرين - منصف لاحتقان الأنف.

ديكستروميثورفان - كابئ للسعال.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية (أرجية) لپاراسيتامول أو لپسيودو إفيدرين، أو لديكستروميثورفان أو لمزيلات أخرى للاحتقان، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بأدوية من فصيلة مثبطات منو أمين أوكسيداز (MAOI) (للاكتئاب) أو بالأدوية المثبطة لمنو أمين أوكسيداز العكوسة (RIMAs) أو خلال 14 يوماً منذ إيقاف العلاج بها.
- إذا كنت تستعمل الأدوية المثبطة لاسترداد السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كنت تستعمل الآن أو قد استعملت في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية نفسية، أدوية للحالات العاطفية أو أدوية لمرض الباركنسون.
- إذا كنت تتلقى في نفس الوقت علاجاً بمزيمات احتقان أخرى، أدوية إضافية للسعال والزكام.
- إذا كنت تستعمل أدوية من فصيلة حاصرات بيتا لعلاج مشاكل القلب.
- إذا كنت تعاني من ضغط دم منضغط جداً (فرط ضغط الدم الخطير) أو من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية، أو كانت لديك سيرة مَرَضِيَة من السكتة الدماغية.
- إذا كنت تعاني من السكري.
- إذا كنت ولذا عمرك دون الـ 12 عاماً.
- بالتزامن مع مستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الدواء الذي تستعمله يحتوي على پاراسيتامول، فاستشر الطبيب أو الصيدلي).
- إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).
- إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما - زرق).
- إذا وُجد لديك مرض كلوي حاد (فحائي) أو مزمن (طويل الأمد) أو قصور الكلىتين.
- إذا كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة فوق الكلوية، يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب).
- إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابئة للشهية، أو أدوية للربو (الأدوية المحاكية للوردة).
- إذا وُجد لديك ثلوث في الصدر، تفاقم في الربو أو مشاكل تنفسية خطيرة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

• تم الإبلاغ عن حالات من متلازمة الاعتلال الدماغي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS) في أعقاب استعمال أدوية تحتوي على پسيودو إفيدرين. PRES و-RCVS هما حالتان نادرتان يمكن أن ترتبطا بترويد دموي متدنّ للدماغ. توقف فوراً عن استعمال أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار وتوجه لتلقي المساعدة الطبية الفورية إذا نشأت لديك أعراض يمكن أن تكون علامات لـ PRES أو RCVS (للاطلاع على الأعراض انظر البند 4 "أعراض جانبية محتملة").

إذا نشأت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لاستعمال مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز استعمال المستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول. كي لا تسبب أعراضاً جلدية خطيرة مرة أخرى.

• يحتوي المستحضر على پاراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً للكبد عندما:

- يُعطى جرعة دوائية أعلى من الجرعة الموصى بها أو لفترة متواصلة.
- يتم شرب المشروبات الكحولية أثناء العلاج.
- يتم استعمال أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة دون استشارة الطبيب. لا يجوز استعمال أدوية إضافية لخفض الحرارة وتسكين الالام أو أدوية للزكام دون استشارة طبيب أو صيدلي، لمنع فرط الجرعة الدوائية أو التسمم من پاراسيتامول.

لا يجوز استعمال أدوية إضافية من "فصيلة أكامول" وأو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.

• يجب الامتناع عن استعمال جرعة دوائية عالية (ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

• إذا وُجدت لديك حساسية لأي غذاء أو لأي دواء، فعليك إخبار الطبيب بذلك قبل استعمال الدواء.

• استعمال هذا الدواء بشكل دائم لفترة زمنية طويلة قد يسبب الإدمان. تناول هذا الدواء كما هو مذكور في هذه النشرة. العلامات المحتملة للإدمان على هذا الدواء:

- احتياج إلى استعمال الدواء لمدة أطول مما أوصى به.
- تشعر بالحاجة إلى استعمال جرعة أعلى من الجرعة الموصى بها.
- تستعمل الدواء لما لا يتناسب مع دواعي الاستعمال.
- عندما تتوقف عن استعمال الدواء تشعر بانك لست على ما يروء، ويتحسن شعورك بعد أن تستعمل الدواء مجدداً.

• إذا لاحظت وجود إحدى هذه العلامات، فمن المهم أن تكلم الطبيب المعالج أو الصيدلي.

قبل العلاج بأكامول تصينون وشبّاعَت للنهار، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من:

- مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض الشريان التاجي - انسداد الشرايين أو الأوردة)
- مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: ربو، سعال متواصل، سعال مصحوب بالحمى، بالطفح أو بالصداع المتواصل
- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلىة
- مشاكل في التبول أو تضخم البروستاتا (بسبب التبول بوتيرة عالية)
- خلل في وظيفة الغدة الدرقية (ثيرويد)
- خلل في وظيفة غدة البروستاتا
- كنت مدمناً الآن أو قد أدمنت في الماضي على الأفيونيات، الكحول، أدوية ملزمة بوصفة طبيب أو المخدرات غير القانونية
- عانيت مؤخرًا من أعراض انسحاب الكحول أو المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرق أو ارتجافات
- يرقان

خلال فترة استعمال الدواء، أخبر طبيبك فورًا إذا:

• كنت تعاني من مرض صعب يشمل الاختلال الكوي الخطير أو الإنتان (حالة تتجول فيها الجراثيم وتسومها في التيار الدموي وتؤدي إلى ضرر في الأعضاء)، سوء التغذية، الكحولية المزمنة، أو إذا كنت تستعمل أيضًا فلوكوئكساليين (مضاد حيوي). تم الإبلاغ عن حالة خطيرة تسمى الحماض الاستقلابي (اختلال في الدم وفي سوائل الجسم) لدى المرضى في هذه الحالات عندما استعملوا پاراسيتامول بالجرعة المتبعة لفترة مطولة أو عندما استعملوا پاراسيتامول بالدمج مع فلوكوئكساليين. قد تشتمل أعراض الحماض الاستقلابي على: صعوبات تنفسية شديدة مع تنفس عميق وسريع، غماس، إحساس بالغيثان وتقيؤات.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبي وإضافات غذائية وفيتامينات، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل دواء من الفصائل التالية، أو إذا أنهيت للتو علاجًا بهذه الأدوية:

- أدوية مضادة للكلولين (علاج للتشنجات والتقلصات، مثل الأتروبين)
- أدوية مثبطة لاسترداد السيروتونين نتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")
- أدوية مضادة لتخثر الدم وخاصةً وارفارين
- أدوية مضادة للاكتئاب (بما في ذلك مثبطات MAO، RIMAs - انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء") أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين
- مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأمراض النفسية، للباركنسون، أو إذا استعملتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء")
- مكولوبيمياد - دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جوانيثيدين، ميثيل دوبا، adrenergic neuron blocker، ديريپنوكوين، بريثيلينوم وبيثانيدين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: حاصرات بيتا - **انظر البند 2، "لا يجوز استعمال هذا الدواء"**، حاصرات ألفا أو موسعات الأوعية الدموية) وأدوية للقلب (مثل: امبودارون، كورينيدين)
- مستحضرات تخفر عمل الإنزيمات في الكبد (مثل: فينيوتوين [للتشنجات]، الباربيتورات)
- أدوية مضادة للتشنجات (علاج الصرع) مثل: فينيوتوين، كاربامازيبين
- ميثوكلوريميد أو دومبيريدون (علاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل إضافية في الهضم)
- كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضاد حيوي)
- پروبيبيسيد (علاج للقرص)
- كوسيتيرامين (مضاد لفرط الدهنات في الدم)
- مستحضرات مضادات التهاب الالتهاب الالستيرويدية

• حبوب منع الحمل

• جلينكزيد قلبي (دواء يعطى لعلاج اضطرابات نظم القلب، أو قصور القلب، مثل ديجوكسين)
• فلويدات الپريموت (ergot alkaloids) - لعلاج الميجرينا مثل: إيرجوتامين أو ميثيرسجيد

• أوكسيتوسين (دواء يُعطى أثناء الولادة لتقليص الرحم)

• تيريبينافين لعلاج التلوثات الفطرية

• سيناكالميت لعلاج فرط نشاط الغدة جارة الدرقية الثانوي

• ميثادون لعلاج الألام الشديد

• فلوكوئكساليين flucloxacillin (مضاد حيوي)، بسبب الخطر الشديد لاختلال في الدم

وفي السوائل (الحماض الاستقلابي) مما يسبب وجع العلاج المستعمل (انظر البند 2)

إذا كنت تستعمل سويًا مع أكامول تصينون وشبّاعَت أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، فقد تنشأ لديك تغيرات نفسية (مثل: هياج نفسي، هلوسات، غيبوبة)، وأعراض إضافية مثل: حمى فوق 38 درجة مئوية، ازدياد في وتيرة القلب، ضغط دم غير مستقر، منعكسات مبالغ فيها، تصلب العضلات، انعدام التناسق الحركيّ وأو أعراض ترتبط بالمعدة والأمعاء (غثيان، تقيؤات، إسهال).

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء دون ارتباط بالطعام.

استعمال هذا الدواء واستهلاك الكحول

خلال فترة العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك **الكحول** بسبب زيادة الخطر لضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملًا أو مرضعًا، تظنين أنك قد تكونين حاملًا أو تخططين حملًا، فعليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

الاستعمال لدى الأولاد

هذا الدواء مخصص للأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يعطى للولد.

السيارة واستعمال الماكنت

قد يجعلك الدواء تشمر بالتعب والدوار، ولذلك، قد يؤثر الدواء على قدرتك على القيادة أو استعمال الأدوات والماكنت.

لا يجوز القيادة وتشغيل الماكنت إلى أن تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

معلومات إضافية

تكمّن في المادة الفعالة پسيودو إفيدرين إمكانية معاقرتها. الجرعة الدوائية المتزايدة قد تكون سامة. قد يؤدي الاستعمال المطول إلى تناول جرعة أعلى من الموصى بها من أجل بلوغ التأثير المطلوب، وبالتالي يؤدي إلى تزايد خطر التعرّض لفرط الجرعة الدوائية. يُمنع تجاوز الجرعة الدوائية ومدّة العلاج الموصى بهما (انظر البند 3).

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي كل حيسولة على 0.588-0.882 ملغ من الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الحيسولة، ولذلك يُعتبر خاليًا من الصوديوم.

تحتوي كل حيسولة على 6.5 ملغ من مونوهيدرات اللاكتوز. إذا قال لك طبيبك بأن لديك عدم تحمّل لأنواع معينة من السكر، فاستشر الطبيب قبل استعمال المستحضر.

يحتوي الدواء على الصمغ FD&C YELLOW #6/SUNSET YELLOW الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

اليابغون والأولاد الذين عمرهم فوق 12 عامًا: 1-2 حيسولات، كل 4-6 ساعات، حتى 4 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حيسولات خلال 24 ساعة.

عند الاستعمال بالتوازي مع أكامول تصينون وشبّاعَت لليل يُمنع تجاوز جرعة دوائية من 8 حيسولات بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. (يجب استبدال جرعة من أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار بجرعة من أكامول تصينون وشبّاعَت لليل، وعدم تناولها كإضافة للجرعة الدوائية

القصوى الموصى بها اعلاه من أكامول تصينون وشبّاعَت للنهار). المرصوي الذين عمرهم فوق 60 عامًا: يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الحمى لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت علامات المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء، أو في أي حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

كيفية الاستعمال

لا يجوز الصمغ أو الهرس! يمكن شطر الحيسولة في خط الشطر.

يجب بلع الحيسولة مع كأس ماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء مذك. حتى لو كان شعورك جيدًا، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطر تطوّر ضرر شديد للكبد. قد تكون الأعراض الجانبية:

الغثيان والتقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، الأم البطن، الانتفاخ، التعرق المتزايد، الألم أو الحساسية في الجزء العلوي من البطن ومن المحتمل أنها لا تعكس شدة الضرر للكبد. تقلّص العضلات، هياج نفسي، ارتباك، ميل إلى النوم، تضرر مستوى اليقظة (الوعي)، حركات سريعة ولا-إرادية في العينين، مشاكل قلبية (نظم قلبي سريع)، مشاكل في التناسق الحركيّ، اضطراب نفسي شديد

مصعوب بالهلوسات، ميل إلى الانفعال المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء، فتناول الجرعة القادمة بحسب الحاجة، بشرط أن يكون قد تم تناول الجرعة الأخيرة قبل تناول الجرعة الحالية بـ 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرّة تناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى نشوء أعراض جانبية. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية خطيرة

يجب إيقاف العلاج بشكل فوري والتوجه لتلقي العلاج الطبي المستعمل:

إذا تطورت لديك أعراض يمكنها أن تكون علامات لمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS). تشتمل العلامات على:

- ظهور فجائي لصداع خطير
- غثيان
- تقيؤات
- ارتباك
- اختلاجات
- تغيرات في الرؤية

يجب إيقاف العلاج والتوجه فورًا إلى الطبيب:

إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل: الطفح الجلدي والحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق و/أو الأطراف مما قد يسبب صعوبات في التنفس أو اليلع

قد يؤدي پاراسيتامول في حالات نادرة إلى ظهور أمراض جلدية حادة قد تكون علامتها: الاحمرار، الطفح الجلدي، الحوصلات، التضرر الجلدي الموسع. قد تظهر الأعراض الجانبية الجلدية الحادة أيضًا إذا استعملت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب

الفعال پاراسيتامول دون حدوث مشاكل. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، فيجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري

- انزعاج في البطن
- دوار، غماس، ارتباك
- هلوسات (نادر) (سماع أصوات وروؤية مشاهد غير موجودة، أفكار ومشاعر غير منطقية)
- مشكلة في التبول، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة في غدة البروستاتا
- إذا ظهرت علامات على حدوث تغيرات في الجهاز الدموي مثل: تعب غير مفسر، حالات نزيف دموي، ظهور كدمات، نشوء التهابات بسهولة أكبر
- نظم قلبي غير منتظم
- آلم فجائي وخطير في البطن أو نزيف دموي شرجي (في فتحة الشرج) في أعقاب التهاب في الأمعاء الغليظة نتيجة لتزويد دموي غير كاف
- انخفاض في جريان الدم في النوبة الصدريّة (انزعاج أو ألم في الصدر، الرقبة، الظهر، الفك، الكتفين، الذراعين) أو النوبة القلبية
- سكتة دماغية (ضعف في الوجه، الذراعين أو الرجلين أو مشاكل في التكلم)
- ثوران فجائي للحمى، احمرار الجلد، أو بثور صغيرة عديدة (أعراض محتملة لـ Acute AGEP - Generalised Exanthematous Pustulosis) والتي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا المستحضر

- فقدان فجائي للبصر

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) - قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين

• صداع

أعراض جانبية شائعة (common) - قد تؤثر على مستعمل 1 كحد أقصى من بين 10 مستعملين

• صعوبات في النوم، عصبية، دوار

• جفاف الفم أو غثيان

أعراض جانبية مدى شيوها غير معروف (أعراض لا يتم تحديد مدى شيوها بعد)

• حالات خطيرة تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتُعرف بمتلازمة الاعتلال الدماغي الخلفي الانعكاسي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية الانعكاسي (RCVS)

• قلق، شعور بعدم الهدوء، تهيجيّة، تؤثر أو شعور بالسعادة المتطرقة

• اضطرابات في النوم

• نبض سريع أو غير منتظم أو خفقان القلب

• غماس

• ضغط دم مرتفع

• ألم البطن، إسهال، تقيؤ

• ألم عند التبول

• تتميل في راحتي اليدين والقديمن

• ارتجاج

• انخفاض في التيار الدموي إلى العصب البصري (Ischaemic optic neuropathy) (الاعتماد والإدمان - عند إيقاف استعمال الدواء قد تشمر بأعراض الانسحاب، التي تشتمل على: شعور بعدم الهدوء، صعوبات في النوم، تهيجيّة، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤات وغثيان، إسهال، ارتجاج، تعرق

• حالة خطيرة يمكنها أن تجعل الدم أكثر حموضةً (تسمى الحماض الاستقلابي)، لدى المرضى المصابين بمرض صعب ويستعملون هذا الدواء (انظر البند 2)

إذا ظهر عرض جانبي، أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.

لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose), silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, lactose monohydrate, HPMC 2910/hypromellose 15cp, titanium dioxide, macrogol 4000 [polyethylene glycol], D&C yellow #10 aluminum lake, FD&C yellow #6/sunset yellow FCF aluminum lake, FD&C blue #1/brilliant blue FCF aluminum lake.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حيسولة مطلية على شكل كيسولة، محببة من كلا جانبيهما، خضراء اللون، على أحد جانبيهما خط للشطر وجانبها الآخر أملس.

تحتوي العبوة على 21 حيسولة أو 35 حيسولة. قد لا تُسوّق جميع العبوات.

اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيف إسرايل لم.رض، شارع دفور هانتينغوي 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير هذه النشرة في تموز/ أيلول 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

136.49.31130

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.