

## ميكوفينولات تيفع 500 ملغ أقراص

### التركيب:

يحتوي كل قرص على:

ميكوفينولات موفيتيل 500 ملغ

(Mycophenolate mofetil 500 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة وموحدات الحساسية أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 – "معلومات إضافية".  
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية. راجع الطبيب أو الصيدلي.

• وصف هذا الدواء لعلاج مرضك فقط. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا بك ان حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### معلومات هامة اقرأها بتمعن

- تحذير: يؤدي ميكوفينولات إلى إجهاضات وعيوب خلقية. لا يجوز بدء العلاج ب ميكوفينولات تيفع لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بداية العلاج.
- يجب الإنصياح لتعليمات منع الحمل التي ستعطى لك من قبل الطبيب المعالج. قبل تناول الدواء، يجب استشارة الطبيب ثانيةً وذلك في حال عدم فهمك لكامل التعليمات. لمعلومات إضافية، أنظر الفقرة "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء" وفقرة "الحمل، منع الحمل والإرضاع".

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الدواء ميكوفينولات تيفع، بمشاركة سيكلوسبورين وكورتيكوستيروئيدات، لمنع رفض عضو مزروع لدى زارعي الكلية، القلب أو الكبد.

### الفصلية العلاجية

أدوية مثبطة لجهاز المناعة

(Immunosuppressants).

### 2. قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت أليرجي ل ميكوفينولات موفيتيل، لحمض ميكوفينوليك، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية").
- كنت امرأة في سن الخصوبة ولم تجتازي فحص حمل سلبي قبل الحصول على الوصفة الطبية الأولى
- ل ميكوفينولات تيفع، ذلك لأن ميكوفينولات يسبب إجهاضات وعيوب خلقية.
- كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.
- كنت امرأة في سن الخصوبة، ولا تستعملين طرقاً ناجحة لمنع الحمل (لمعلومات إضافية، أنظري الفقرة "الحمل، منع الحمل والإرضاع").
- كنت مرضعة.

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات المفصلة أعلاه، لا تتناول الدواء.

إذا لم تكن واثقاً، راجع طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل تناول ميكوفينولات تيفع.

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

لا يجوز بدء العلاج ب ميكوفينولات تيفع ويجب مراجعة الطبيب المعالج حالاً إذا:

- تجاوزت عمر 65 سنة، لأنه بالمقارنة لمتعالمين أصغر سناً، هنالك خطورة أكبر في أن تتطور أعراض جانبية مثل: تلوثات جراء فيروسات معينة، أنزفة في الجهاز الهضمي ووذمة في الرئتين.
  - وجدت لديك علامة لتلوث، مثل: سخونة أو ألم في الحنجرة.
  - وجدت لديك كدمات أو أنزفة غير متوقعة.
  - كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: قرحة في المعدة).
  - كنت تخططين للحمل، أو إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بالدواء.
  - وجد لديك نقص وراثي في أنزيم مثل متلازمة Lesch-Nyhan و -Kelley-Seegmiller.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات المذكورة أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً)، راجع الطبيب المعالج حالاً، قبل تناول الدواء.

### تأثير ضوء الشمس على العلاج

يُضعف ميكوفينولات تيفع من الآليات الدفاعية لجسمك. ونتيجة لذلك، تزداد الخطورة لتطور سرطان جلد. عليك الحد من تعرضك للشمس ولأشعة UV، وذلك بواسطة:

- ارتداء ملابس واقية التي تغطي أيضاً رأسك، رقبتك، ذراعيك ورجليك.
- استعمال واقيات الأشعة ذات عامل وقاية مرتفع.

### الأطفال

لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال دون عمر سنتين لأنه وبالاعتماد على المعلومات المتوفرة بخصوص النجاعة والسلامة، فإنه لا يمكن تقديم توصيات بخصوص المقدار الدوائي لدى هذه الفئة من العمر.

### ميكوفينولات تيفع والأدوية الأخرى

- إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من المهم القيام بذلك لأن الدواء ميكوفينولات تيفع قد يؤثر على طريقة عمل أدوية أخرى، وأدوية أخرى قد تؤثر على طريقة عمل ميكوفينولات تيفع. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية وذلك قبل بدء العلاج ب ميكوفينولات تيفع:
- أزاثيوبرين أو أدوية أخرى مثبطة لجهاز المناعة، التي تعطى بعد عملية الزرع.
  - كوليستيرامين – دواء لعلاج الكولسترول المرتفع.
  - ريفامبيسين – مضاد حيوي مخصص لمنع وعلاج تلوثات مثل السل (TB).
  - مضادات الحموضة، أو مثبطات مصخة البروتونات (PPIs) - مستحضرات لعلاج مشاكل فرط الحموضة في المعدة مثلاً لعلاج عسر الهضم.
  - مستحضرات رابطة للفوسفات – تعطى للمتعالمين الذين يعانون من قصور مزمن في الكلى، وذلك لتقليل كمية الفوسفات التي تمتص للدم.
  - مضادات حيوية – تستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية.

- إيسافوكونازول – يستعمل لعلاج التلوثات الفطرية.
- تيلميسرتان – يستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع.

### اللقاحات

إذا توجب عليك تلقي لقاح (لقاح حي – مضغف) بينما لا تزال متعالجا بـ ميكوفينولات تيفع، فعليك التوجه أولاً إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. يقدم لك الطبيب المعالج الإستشارة حول أي من اللقاحات يمكنك أن تتلقى.

### التبرع بالدم

لا يجوز التبرع بالدم خلال فترة العلاج بـ ميكوفينولات تيفع وحتى 6 أسابيع على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

### التبرع بالأنفاس

لا يجوز التبرع بالأنفاس خلال العلاج بـ ميكوفينولات ولغاية 90 يوماً على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

### إستعمال الدواء و الطعام

لا يوجد للطعام والشراب تأثير على العلاج بـ ميكوفينولات تيفع.

### الحمل، منع الحمل والإرضاع

#### منع الحمل لدى نساء يتناولن ميكوفينولات تيفع

- لدى نساء في سن الخصوبة اللواتي وصف لهن علاج بـ ميكوفينولات تيفع، يتوجب عليهن إستعمال طريقة ناجعة لمنع الحمل:
- قبل بدء العلاج بـ ميكوفينولات تيفع.
- خلال كامل فترة العلاج بـ ميكوفينولات تيفع.
- لمدة 6 أسابيع بعد التوقف عن العلاج بـ ميكوفينولات تيفع.

يجب إستشارة الطبيب المعالج بخصوص الوسائل الأكثر ملاءمة من أجلك لمنع الحمل. تُحدّد وسائل منع الحمل هذه بحسب حالتك. من المفضل إستعمال طريقتين من وسائل منع الحمل لأن هكذا تقل الخطورة لحدوث حمل غير مخطط له.

#### يجب مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعتقدين بأن وسيلة منع الحمل لم تكن ناجعة أو إذا نسيت تناول قرص منع الحمل.

- إذا كان واحد من المعايير التالية ينطبق عليك، فلا يمكنك الحمل:
- كنت امرأة بفترة سن اليأس، أي: عمرك 50 سنة على الأقل وتلقيت طمتهك الأخير قبل أكثر من سنة (إذا توقفت الطمث لديك جراء علاج السرطان، فلا يزال هناك إحتمال أن تصبحي حاملاً).
- إجترزت عملية جراحية لإستئصال البوقين والمبيضين (Bilateral salpingo-oophorectomy).
- إجترزت عملية جراحية لإستئصال الرحم (Hysterectomy).
- مبيضيك لا يعملان (فشل مبيضي مبكر، الذي تم تشخيصه من قبل طبيب مختص بالأمراض النسائية).
- وُلدت ولديك واحداً من الحالات النادرة التالية، التي لا يمكنك من الحمل: نمط جيني XY (XT genotype)، متلازمة تورنر (Turner syndrome) أو عدم تطور الرحم (Uterine agenesis).
- كنت طفلة أو مراهقة، ولم تبدئي بعد بتلقي الطمث.

#### منع الحمل لدى رجال يتناولون ميكوفينولات تيفع

- في حال يتناول الأب ميكوفينولات، لا تدل المعطيات المتوفرة على ارتفاع الخطورة لعيوب أو إجهاضات. ومع ذلك، من غير الممكن النفي تماماً إمكانية الخطورة. كإجراء احترازي، من الموصى به أن تستعمل أنت وزوجتك وسائل منع حمل موثوقة خلال فترة العلاج ولمدة 90 يوماً بعد إنتهاء العلاج.
- إذا كنت تخطط للحمل مع زوجتك، تحدث مع الطبيب حول المخاطر الممكنة والعلاجات البديلة.

### الحمل والإرضاع

- يجب إستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول الدواء، وذلك إذا كنت في فترة الحمل، الرضاعة تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.
- يتحدث معك الطبيب حول المخاطر خلال فترة الحمل وعن العلاجات البديلة التي يمكن تناولها من أجل منع رفض العضو المزروع، وذلك في الحالات التالية:
- كنت تخططين للحمل.
- لم تتلقي أو تعتقدين بأنك لم تتلقي الطمث، لديك نزف طمثي مختلف عن المعتاد، أو تشكين بأنك حامل.
- مارست علاقة جنسية دون إستعمال وسائل منع حمل ناجعة.

يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ ميكوفينولات تيفع. مع ذلك، يجب مواصلة تناول ميكوفينولات تيفع حتى مقابلتك مع الطبيب.

### الحمل

يؤدي ميكوفينولات إلى إجهاضات بشيوع عال جداً (50%) ولعيوب خلقية خطيرة (27%-23%). العيوب الخلقية التي بُلغ عنها تشمل:

- عيوب في الأذنين، في العينين، في الوجه (إنشقاق الشفة/إنشقاق الحنك)، في نمو الأصابع، القلب، المريء (الأنبوب الذي يربط ما بين الحنجرة والمعدة)، في الكلى والجهاز العصبي (مثلاً إنشقاق العمود الفقري-عظام العمود الفقري لا تنمو كما ينبغي). قد يصاب رضيعك بواحد أو أكثر من العيوب المذكورة أعلاه.
- لا يجوز بدء العلاج بـ ميكوفينولات تيفع لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج. يجب الإنصباغ لتعليمات منع الحمل التي ستعطى لك من قبل الطبيب المعالج. بإمكان الطبيب أن يطلب منك إجراء فحص حمل إضافي ليضمن بأنك لست حاملاً قبل بدء العلاج.

### الإرضاع

لا يجوز إستعمال ميكوفينولات تيفع إذا كنت مرضعة، لأن كميات ضئيلة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الأم.

### السياقة وإستعمال الماكينات

لـ ميكوفينولات تيفع تأثير متوسط على القدرة على السياقة أو إستعمال المعدات والماكينات. إذا شعرت بنعاس، خدر أو إرتباك، تحدث مع الطبيب أو الممرضة ولا تقم بالسياقة أو إستعمال المعدات أو الماكينات إلى أن تشعر بشكل أفضل. بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من حركة المرور وما شابه.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على المركبات التالية:
- الصوديوم: إن محتوى الدواء من الصوديوم هو أقل من 23 ملغ للقرص، بحيث يعتبر الدواء فعلياً خال من الصوديوم.

### 3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء.

### الجرعة الدوائية الاعتيادية

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. تتعلق الجرعة الدوائية بنوع عملية الزرع التي إجترتها. الجرعات الدوائية الاعتيادية مدوّنة أدناه. يستمر العلاج لطالما هنالك حاجة في منع جسمك من رفض العضو المزروع.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

#### زراعة الكلية

الكبار:

- تعطى الجرعة الدوائية الأولى خلال 3 أيام من عملية الزرع.
- الجرعة الدوائية اليومية هي 2 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1 غرام في الصباح و- 1 غرام في المساء.
- الأطفال (بأعمار سنتين حتى 18 سنة):
- تتعلق الجرعة الدوائية بحجم الطفل.
- يحدد الطبيب المعالج الجرعة الدوائية الأنسب بحسب طول ووزن طفلك.

#### زراعة القلب

الكبار:

- تعطى الجرعة الدوائية الأولى خلال 5 أيام من عملية الزرع.
- الجرعة الدوائية اليومية هي 3 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1.5 غرام في الصباح و- 1.5 غرام في المساء.
- الأطفال:
- لا تتوفر معلومات بخصوص إعطاء ميكوفينولات تيفع للأطفال بعد زراعة القلب.

#### زراعة الكبد

الكبار:

- تعطى لك الجرعة الدوائية الأولى من ميكوفينولات تيفع بعد 4 أيام على الأقل من عملية الزرع وعندما تكون قادراً على بلع الأدوية.
- الجرعة الدوائية اليومية هي 3 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1.5 غرام في الصباح و- 1.5 غرام في المساء.
- الأطفال:
- لا تتوفر معلومات بخصوص إعطاء ميكوفينولات تيفع للأطفال بعد زراعة الكبد.

#### كيفية استعمال الدواء

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل، مع كأس من الماء.  
لا يجوز مضغ، كسر أو سحق الأقراص. لا يجوز شطر الأقراص.  
يجب تجنب التماس بين المسحوق وبين الجلد، العينين والفم. إذا كسر القرص بالخطأ، فيجب غسل بقايا المسحوق عن الجلد بالماء والصابون. إذا دخل المسحوق في العينين / الفم، فيجب الغسل جيداً بواسطة الكثير من الماء.  
إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلغ طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك ومواصلة تناول الدواء في الأوقات المحددة. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن العلاج بـ ميكوفينولات تيفع، إلا إذا أوصاك طبيبك بفعل ذلك. إذا توقفت عن العلاج فقد تزيد من خطورة رفض العضو المزروع.  
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.  
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ميكوفينولات تيفع قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

عليك التوجه إلى الطبيب في الحال إذا كنت تلاحظ واحداً من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ:

- لديك علامة لتلوث، مثل سخونة أو ألم في الحنجرة.
- كنت تعاني من كدمات أو أنزفة غير متوقعة.
- كنت تعاني من طفح، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو في الحنجرة، مع صعوبة في التنفس- من الجائز أن لديك رد فعل تحسسي حاد للدواء (مثل صدمة إستهدافية، وذمة وعائية).

#### أعراض جانبية شائعة

بعض الأعراض الجانبية الشائعة أكثر هي: إسهال، قلة كريات الدم البيضاء أو الحمراء في الدم، تلوث وتقيؤات. يجري الطبيب المعالج فحوص دم منتظمة لتشخيص تغيرات في:

- عدد خلايا دمك أو علامات لحدوث تلوثات

قد يعاني الأطفال من الأعراض الجانبية التالية باحتمال أكبر مما هو عليه لدى الكبار: إسهال، تلوثات، قلة كريات الدم البيضاء وقلة كريات الدم الحمراء.

#### الوقاية من التلوثات

يُضعف الدواء ميكوفينولات تيفع من الآليات الدفاعية لجسمك، وذلك لمنعك من رفض العضو المزروع. نتيجة لذلك، فإن قدرة جسمك على محاربة التلوثات تكون أقل جودة من الطبيعي. وبالتالي، قد تصاب بتلوثات أكثر من المعتاد، بما في ذلك: تلوثات في الدماغ، الجلد، الفم، المعدة، الأمعاء، الرئتين والجهاز البولي.

#### سرطان الجلد والليمفا

كما قد يحدث لدى متعاليين يتناولون أدوية من هذا النوع (أدوية تثبط الجهاز المناعي)، فإن عدداً قليلاً جداً من المتعالجين الذين تناولوا ميكوفينولات تيفع، طُوروا لديهم سرطان الأنسجة اللمفاوية والجلد.

#### أعراض جانبية إضافية

قد تعاني من أعراض جانبية عامة التي تؤثر على كامل الجسم حيث تشمل: ردود فعل تحسسية خطيرة (مثل صدمة استهدافية، وذمة وعائية)، سخونة، شعور بإرهاق شديد، صعوبات في النوم، الآم (مثل: الآم في البطن، الآم في الصدر، الآم في المفاصل أو العضلات)، صداع، أعراض الإنفلونزا وانتفاخ.

أعراض جانبية أخرى يمكن أن تشمل:

مشاكل في الجلد، مثل: حب الشباب، قروح البرد، عقبولة المنطقة، أورام في الجلد، تساقط الشعر، طفح وحكة.

مشاكل في الجهاز البولي، مثل: دم في البول.

مشاكل في الجهاز الهضمي والفم، مثل:

- إنتفاخ في اللثة وتقرحات في الفم.
- التهاب في البنكرياس، في الأمعاء الغليظة أو في المعدة.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل نرف.

- اضطرابات في الكبد.
- إسهال، إمساك، غثيان، صعوبات هضمية، فقدان الشهية للطعام، نفخة (غازات في الجهاز الهضمي).
- مشاكل في الجهاز العصبي، مثل:
- دوار، ميل إلى النوم أو خدر.
- إرتجاج، تقلصات عضلية، تشنجات.
- الشعور بقلق أو اكتئاب، تغيرات في المزاج أو في الأفكار.
- مشاكل قلبية ومشاكل في جهاز الدم، مثل:
- تغيرات بضغط الدم، نظم متسارع للقلب، توسع الأوعية الدموية.
- مشاكل في الرئتين، مثل:
- التهاب الرئتين، التهاب القصبات الهوائية (bronchitis).
- ضيق تنفس، سعال الذي قد ينتج عن توسع القصبات الهوائية (bronchiectasis) – حالة تتوسع فيها الطرق الهوائية في الرئتين بشكل شاذ) أو تليف رئوي (تندب في الرئتين). يجب استشارة الطبيب إذا تطور لديك سعال لا يتوقف أو ضيق في التنفس.
- سائل في الرئتين أو في جوف الصدر.
- مشاكل في الجيوب الأنفية.
- مشاكل إضافية مثل: انخفاض في الوزن، داء النقرس (gout)، نسبة مرتفعة للسكر في الدم، أنزفة وكدمات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب حالاً.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (Date .Exp) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في العبوة الأصلية، في مكان جاف ومظلم، دون 25°C.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو سلة القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. إن اتخاذ هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Povidone, Magnesium stearate.  
HPMC 2910, Titanium dioxide, Macrogol/PEG, Talc, FD&C Blue #2 / Indigo carmine Aluminium lake (E-132), Iron oxide black, Iron oxide red.

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص بيضوي، مطلي، بلون بنفسجي شاحب. في جانب واحد من القرص مطبوع الرقم M500 والجانب الآخر ناعم. تحتوي كل عبوة على 50 قرصاً في عبوة بليستر (لويحة).

#### اسم المنتج وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دفوراً هنتفينه 124، تل أبيب 6944020، إسرائيل.

تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2025، بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 142.37.32978

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.