

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

ريتيفمو 40 ملغ ريتيفمو 80 ملغ كبسولات

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل كبسولة من ريتيفمو 40 ملغ على 40 ملغ سيلبيركاتينيب (selpercatinib 40 mg)

تحتوي كل كبسولة من ريتيفمو 80 ملغ على 80 ملغ سيلبيركاتينيب (selpercatinib 80 mg)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدليّ. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعدّ هذا الدواء؟

ريتيفمو يُستعمل لعلاج أنواع سرطان معينة الناتجة عن حالات ظهور شاذة للمورثات من النوع RET ومعدّ:

- لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة النقيلي للخلايا غير الصغيرة الإيجابي لـ RETFusion.
- لعلاج البالغين والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق المصابين بسرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC - medullary thyroid cancer)، المتقدم أو النقيلي بواسطة طفرة RET والذين يحتاجون إلى علاج جهازّي.
- لعلاج البالغين والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق المصابين بسرطان الغدة الدرقية (thyroid) المتقدم أو النقيلي، الإيجابي لـ RET-fusion، والذين يحتاجون إلى علاج جهازّي ولديهم مقاومة للعلاج باليود المشع (إذا كانت هنالك حاجة لليود المشع).
- لعلاج وحيد للبالغين الذين لديهم أورام صلبة متقدمة إيجابية لـ RETFusion، حيث توفر إمكانيات العلاج غير الموجهة لـ RET فوائد سريرية محدودة، أو قد تم استنفادها.

المجموعة العلاجيّة: مواد مضادة-للأورام ومعدّلات الاستجابة المناعية، مواد مضادة-للأورام، مثبطات بروتين كيناز.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعّالة (سيلبيركاتينيب) أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفصل 6).

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستخدام الدواء
قبل وخلال العلاج بـ ريتيفمو، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد

- كنت تعاني من مشاكل في الرئة أو من مشاكل في التنفس، ليست سرطان الرئة
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع
- كنت تعاني من مشاكل في القلب، بما في ذلك حالة تُسمى إطالة مقطع QT QT (prolongation)
- كنت تعاني من مشاكل نزفية
- كنت تخطط لإجراء عملية جراحية. عليك التوقف عن تناول ريتيغمو 7 أيام على الأقل قبل العملية الجراحية المخطط لها. انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية"
- كنت حاملاً أو تخططين للحمل. قد يلحق ريتيغمو الضرر بالجنين. انظري البند "الحمل، الإرضاع والخصوبة".
- تفاصيل إضافية بخصوص التحذيرات المتعلقة باستخدام الدواء، انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية".

الأطفال والمراهقون

- المستحضر معدّ لمن هم بعمر 12 سنة وما فوق.
- من غير المعروف ما إذا كان ريتيغمو آمناً وناجحاً عندما يُستعمل:
- لدى أطفال دون عمر 12 سنة، لعلاج:
 - MTC متقدم أو ثقيل الذي يتطلب علاجاً جهازياً.
 - سرطان الغدة الدرقية المتقدم أو الثقيل الذي يتطلب علاجاً جهازياً، بعد أن تلقوا علاجاً باليود المشع الذي لم يجد نفعاً أو توقف عن العمل.
- لدى الأطفال لعلاج جميع أنواع السرطان الأخرى.

الفحوص والمتابعة

- سيقوم الطبيب بإجراء فحص للتأكد من أن ريتيغمو مناسب لك:
- سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو لفحص مشاكل في الكبد.
- قد يؤثر ريتيغمو على ضغط دمك. سيتم قياس ضغط دمك قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو.
- قد يؤثر ريتيغمو على نظم قلبك. سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو للتحقق من نشاط قلبك ومستويات الأملاح في الجسم (الشوارد) وهرمون المحفز للغدة الدرقية (thyroid-stimulating hormone, TSH) في دمك.
- سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم لفحص فيما إذا يوجد لديك متلازمة انحلال الورم (Tumor lysis syndrome, TLS).
- سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم لفحص وظيفة غدتك الدرقية قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو.
- سيقوم الطبيب بإجراء فحص حمل قبل أن تبدئي العلاج بـ ريتيغمو.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد يؤثر ريتيغمو على طريقة عمل الأدوية الأخرى، وقد تؤثر الأدوية الأخرى على طريقة عمل ريتيغمو، وهي قد تزيد من خطر حدوث أعراض جانبية.
- أثناء استعمال ريتيغمو، يجب عليك الامتناع عن تناول:

- العرن المنقوب (هيسيريكوم – St. John's Wort)
- مثبطات مضخات البروتون (PPIs)، مثل ديكسلانسوبرازول، إيزومبيرازول، لانسوبرازول، أومبيرازول، بانتوبرازول الصوديوم ورايبيرازول
- حاصرات مستقبلات الهيستامين من النوع H₂، مثل فاموتيدين، نيزاتيدين وسيميتيدين
- مضادات الحموضة التي تحتوي على ألومنيوم، مغنيزيوم، كالسيوم، سيميثيكون أو أدوية مُبطلّة للحموضة.

إذا كنت لا تستطيع الامتناع عن تناول مثبطات مضخات البروتون، حاصرات مستقبلات الهيستامين من النوع H₂ أو مضادات الحموضة، انظر الفصل 3 "كيف تستعمل الدواء؟" لمزيد من المعلومات حول كيفية تناول

رَيْتَيْمُو سوية مع هذه الأدوية. اعرف الأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة بها لترتها للطبيب والصيدلي عندما تحصل على دواء جديد. **استعمال الدواء والغذاء** يُمكن تناول رَيْتَيْمُو مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

أخبري الطبيب إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. بإمكان رَيْتَيْمُو أن يلحق الضرر بجنينك. يُمنع الحمل أثناء العلاج بـ رَيْتَيْمُو.

إذا كنت قادرة على الحمل، سيقوم الطبيب بإجراء فحص حمل قبل أن تبدئي العلاج بـ رَيْتَيْمُو. يجب على النساء القادرات على الحمل استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة أسبوع واحد بعد آخر جرعة من رَيْتَيْمُو. استشيري الطبيب بشأن وسيلة منع الحمل التي يمكن أن تكون مناسبة لك.

أخبري الطبيب على الفور إذا أصبحت حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً أثناء العلاج بـ رَيْتَيْمُو. يجب على الرجال الذين لديهم زوجات قادرات على الحمل استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ رَيْتَيْمُو ولمدة أسبوع واحد بعد آخر جرعة من رَيْتَيْمُو.

الإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. من غير المعروف فيما إذا كان رَيْتَيْمُو ينتقل إلى حليب الأم. لا ترضعي أثناء العلاج بـ رَيْتَيْمُو ولمدة أسبوع واحد بعد آخر جرعة.

الخصوبة

قد يؤثر رَيْتَيْمُو على الخصوبة عند النساء والرجال، حيث قد يؤثر على قدرتك على الإنجاب. توجه إلى الطبيب إذا كان هذا الموضوع يقلقك.

السياقة واستعمال الماكينات

يجب توخي الحذر عند السياقة واستعمال الماكينات لأنك قد تشعر بالإرهاق أو بالدوار أثناء تناول رَيْتَيْمُو.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحدددهما الطبيب، فقط.

إذا كنت ستعاني من أعراض جانبية، من الجائز أن يقوم الطبيب بتغيير المقدار الدوائي، أو أن يوقف بشكل مؤقت أو دائم العلاج بـ رَيْتَيْمُو. لا تقم بتغيير المقدار الدوائي ولا تتوقف عن تناول رَيْتَيْمُو إلا إذا قال لك الطبيب بفعل ذلك.

- يتم تناول رَيْتَيْمُو عن طريق الفم، عادة مرتين في اليوم بفارق 12 ساعة.
- إذا كنت تتناول مثبّطاً لمضخات البروتون (PPIs)، مثل ديكسلانسوبرازول، إيزوميبرازول، لانسوبرازول، أوميبرازول، بانتوبرازول الصوديوم ورايبيرازول، يجب تناول رَيْتَيْمُو مع الطعام.
- إذا كنت تتناول حاصر مستقبلات الهيستامين من نوع H₂ (مثل فاموتيد، نيزاتيد، وسيميتيد)، يجب تناول رَيْتَيْمُو ساعتين قبل أو 10 ساعات بعد تناولك حاصر H₂.
- إذا كنت تتناول مضاداً للحموضة يحتوي على ألومنيوم، مغنيزيوم، كالسيوم، سيميثيكون أو أدوية مُبطّلة للحموضة، يجب تناول رَيْتَيْمُو ساعتين قبل أو ساعتين بعد تناول مضاد الحموضة.
- إذا تقيأت بعد تناول جرعة من رَيْتَيْمُو، يُمنع تناول جرعة إضافية. يجب تناول الجرعة التالية من رَيْتَيْمُو في الموعد المحدد.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول كبسولات رَيْتَيْمُو بشكلها الكامل. لا يجوز سحق أو مضغ الكبسولات.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في
المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد. يُمنع تناول جرعة ريتيغمو التي تم تفويتها، إلا إذا تبقى أكثر
من 6 ساعات حتى الجرعة التالية المخطط لها.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.
يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة
تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ريتيغمو أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند
قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

يمكن أن يسبب ريتيغمو أعراضاً جانبية خطيرة، التي تشمل:

- **مشاكل في الكبد.** مشاكل في الكبد (ارتفاع في إنزيمات الكبد) يمكن أن تحدث أثناء العلاج بـ
ريتيغمو وأحياناً قد تكون خطيرة. سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم قبل وأثناء العلاج بـ
ريتيغمو لفحص مشاكل في الكبد. توجه إلى الطبيب حالاً إذا كنت تعاني أياً من الأعراض التالية
لمشاكل في الكبد أثناء العلاج:
 - اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان)
 - بول داكن بلون "الشاي"
 - إرهاق
 - أنزفة أو كدمات
 - قلة الشهية للطعام
 - حالات غثيان أو تقيؤات
 - ألم في الجزء الأيمن العلوي من البطن

- **مشاكل في الرئتين.** قد يسبب ريتيغمو التهاباً رئوياً شديداً أو مهدداً للحياة خلال العلاج، مما قد
يؤدي إلى الوفاة. توجه إلى الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من أعراض جديدة أو من تعاقم
أعراض الرئة، التي تشمل:

- ضيق تنفس
- سعال
- سخونة

- **ضغط دم مرتفع.** ارتفاع ضغط الدم هو عرض شائع لـ ريتيغمو وقد يكون خطيراً في بعض
الأحيان. عليك أن تفحص ضغط الدم بانتظام أثناء العلاج بـ ريتيغمو. إذا تطورت لديك مشاكل
في ضغط الدم، قد يصف لك الطبيب دواء لعلاج ضغط الدم. توجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني
من ضغط دم مرتفع أو إذا كان يوجد لديك أعراض لضغط دم مرتفع، التي تشمل:

- ارتباك
- صداع
- ضيق في التنفس
- دوام
- ألم في الصدر

- **تغيرات في نظم القلب (إطالة مقطع QT).** قد يتسبب ريتيغمو في حدوث نظم قلب بطيء جداً،
سريع جداً أو غير منتظم. قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو لفحص
نشاط قلبك، مستويات الأملاح في الجسم (الشوارد) والهرمون المنبه للغدة الدرقية (thyroid-
stimulating hormone, TSH) في الدم. توجه إلى الطبيب حالاً إذا كنت تعاني أياً من الأعراض
التالية:

- فقدان الوعي
- دوام

- إغماء
- تغيير بطريقة نبض قلبك (خفقان، ضربات قلب)

- **مشاكل نزفية.** يمكن أن يسبب ريتيغمو أنزفة من شأنها أن تكون خطيرة وتؤدي إلى الوفاة.
توجه إلى الطبيب إذا كانت لديك علامات نزف أثناء العلاج بـ ريتيغمو، التي تشمل:
- تقيؤ دموي أو إذا كان قيؤك يبدو مثل ○ نزف غير اعتيادي من المهبل

حبات القهوة

- بول وردي أو بني
- براز أحمر أو أسود (يبدو مثل القطران)
- حالات رعاف تحدث في أوقات متقاربة
- نعاس أو صعوبة في الإستيقاظ
- سعال دموي أو مع خثرات دموية
- ارتباك
- أنزفة أو كدمات غير اعتيادية في الجلد
- صداع
- نزف طمئي أشد من المعتاد
- تغيرات في النطق
- ردود فعل تحسسية. يمكن أن يسبب ريتيغمو سخونة، طفح، آلام العضلات أو المفاصل، خاصة خلال الشهر الأول من العلاج. راجع الطبيب إذا كنت تعاني من أحد هذه الأعراض.
- متلازمة انحلال الورم (Tumor lysis syndrome, TLS). يحدث TLS بسبب التفكك السريع لخلايا السرطان. قد يسبب TLS قصوراً كلوياً، الحاجة إلى العلاج بالديليزة، ونظم قلب غير سليم. يمكن أن يؤدي TLS إلى المكوث في المستشفى. سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم لفحص فيما إذا يوجد TLS لديك. عليك الحرص على الشرب الكثير أثناء العلاج بـ ريتيغمو. توجه فوراً إلى الطبيب أو لمساعدة طيبة طارئة إذا تطور لديك أحد الأعراض التالية أثناء العلاج بـ ريتيغمو:
 - حالات غثيان
 - ضيق تنفس
 - تقيؤات
 - تقلصات العضلات
 - ضعف
 - اختلاجات
 - انتفاخ
- خطورة لحدوث مشاكل في شفاء الجروح. قد لا تُشفى الجروح كما ينبغي أثناء العلاج بـ ريتيغمو. توجه إلى الطبيب إذا كنت تخطط لإجراء عملية جراحية قبل أو أثناء العلاج بـ ريتيغمو.
 - عليك التوقف عن تناول ريتيغمو 7 أيام قبل العملية الجراحية المخطط لها.
 - يوجهك الطبيب متى يمكنك أن تبدأ مجدداً بتناول ريتيغمو بعد العملية الجراحية.
- انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية في الدم (hypothyroidism). سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم لفحص وظيفة غدتك الدرقية قبل وأثناء العلاج بـ ريتيغمو. توجه إلى الطبيب على الفور إذا تطورت لديك علامات أو أعراض لانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية، بما في ذلك:
 - زيادة الوزن
 - إرهاق متفاقم أو لا يزول
 - الشعور بالبرد
 - إمساك
- مشاكل في مفصل الورك (انزلاق رأس عظم الورك؛ slipped capital femoral epiphysis or slipped upper femoral epiphysis) لدى الأطفال. توجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت عليك علامات وأعراض مشاكل الورك، بما في ذلك الألم في الورك أو الركبة أو العرج دون ألم.

أعراض جانبية إضافية

تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة) لـ ريتيغمو لدى البالغين الذين لديهم أورام صلبة:

 - تورم في الذراعين، في الرجلين، في
 - ألم في منطقة المعدة (ألم في البطن)
 - اليدين والقدمين (وذمة)
 - إمساك
 - إسهال
 - طفح
 - غثيان
 - صداع
 - جفاف الفم
- تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة) لـ ريتيغمو لدى الأطفال من عمر 12 عاماً وما فوق الذين لديهم أورام صلبة:
 - آلام العضلات والعظام
 - الإصابة بعدوى فيروس كورونا
 - إسهال
 - ألم في منطقة المعدة (ألم في البطن)

- صداع
- غثيان
- تقيؤ
- سعال
- عدوى في الطرق التنفسية العلوية
- تعب
- حمى
- حالات نزيف
- طفح
- انتفاخ

تشمل نتائج الفحوصات المخبرية الخطيرة الأكثر شيوعاً لـ ريتيغمو لدى البالغين الذين لديهم أورام صلبة انخفاضاً في تعداد خلايا الدم البيضاء، ارتفاع إنزيمات الكبد، انخفاض مستويات الصوديوم في الدم وانخفاض مستويات الكالسيوم في الدم.

تشمل نتائج الفحوصات المخبرية الخطيرة الأكثر شيوعاً لـ ريتيغمو لدى الأطفال من عمر 12 عاماً وما فوق الذين لديهم أورام صلبة انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء، انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، انخفاض تعداد خلايا الدم الحمراء، ارتفاع في إنزيمات الكبد، انخفاض في مستويات المغنيزيوم في الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.

أعراض جانبية تم الإبلاغ عنها بعد تسويق الدواء:

تم تشخيص العرض الجانبي التالي بعد المصادفة على ريتيغمو للتسويق. نظراً لأن هذه الأعراض يتم الإبلاغ عنها بصورة طوعية من قبل شريحة سكانية ليس معروفاً حجمها، فليس بالإمكان دائماً تقييم نسبة شيوعتها بصورة موثوقة أو إقرار علاقة سببية واضحة بينها وبين التعرض للدواء.

- اضطرابات في الجلد وفي الأنسجة تحت الجلدية: متلازمة ستيفنس جونسون (Stevens-Johnson Syndrome)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر

دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الملصق.

شروط التخزين:

يجب التخزين في درجة حرارة تحت الـ 30°C.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات. اسأل الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً:

microcrystalline cellulose, colloidal silicon dioxide

يحتوي غلاف كبسولة الـ 40 ملغ على: gelatin, titanium dioxide, ferric oxide.
يحتوي غلاف كبسولة الـ 80 ملغ على: gelatin, titanium dioxide, FD&C blue #1.
يحتوي الحبر الأسود على:

shellac, alcohol (ethanol 96%), ferric oxide, purified water, propylene glycol,
strong ammonia solution, isopropyl alcohol, butyl alcohol, potassium
hydroxide.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

ريتيممو 40 ملغ هي عبارة عن كبسولات رمادية وقاتمة، مطبوع عليها الكتابة "Lilly"، "3977"
و- "40 mg" بحبر أسود.

ريتيممو 80 ملغ هي عبارة عن كبسولات زرقاء وقاتمة، مطبوع عليها الكتابة "Lilly"، "2980"
و- "80 mg" بحبر أسود.

يتوفر ريتيممو 40 ملغ ضمن قنينة مع سدادة مقاومة للفتح من قبل الأطفال تحتوي على 60 كبسولة.
يتوفر ريتيممو 80 ملغ ضمن قنينة مع سدادة مقاومة للفتح من قبل الأطفال تحتوي على 60 أو 120
كبسولة.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، شارع هشيراف 4، ص.ب. 4246،
رعنانا 4366411.

اسم المنتج وعنوانه:

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana (IN) 46285, USA

تم تحريرها في كانون الأول 2025.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ريتيممو 40 ملغ: 171-67-37212-99

ريتيممو 80 ملغ: 171-68-37213-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.