

لأفراد الطاقم الطبي معلومات هامة حول إيمدلترا (IMDELLTRA) (تارلاتاماب [tarlatamab])

معلومات هامة عليك معرفتها:

- يتم علاج هذا المتعالج بـ إيمدلترا (تارلاتاماب) الذي يعتبر جزيء ثنائي النوعية من فصيلة (bispecific T-cell engager) BiTE الذي يربط DLL3 التي تتجلى على سطح خلايا الورم و- CD3 التي تتجلى على سطح خلايا T
- إيمدلترا مخصص لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة من النوع (extensive stage small cell) (ES-SCLC) الذين تقدّم مرضهم أثناء أو بعد العلاج الكيميائي المعتمد على البلاتين.
- قد يسبب إيمدلترا أعراضاً جانبية خطيرة وتشكل خطراً على الحياة مثل متلازمة إطلاق السيتوكين (CRS) ومشاكل عصبية - متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا الفعالة للجهاز المناعي (ICANS)

لأفراد الطاقم الطبي

لمزيد من المعلومات حول إيمدلترا وإدارة CRS و-ICANS يرجى قراءة نشرة الطبيب بتمعن عن طريق تصفح الرابط:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/178%2021%2037927%2000>

إذا قاسى هذا المتعالج من إحدى الأعراض الظاهرة في هذه البطاقة، فيرجى التوجه فوراً إلى الطبيب الذي أوصى بالعلاج للحصول على معلومات إضافية.

تعليمات للمتعالجين والمُعالجين

عليك البقاء على مسافة ساعة واحدة من المستشفى لمدة 48 ساعة من بدء تسريب إيمدلترا في اليوم 1 واليوم 8 للدورة 1 وأن تكون برفقة مُعالِج.

في حال قاسيت إحدى الأعراض المفصلة في هذه البطاقة، **توجه** إلى طبيبك، الذي أوصى بالعلاج.

إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى عيادة طبيبك، **توجه** إلى غرفة الطوارئ في المستشفى. في حال ظهور أعراض عصبية مرتبطة ب-ICANS، مثل دوار، إختلاجات وإرتباك بعد تسريب إيمدلترا **فتجنّب** القيادة، تشغيل الآلات الثقيلة أو الخطرة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة الخطيرة، وذلك إلى أن تزول هذه الأعراض.

بطاقة للمتعالج بـ إيمدلترا (تارلاتاماب)

يتم تعبئتها من قِبل الطبيب الذي أمر بالعلاج

هذا المريض يتعالج بـ إيمدلترا

إسم المتعالج/رقم الهاتف:

تاريخ وساعة التسريب الأول من إيمدلترا:

إسم الطبيب الذي أمر بالعلاج/رقم الهاتف:

شخص للتواصل في حالات الطوارئ/رقم الهاتف:

إسم المستشفى/المركز/المؤسسة:

معلومات هامة للمتعالجين الذين يتلقون علاجاً بـ إيمدلترا

للمتعالجين والمُعَالِجِين

قد يسبب إيمدلترا أعراضاً جانبية خطيرة وتشكل خطراً على الحياة مثل متلازمة إطلاق السيروتونين (CRS) ومشاكل عصبية - متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا الفعالة للجهاز المناعي (ICANS). إتصل بطبيبك أو توجه فوراً لتلقي علاج طبي طارئ إذا قاسيت إحدى هذه الأعراض.

(CRS) متلازمة إطلاق السيروتونين

- سخونة قدرها 38 درجة مئوية أو أعلى
- ضغط دم منخفض
- إنهاك/إرهاق
- نبض سريع أو دوار
- قشعريرة
- صداع
- ضيق تنفس أو صعوبات في التنفس
- نقص الأكسجين في الدم
- غثيان أو تقيؤات
- إرتباك
- عدم هدوء أو الشعور بقلق
- مشاكل في التوازن والحركة، مثل صعوبة في المشي

متلازمة السمية العصبية المرتبطة بخلايا الجهاز المناعي (ICANS)

- صعوبة في النطق
- فقدان الذاكرة أو تغيرات في الشخصية
- إرتباك، إرتباك حاد، الشعور بتوهان، تفكير بطيء أو عدم القدرة على التفكير بوضوح
- إختلاجات
- مشاكل في المشي أو فقدان التوازن أو التنسيق
- ضعف أو خدر في اليدين أو في الرجلين
- إرتجاف
- صداع
- خدر أو وخز في راحتي اليدين أو راحتي الرجلين
- دوار
- إغماء أو فقدان الوعي
- ضعف عضلي
- نعاس

إذا وُجد لديك واحد من هذه الأعراض، إتصل بطبيبك، أو توجه فوراً لتلقي علاج طبي طارئ. هذه ليست كافة الأعراض الجانبية المحتملة لـ **إيمدلترا**. يرجى قراءة نشرة المستهلك بتمعن للحصول على قائمة كاملة للأعراض الجانبية المحتملة.

عليك إعلام طبيبك إذا وُجد لديك أي عرض يزعجك أو لا يزول.

للمتعالجين والمُعالجين

عليك إستشارة الطبيب الذي أمر بعلاجك بشأن تناول أدوية أخرى أثناء تناول إيمدلترا.

من المهم أن تتذكر:

عليك البقاء على مسافة ساعة واحدة من المستشفى لمدة 48 ساعة من بدء تسريب إيمدلترا في اليوم 1 واليوم 8 للدورة 1 وأن تكون برفقة مُعالِج.

هذا الأمر مطلوب في حال تطورت لديكم أعراض جانبية خطيرة وكنتم بحاجة لعلاج طبي فوري.

معلومات إضافية:

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية حول إيمدلترا،
يرجى قراءة نشرة المستهلك بتمعن المتوفرة في الرابط
<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

أو

إتصل بالموزع المحلي للدواء شركة ميديسون فارما عبر البريد
الإلكتروني medinfoisrael@medisonpharma.com.
بالإمكان التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة عن طريق تصفح
الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

أو

تبليغ الموزع المحلي للدواء، شركة ميديسون فارما:
PVIsrael@Medisonpharma.com

إيمدلترا (تارلاتاماب) بطاقة متعالج للمتعالجين/المُعَالِجِين

- عليك أن تحمل هذه البطاقة معك طوال الوقت
- إذا قاسيت أياً من الأعراض المفصلة في هذه البطاقة، توجه **إلى طبيبك** أو توجه إلى غرفة الطوارئ
- **إعرض هذه البطاقة** إذا توجهت إلى غرفة الطوارئ ولأي فرد من الطاقم الطبي المشارك في علاجك