

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אקמול פוקוס		
קפליות		
הרכב		
כל קפליה מכילה:		
חומצה אצטילסליצילית	250 mg	Acetylsalicylic acid
פרצטמול	650 mg	Paracetamol
קפאין	25 mg	Caffeine anhydrous

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף 3 - "כיצד תשתמש בתרופה". היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 5 ימים בטיפול בכאב או לאחר 3 ימים בטיפול בכאב המלווה בחום (ראה סעיף 3 - "כיצד תשתמש בתרופה").

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה זמנית של כאב ראש, כאב מתון עד בינוני הקשור למיגרנה, כאב של אי נוחות וסתית וכאב המלווה בחום.

קבוצה תרופתית:

חומצה אצטילסליצילית – נוגד דלקות שאינם סטרואיד (NSAIDs)

פרצטמול – משכך כאבים מוריד חום

קפאין – קסנטין אלקלואיד, מעורר את מערכת העצבים המרכזית

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחמורים העולים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרט בסעיף 6).
- היית לך בעבר תגובה אלרגית לתרופות** אחרות **המשמשות לטיפול בכאב, דלקת או חום**, כגון: חומצה אצטילסליצילית, סליצילאט, דיקלופנק או איבופרופן.
- תסמינים של תגובה אלרגית** עוללים לכלול: אסתמה, צפצופים או קוצר נשימה, פריחה עורית או חרלת, התנפחות של הפנים או הלשון, נזלת. אם אינך בטוח, שאל את הרופא או הרוקח.
- יש לך **כיב קיבה או כיב מעיים**, או אם יש לך **היסטוריה של כיב עיכולי (פפטי)**.
- הבחנת **בדם בצואה או בצואה שחורה** (תסמינים של דימום או נקבים במערכת העיכול).
- הינך סובל **מהמופיליה או הפרעות אחרות בדם**.
- הינך סובל **מבעיות חמורות בלב, בכבד ובכליות**.
- הינך נוטל **יותר מ-15 מ"ג מתוטרקסט לשבוע** (ראה סעיף "תגובות בין תרופתיות").
- הינך נמצאת **בשלושת החודשים האחרונים של ההיריון** (ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בהגמול פוקוס, ספר לרופא אם:

- את אובחנת בעבר כסובל ממיגרנות, מאחר שיש לשלול לפני הטיפול מצבים שעשויים להיות חמורים אשר קשורים למוח או למערכת העצבים.
- הינך סובל מ**מיגרנה** שהיא כח **חרפה אשר דורשת מנוחה במיטה**, או אם יש לך כאב ראש מוגה מהמיגרנות הרגילות שלך, או אם הינך סובל **מהקאות יחד עם כאבי הראש של המיגרנה**.
- התחלת לסבול מ**כאבי ראש לאחר או עקב פגיעת ראש, מאמץ, שיעול או התכופות**.
- יש לך כאבי ראש כרוניים (חמישה עשר ימים או יותר בחודש במשך יותר משלושה חודשים), או אם חווית את כאב הראש הראשון שלך לאחר גיל 50.
- הינך סובל מבעיות בכבד או בכליות, תת משקל או תת תזונה או שהינך שותה אלכוהול באופן קבוע. ייתכן שתצטרך להימנע לחלוטין משימוש במוצא או שתצטרך להגביל את צריכת פרצטמול.
- הינך סובל מזיהום חמור, תת תזונה חמורה, תת משקל חמור או הינך שותה אלכוהול תמידי. זה עלול להגביר את הסיכון לחמצת מטבולית. סימנים של חמצת מטבולית: קשיי נשימה (נשימה עמוקה, מהירה), בחילות, הקאות ואובדן תיאבון. יש לפנות לרופא מיידית באם אתה חווה תסמינים אלו.
- אתה סובל ממצב תורשתי הנקרא **חסר באזנים G6PD** (גלוקוז – 6 פוספט דהידרוגנאז) אשר משפיע על כדורית הדם האדומות ועלול לגרום לאנמיה, צהבת או הגדלת הטחול כאשר יש חשיפה למזונות מסוימים, ותרופות כגון תרופות נוגדות דלקת מסוימות (כגון חומצה אצטילסליצילית (אספירין)), או לגרום למחלות אחרות.
- סבלת בעבר **מבעיות במערכת העיכול** כגון כיב קיבה, דימום או צואה שחורה, אם הייתה לך אי נוחות בטנית או צרבת לאחר נטילת משככי כאבים או תרופות נוגדות דלקת.
- הינך סובלת **מהפרעות של דימומים או דימום מהנרתיק אשר אינו תקין** בשונה מהווסת (כגון דימום וסתי כבד ממושך באופן יוצא דופן).
- עברת לאחרונה **ניתוח** (כולל ניתוחים קטנים כגון ניתוח שיניים) או הינך עומד לעבור ניתוח במהלך שבעת הימים הקרובים.
- הינך סובל **מאסתמה במבוגרים, קדחת השת (נזלת אלרגית), פוליפים באף, מחלה שמיתית כרונית או שהינך מפתח תסמינים אלרגיים** (כגון תגובות עוריות, גרד, סרפדת).
- הינך סובל **משיגדון (גאוס), סוכרת, פעילות יתר של בלוטת התריס, הפרעות בקצב לב, יתר לחץ דם לא מבוקר, ליקוי בתפקוד הכליות או הכבד**.
- הינך סובל מהתמכרות **אלכוהול** (ראה סעיף – "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול").

הינך **נוטל תרופות אחרות המכילות חומצה אצטילסליצילית (אספירין) או פרצטמול**, או תרופות אחרות, מאחר שתרופות מסוימות עלולות להפריע לאקמול פוקוס ולגרום לתופעות לוואי (ראה סעיף- "תגובות בין תרופתיות"). הינך נמצא **בסכנת התייבשות** (לדוגמה: הקאות, שלשול או לפני או אחרי ניתוח גדול).

גיךך פחות תסמונה עריה שנים. יש קשר אפשרי בין חומצה אצטילסליצילית (אספירין) ותסמונת ריי כאשר ניתן לילדים ולמתבגרים. תסמונת ריי הינה תסמונת נדירה, אשר משפיעה על המוח והכבד, ועלולה להיות קטלנית. מסיבה זו, אין להשתמש באקמול פוקוס במתבגרים ובילדים מתחת לגיל 18 ללא הנחיה מפורשת מהרופא.

סובל או סבלת בעבר מצהבת.

אזהרות נוספות:

כמו בנטילת כל סוג של משככי כאבי ראש, נטילת אקמול פוקוס לעיתים קרובות מדי (כלומר, יותר מעשר ימים בחודש עבור תרופה זו), כאשר יש כאבי ראש כרוניים (חמישה עשר ימים או יותר לחודש), במשך יותר משלושה חודשים, עלולה להחמיר את כאב הראש או המיגרנה שלך.

אם אתה חושב כי זה עשוי להיות המקרה, פנה לרופא להתייעצות. ייתכן שתצטרך להפסיק את נטילת אקמול פוקוס כדי לפתור את הבעיה.

אקמול פוקוס עלול להגביר תסמיני זיהום (כגון כאב ראש, חום גוף גבוה) ולכן עלול לגרום לכך שקשה יותר לזהות את הזיהום. אם אינך מרגיש טוב ועליך לפנות לרופא, זכור לומר לו כי אתה נוטל אקמול פוקוס.

ילדים ומתבגרים

אקמול פוקוס אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 12 שנים.

בדיקות ומעקב

אקמול פוקוס עלול להשפיע על תוצאות בדיקות מעבדה. אם התבקשת לבצע בדיקות דם, שתן או בדיקות מעבדה אחרות, זכור לספר כי אתה נוטל אקמול פוקוס.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם ילקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- כל תכשיר אחר אשר מכיל פרצטמול, חומצה אצטילסליצילית (אספירין) או כל משכך כאבים/מוריד חום אחר**.
- תרופות למניעת קרמשת דם כגון נוגדי קרישה פומיים (לדוגמה ואפרין), הפרין, תרופות להמסת פקין (לדוגמה סטרפטוקינאז), או תרופות נוגדות טסיות אחרות (טיקלודיפין, קלופידוגרל, צילוסטאזול).
- קורטיקוסטרואידים (משמשים להקלה של דלקת).
- ברביטורטים ובנזודיאזפנים (לטיפול בהרדה ובנודודי שינה).
- ליתיום, מעכבי קליטה חוזרת בררניים של סרטונין (SSRI) או פלובוקסמין (לטיפול בדיכאון).
- סולפוניל-אוריאה ואינסולין (לטיפול בסוכרת).
- מתוטרקסט (לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן, דלקת פרקים או ספחת).
- תרופות מסוימות לטיפול בזיהום (כגון ריפאמפיצין, איזוניאזיד, כלורמפניקול, ציפרופלוקסצין או חומצה פיפמידיית).
- לבותרוקסין (לטיפול בתת פעילות של בלוטת התריס).
- מטוקלופראמיד (לטיפול בבחילות והקאות).
- תרופות לטיפול באפילפסיה.
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם ובאי ספיקת לב.
- תרופות משתנות (להגברת ייצור שתן והפחתת עודף נוזלים).
- תרופות לטיפול בשיגדון (גאוס).
- אמצעי מניעת היריון פומיים.
- זידובודין (לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי).
- תרופות לטיפול בכיניו קיבתי איטי כגון פרופנתילין.
- קלזאפין (לטיפול בסכיזופרניה).
- תרופות סימפטומימיות (להתעלות) לתוך דם או לטיפול בגודש באף).
- תרופות כנגד אלרגיה (לטיפול או להקלה באלרגיות).
- תאופילין (לטיפול באסתמה).
- טרבינפיץ (לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
- סימטידין (לטיפול בצרבת ובכיב פפטי).
- דיוסילרפין (לטיפול בתלות באלכוהול).
- ניקוטין (לגמילה מעישון).
- כולסטיראמין (לטיפול ברמות כולסטרול גבוהות).
- פלוקלוקסצילין (אנטיביוטיקה), עקב סיכון רציני להפרעות בדם ובנוזלים (high anion gap metabolic acidosis) אשר מחייבת טיפול דחוף ועלולה לקרות במיוחד במקרים של פגיעה לתינת חמורה, אלח דם מצב בו חיידקים והרעלים שלהם נמצאים בדם ומובילים לפגיעה באיברים), תת תזונה, אלכוהוליזם כרוני ובמקרים שיש שימוש במינון יומי מקסימלי של פראצטמול.

שימוש בתרופה ומזון

המנה המומלצת של תרופה זו כוללת כמות קפאין דומה לזו שיש בכוס קפה. בתקופת השימוש בתרופה, הגבל את הצריכה של תרופות, מאכלים ומשקאות הכוללים קפאין מאחר שיותר מדי קפאין עלול לגרום לעצבנות, חוסר שקט, דודי שינה ולעיתים לדפיקות לב מהירות.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת אלכוהול בזמן השימוש בתרופה. אם אתה צורך שלושה או יותר משקאות אלכוהוליים בכל יום, ישאל את הרופא אם עליך ליטול תרופה זו או תרופות אחרות להקלת כאב/הרדת חום. פראצטמול וחומצה אצטילסליצילית (אספירין) עלולים לגרום לנזק לכבד ולדימום בקיבה.

היריון הנקה ופוריות

תרופה זו אינה מומלצת במהלך ההיריון.

אם את בהריון, חושבת שיתכן ואת בהריון או מתכננת להרות, ספרי לרופא שלך ואל נטלי אקמול פוקוס.

היריון – שליש אחרון:

החשוב במיוחד לא היטבר לאקמול פוקוס במהלך שלושת החודשים האחרונים של הריון, מאחר והדבר עלול להזיק לעובר או לגרום לבעיות בזמן הלידה. זה עלול לגרום לבעיות בכליות או בלב העובר. זה עלול להשפיע על הנטייה שלך או של התינוק שלך לדמם או לגרום ללידה מאוחרת מהצפוי.

היריון – שליש ראשון ושני:

בשל תכולת האספירין, אין ליטול תרופה זו במהלך 6 החודשים הראשונים להיריון. אלא אם הטיפול הכרחי ובהמלצת הרופא שלך בלבד.

אם את צריכה טיפול במהלך תקופה זו, יש להשתמש במינון הנמוך ביותר ולתקופה הקצרה ביותר.

אם נטלת תרופה זו למשך יותר מכמה ימים משבוע 20 להריון ואילך, אספירין עלול לגרום לבעיות בכליות בתינוק שטרם נולד, מה שבוניק (המוט נמוכות של פרוקטין) שלקיים בעיות של תינוקן או שלילית חמורה, אלח דם בלב תינוק (Ductus Arteriosus). אם תזדקקי לטיפול ממושך יותר מכמה ימים, הרופא עשוי להמליץ על בדיקות מעקב נוספות.

אקמול פוקוס אינו מומלץ בזמן הנקה.

התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בכל תרופה.

אקמול פוקוס שייך לקבוצת תרופות (NSAIDs) אשר עלולות לפגוע בפוריות בנשים. השפעה זו הינה הפיכה כאשר מופסקים את נטילת התרופה.

נהיגה ושימוש במקונות:

לטיפול אקמול פוקוס אין השפעה ניתועה על יכולתך לנהוג ולהשתמש במכונות.

אם אתה מבחין בתופעות לוואי כגון סחרחורת או נמנום, עליך להימנע מנהיגה ומשימוש במכונות.

ספר לרופא בהקדם האפשרי.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

אקמול פוקוס מכילה חומר צבע אדום אלורה רד (Allura Red) וצבע צהוב סנסט FCF (Sunset Yellow FCF) העלולים לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

לטיפול בכאב ראש המקושר למיגרנה:

מבוגרים: 2 קפליות. אם התרופה נלקחה למיגרנה ולא חלה הטבה או שחלה החמרה לאחר מנה ראשונה, יש להתייעץ עם הרופא.

ילדים מתחת לגיל 18 שנים: יש להתייעץ עם הרופא.

אין ליטול התרופה מעבר ל- 48 שעות למיגרנה

לכאבי ראש, כאב אי נוחות וסתית וכאב המלווה בחום:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2 קפליות כל 6 שעות.

הקלה בכאב עשויה להיות מורגשת תוך 15 דקות מלקיחת המנה.

אין ליטול יותר מ- 8 קפליות ב- 24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין להשתמש בתרופה לפרק זמן העולה על 5 ימים לכאב או 3 ימים לכאב המלווה בחום ללא התייעצות עם רופא.

קשישים:

אין המלצה למינון מיוחד. אם יש לך משקל גוף נמוך, עליך להיוועץ עם הרופא או הרוקח.

יש לבלוע את התרופה בשלמותה עם כוס מים מלאה.

אין לחצות או לכתוש את התרופה.

אין מידע לגבי חציה/כתשיה/לעיסה.

אין לישכב 30-15 דקות לאחר נטילת התרופה.

קפליות אקמול פוקוס מכילות חומצה אצטילסליצילית (אספירין), פרצטמול וקפאין. אין ליטול יותר מהמינון המומלץ ואין ליטול תרופות אחרות אשר עשויות להכיל מרכיבים אלו או מרכיבים אחרים המשמשים לטיפול בכאב, דלקת או חום גבוה (תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות) במהלך השימוש באקמול פוקוס. יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

טיפול רפואי מיידִי הינו קריטי, לאור הסיכון האפשרי של נזק בלתי הפיך לכבד בגלל הפרצטמול. אלא תחכה להופעת התסמינים מאחר שבהתחלה, מנת היתר עשויה שלא לגרום לתסמינים שניתן להבחין בהם.

אם מופיעים תסמינים של מנת יתר הם עשויים להיות:

- עבור חומצה אצטילסליצילית (אספירין):** סחרחורת, צלצולים באזניים, חרשות, הזעה, נשימת יתר, חום גבוה, בחילות, הקאות, כאב ראש, בלבול או חוסר מנוחה, קריסה סירקולטורית (של דזימת הדם), או כשל נשימתי.
- עבור פרצטמול:** התסמינים הראשונים שעלולים להופיע הם בחילות, הקאות, שלשול, חוסר תיאבון, חיוורון, ישנוניות, הזעה ולאחר מכן כאב בטן. נפיחות, כאב או רגישות בבטן העליונה שייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.
- עבור קפאין:** חרדה, עצבנות, חוסר מנוחה, דודי שינה, התרגשות, התכווצות שרירים, בלבול, פרנוסיס, היפרגליקמיה, טקיקרדיה (קצב לב מהיר) או הפרעות בקצב הלב.

אפילו אם תסמינים אלו או מופיעים או אם הם נעלמים, חיוני לגשת לעזרה רפואית באופן מיידי.

אם שנחת ליטול את התרופה יש ליטול את התרופה ברגע שנזכרת אך אל תיטול מנה נוספת בכדי לפצות על מנה שנשכחה.

אין ליטול יותר מ-8 קפליות בפרק זמן של 24 שעות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. **הרכב משקפיים** **אם הינך זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול פוקוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. איל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא אם אתה חווה אחת או יותר מתופעות לוואי עמורות אלו:

- תגובה אלרגית עם נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון. הדבר עלול לגרום לקשיי בליעה, צפצופים בעת נשימה, קשיי נשימה ותחושת לחץ בחזה (סימנים של אסתמה). עלולה להיות לך גם פריחה או גרד, או שתחווה עליון.
- פריחה עורית (כולל חרלת, גרד), אדמומיות של העור, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או בפה, קילוף של העור, פצעים כיבים בפה.
- פרצטמול יכול לגרום במקרים נדירים, להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים שלהם יכולים להיות אודם, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת. תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פרצטמול ללא בעיה.
- אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.
- אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון דימומים, חבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות.
- דימום בקיבה או במעיים, כיב קיבה או כיב במעיים, אשר עלולים להיות מלווים בכאב בטן חריף, צואה דמית או שחורה או הקאה דמית. כמו בטיפול עם כל משככי כאבים מורידי חום, תופעות אלו עלולות לקרות בכל זמן במהלך הטיפול, ללא היסטוריה קודמת ועלולות להיות קטלניות. תופעת לוואי זו חמורה במיוחד בקשישים.
- הצהבה של העור או העיניים (סימנים לכשל כבדי).
- סחרחורת או כאב ראש קל (סימנים של לחץ דם נמוך).
- קצב לב לא סדיר.
- חווית בעיות נשימה עם חומצה אצטילסליצילית או נוגד דלקת לא סטרואידִי, ואתה חווה תגובה דומה עם אקמול פוקוס.
- חבורות או דימומים בלתי מוסברים.
- עליה במספר הדימומים מהאף או חבלות.
- נפיחות או אגירת מים.
- צלצולים באזנים או איבוד שמיעה זמני.
- שינויים בהתנהגות, בחילות והקאות (זה עלול להיות סימן לתסמונת ריי).

תופעות לוואי נוספות

תופעות הלוואי שלהלן דווחו ב-16 מחקרים קליניים שבוצעו על למעלה מ-4,800 מטופלים.

ספר לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי האלו:

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות בעד 1 משתמש מתוך 10

- עצבנות, סחרחורת
- בחילות, אי נוחות בטנית

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות בעד 1 משתמשים מתוך 100

- דודי שינה, רעד, תחושת נימול, כאב ראש
- יושב בפה, שלשול, הקאות
- עייפות, תחושת עצבנות
- עלייה בקצב הלב

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות בעד 1 משתמשים מתוך 1,000

- כאב גרון, קשיי בליעה, תחושת נימול או קוצצוים סביב הפה, עודף רוק
- ירידה בתיאבון, שינויים בחוש הטעם
- חרדה, אופוריה, מתח
- הפרעות קשב, אובדן זיכרון, שינוי בקואורדינציה (תיאום תנועות)
- תחושת כאב בלחיים ובמצח
- כאב עיניים, הפרעות ראייה
- גלי חום, בעיות בכלי דם הקפיים (כגון בזרועות וברגליים)
- דימום באף, נשימה איטית ושטוחה, נזלת
- גיהוקים, נפיחות (גזים)
- הזעת יתר, גרד, פריחה מגרדת, עלייה ברגישות העור
- קשייון של שרירים, העצמות או המפרקים; כאב צוואר, כאב גב, התכווצות שרירים
- חולשה, אי נוחות בחזה

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

תופעות הלוואי שלהלן דווחו גם הן מאז תחילת שיווק התרופה. באופן כללי לא ניתן לקבוע במדויק את השכיחות בזמן המעקב בתקופה שלאחר השיווק ולכן השכיחות מצויינת כ"לא ידועה".

- חוסר מנוחה, הרגשה כללית לא טובה או לא תקינה
- ישנוניות, מיגרנה
- אדמומיות של העור, פריחה. מקרים נדירים מאוד של תגובות עוריות חמורות דווחו.
- דפיקות לב, קוצר נשימה, קשיי נשימה פתאומיים ותחושה של לחץ בחזה עם צפצופים או שיעול (אסתמה)
- כאב בטן, אי נוחות בטנית לאחר ארוחות
- עלייה באנזימי כבד
- נפיחות וגיירוי בתוך האף
- בעיות בכליות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם הינך סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על-ידי נכיסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. אין לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.