

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُستوق الدواء بدون وصفة طبيب

<b>أكامول فوكوس</b>	
<b>حبيسولات</b>	
<b>التركيب</b>	
<b>تحتوي كل حبيسولة على:</b>	
حمض الساليسيليك	250 mg
پاراسيتامول	250 mg
كافيين	65 mg

لمعلومات حول المواد غير الفعّالة والمُثيرة للحساسية: أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" و**البند 6 - "معلومات إضافية"**.

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك تناول المستحضر بموجب التعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء". استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمَت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام من علاج الألم أو بعد 3 أيام من علاج الألم المصحوب بالحمى (انظر البند 3 – "كيف تستعمل الدواء").

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء مصصص للتخفيف المؤقت لآلم الرأس، الألم المعتدل حتى المتوسط المرتبط بالشفيقة (الصداع النصفي)، ألم عدم الراحة المتعلق بالدورة الشهرية والألم المصحوب بالحمى.

**المجموعة العلاجية:**

**حمض الساليسيليك** – مضاد التهابات لاسترولونيدي (NSAIDs)

**پاراسيتامول** – مُسكّن آلام وخافض للحرارة

**كافيين** – زائتين شبه قلوي، يحفز الجهاز العصبي المركزي

### 2. قبل استعمال الدواء

**يُمنع استعمال الدواء إذا:**

- كانت لديك حساسية (حساسا) للمواد الفعّالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر التفصيل في البند 6).
- كانت لديك في السابق ردة فعل تحسّسية لأدوية أخرى سُتُعمل لعلاج الألم، الالتهاب أو الحمى،** مثل حمض الساليسيليك، الساليسيلات، ديكلوفيناك أو إيبوبروفين.
- أعراض ردة فعل تحسّسية** والتي قد تشمل الربو، صغير أو ضيق التنفس، طفح جلدي أو شرى، انتفاخ الوجه أو اللسان، سيلان الأنف. إذا لم تكن واثقا، اسأل الطبيب أو الصيدلي.
- لديك **قرحة معدية أو قرحة في الأمعاء** أو إذا كان لديك **تاريخ من القرحة الهضمية**.
- لايظن وجود دم في البراز أو براز أسود (أعراض لوجود نزيف أو قُتوب في الجهاز الهضمي).
- كنت تعاني من **هيموفيليا** أو اضطرابات أخرى في الدم.
- كنت تعاني من **مشاكل خطيرة في القلب، الكبد والكلى.**
- كنت تتناول أكثر من **15 ملغ ميؤثرتركيمات في الأسبوع** (انظر بند "ردود الفعل بين الأدوية").
- كنت **ضمن آخر ثلاثة أشهر من الحمل** (انظري بند "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

**قبل بدء العلاج بأكامول فوكوس، أخبر الطبيب إذا:**

لم يتم في السابق تشخيص إصابتك بالشفيقة (الصداع النصفي)، لأنه من الواجب قبل العلاج، استبعاد الحالات التي قد تكون خطيرة وقد تكون مرتبطة بالدماغ أو بالجهاز العصبي.

كنت تعاني من صداع نصفي شديد لدرجة **تستدعي الاستراحة في السرير**، أو إذا كان لديك ألم رأس يختلف عن حالات الصداع النصفي العادية التي لديك، أو إذا كنت تعاني من التقيؤ

**المصاحب لآلام الرأس المرتبطة بالصداع النصفي (الشفيقة).**

بدأت تعاني من **آلام رأس بعد أو في أعقاب إصابة في الرأس، بذل جهد، سعال أو الانحناء.**

لديك **آلام رأس مزمنة** (خمسة عشر يوما أو أكثر في الشهر، لمدة أكثر من ثلاثة أشهر)، أو إذا عانيت من أول ألم رأس بعد عمر 50 عاما.

كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى، نقص الوزن أو سوء التغذية أو إذا كنت تشرب الكحول بصورة دائمة. قد تحتاج لتجنّب استعمال المنتج بصورة كاملة أو قد تحتاج لتقييد استهلاك الپاراسيتامول.

كنت تعاني من عدوى خطيرة، سوء تغذية وخيم، نقص الوزن الشديد أو إذا كنت تشرب الكحول بصورة دائمة. قد يزيد هذا من الخطورة لحصول الحماض الأيضي. علامات الحماض الأيضي: صعوبات التنفس (تنفس عميق، سريع)، حالات غثيان، حالات تقيؤ وفقدان الشهية.

يجب مراجعة الطبيب فوراً إذا شعرت بمثل هذه العلامات.

كنت تعاني من حالة وراثية يطلق عليها اسم **عَوَز إنزيم G6PD** (نازعة هيدروجين الجلوكوز-6-فوسفات) الذي يؤثر على كريات الدم الحمراء وقد يؤدي لفقر الدم، اليرقان أو تضخم الطحال عند التعرض لأنواع معينة من الطعام، وأدوية مثل بعض الأدوية المضادة للالتهاب (مثل حمض الساليسيليك (أسبرين))، أو التسبب بأمراض أخرى.

عانيت في الماضي من **مشاكل في الجهاز الهضمي** مثل قرحة المعدة، نزيف أو براز أسود، إذا كانت لديك حالة من الانزعاج في البطن أو حرقة بعد تناول مسكنات الام أو أدوية مضادة للالتهاب.

كنت تعانيين من **اضطرابات على شكل حالات نزيف أو نزيف غير سليم من المهبل** بخلاف الطمث (مثل نزيف طمثي ثقيل ومتواصل بصورة استثنائية).

خضعت مؤخرا **لجراحة** (وخصوصن ذلك الجراحات الصغيرة مثل جراحة الأسنان) أو على وشك الخضوع لجراحة خلال الأيام السبعة القريبة.

كنت تعاني من **الربو لدى البالغين، حصى الكلى (سيلان الأنف التحسسي)، سلائل في الأنف، مرض تنفسي مزمن** أو إذا كانت تتشأ لديك أعراض تحسسية (مثل ردود الفعل الجلدية، الحكة، الشرى).

كنت تعاني من **النفرس (چاوت)، السكري، فرط نشاط الغدّة الدرقية، اضطرابات في نظم القلب، ارتفاع ضغط الدم غير المرغاب، خلل في أداء وظيفة الكلى أو الكبد.**

كنت تعاني من **الإدمان على الكحول** (انظر بند - "استعمال الدواء واستهلاك الكحول").

كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على **حمض الساليسيليك (أسبرين) أو پاراسيتامول،** أو أدوية أخرى، نظراً لأن بعض الأدوية قد تعيق عمل أكامول فوكوس وتسبب أعراضا جانبية (انظر بند "ردود الفعل بين الأدوية").

كنت **مُعرضا لخطر الجفاف** (مثلا التقيؤ، الإسهال أو قيل أو بعد عملية جراحية كبيرة).

**عمرك أقل من ثمانية عشر عاما.** هنالك علاقة محتملة بين حمض الساليسيليك (أسبرين) وملازمة راي عندما يتم إعطاؤه للأطفال والمراهقين. ملازمة راي هي ملازمة نادرة، تؤثر على الدماغ والكبد، وقد تكون قاتلة. لهذا السبب، يُمنع استعمال أكامول فوكوس للمراهقين والأطفال دون سن 18 عاما دون توصية صريحة من الطبيب.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اليرقان.

**تحذيرات إضافية:**

كما هي الحال عند تناول أي نوع من مسكنات الام الرأس، فإن تناول أكامول فوكوس في أوقات أكثر تقاربيا مما ينبغي (أي، أكثر من عشرة أيام في الشهر لهذا الدواء)، عندما تكون هنالك آلام رأس مزمنة (خمسة عشر يوما أو أكثر في الشهر)، لأكثر من ثلاثة أشهر، قد يؤدي لتفاقم ألم الرأس أو الشفيقة (الصداع النصفي) لديك.

إذا كنت تعتقد بأن الحالة قد تكون هكذا، فتوجه للطبيب للاستشارة. قد يتوجب عليك التوقف عن تناول أكامول فوكوس من أجل حلّ المشكلة.

قد يقلل أكامول فوكوس من أعراض التلوث (مثل ألم الرأس، ارتفاع حرارة الجسم)، ولذلك فإنه قد يسبب صعوبة أكبر في تشخيص التلوث. إذا كنت تشعر بسوء وعليك التوجه للطبيب، تذكر أن تخبره بأنك تتناول أكامول فوكوس.

**الأطفال والمراهقون**

أكامول فوكوس ليس مخصصا لاستخدام الأطفال دون سن 12 عاما.

**فحوصات ومتابعة**

قد يؤثر أكامول فوكوس على نتائج الفحوص المخبرية. إذا طُلب منك إجراء فحوصات دم، بول أو فحوصا مخبرية أخرى، تذكر أن تبلغ بأنك تتناول أكامول فوكوس.

**ردود فعل بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيّة والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

أ. أي مستحضر آخر يحتوي على پاراسيتامول، حمض الساليسيليك (أسبرين) أو أي مُسكّن **الآلم/خافض حرارة** آخر.

أدوية منع تخثر الدم مثل مضادات التخرّث الفموية (مثلا وارفارين)، هيبارين، أدوية إذابة الخثرات (مثلا سترپتوكيناز)، أو أدوية أخرى مضادة للصفائح، كلويدجريل، سيلوستازول، كورتيكوستيرويدات (تستخدم لتخفيف الالتهاب).

باربيتورات وبنزوديازيبينات (لعلاج الهلع واضطرابات النوم).

الليثيوم، مَبطّات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) أو فلو فوكسامين (لعلاج الاكتئاب)، سلفونيل يوريا وإنسولين (لعلاج السكري).

ميؤثرتركيمات (لعلاج أنواع معينة من السرطان، التهاب المفاصل أو الصدفية).

بعض أنواع الأدوية لعلاج التلوث (مثل ريفامبيسين، أيزونيازيد، كلورامفينيكول، سيبروفلوكساسين أو حمض البيبيديك).

ليفوتيروكسين (لعلاج نقص نشاط الغدة الدرقية).

ميؤتكلوراميد (لعلاج الغثيان والتقيؤ).

أدوية لعلاج الصرّع.

أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب.

الأدوية المدرة للبول (لزيادة إنتاج البول وتقليل فرط السوائل).

أدوية علاج النفرس (چاوت).

وسائل منع الحمل الفموية.

زيدوفيدين (لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة).

أدوية لعلاج التفرغ المعدي البطيء مثل بروبونثيلين.

كلوزابين (لعلاج النقصم الشخصية).

أدوية المحاكيات الوذية (لزيادة ضغط الدم أو لعلاج احتقان الأنف).

الأدوية المضادة للحساسية (لعلاج أو للتخفيف من حالات الحساسية).

ثيوفيلين (لعلاج الربو).

تيربينافين (لعلاج التلوثات الفطرية).

سيميتيدين (لعلاج الحرقة والقرحة الهضمية).

ديسولفيرام (لعلاج التعلق بالكحول).

النيكوتين (لإقلاع عن التدخين).

كوليسترامين (لعلاج مستويات الكولسترول المرتفعة).

فلوكلوكسالين (مضاد حيوي)، في أعقاب خطورة جديده لحصول اضطرابات في الدم وفي السوائل (high anion gap metabolic acidosis) حيث تستوجب العلاج المستعجل وقد تحصل بصورة خاصة في حالات الضرر الكلوي الخطير، إبتان الدم (حالة تتواجد فيها البكتيريا مع بوسومها في الدم وتؤدي لإلحاق الضرر بالأعضاء)، سوء التغذية، الإدمان المزمن على الكحول والحالات التي يتم فيها استعمال الجرعة اليومية القسوى من پاراسيتامول.

**استعمال الدواء والغذاء**

تتمثل الجرعة الموصى بها من هذا الدواء كمية كافيين مساوية لكمية الموجودة في كأس من القهوة. خلال فترة استعمال الدواء، عليك تحديد استهلاك الأدوية، الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وذلك لأن كمية كافيين زائدة عن الحد قد تسبب العصبية، انعدام الهنوء، اضطرابات النوم وفي بعض الأحيان خفقان قلب سريع.

**استعمال الدواء واستهلاك الكحول**

يجب تفادي استهلاك الكحول خلال استعمال الدواء. إذا كنت تستهلك ثلاثة أو أكثر من المشروبات الكحولية في اليوم، فاسأل الطبيب إن كان عليك تناول هذا الدواء أو أدوية أخرى لتسكين الألم/خفض الحرارة. قد يسبب الپاراسيتامول وحمض الساليسيليك (أسبرين) ضررا للكبد ونزيفا في المعدة.

**الحمل، الإرضاع والتثاية**

لا يوصى باستعمال هذا الدواء خلال الحمل.

إذا كنت حاملا، متفقدین بأنك قد تكونين حاملا أو تخططين للحمل، أخبري طبيبك ولا تتناولي أكامول فوكوس.

**الحمل – الثلث الأول والثاني:**

من المهم جدا عدم تناول أكامول فوكوس خلال آخر ثلاثة أشهر من الحمل، نظرا لأن من شأن ذلك أن يسبب الضرر للجنين أو أن يسبب مشاكل خلال الولادة. قد يسبب هذا مشاكل في كلى أو في قلب الجنين. قد يؤثر هذا على ميلك أو ميل طفلك للزئيف أو التسبب بولادة أكثر تأخرا من المتوقع.

**الحمل – الثلث الأول والثاني:**

بسبب احتوائه على الأسبرين، يُمنع تناول هذا الدواء خلال أول 6 أشهر من الحمل، إلا إذا كان العلاج ضروريا ويتوسل في وقت مبكر من طبيبك فقط.

إذا كنت هذا بحاجة للعلاج خلال هذه الفترة، يجب استعمال أقل جرعة ممكنة لأقصى ممكنة. إذا تناولت هذا الدواء لفترة تزيد على عدة أيام، من الأسبوع الـ 20 للحمل وما بعده، قد يؤدي الأسبرين إلى مشاكل الكلى لدى طفلك الذي لم يولد بعد، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات منخفضة من ماء السلى المحيطة بطفلك، أو إلى تضيق الأوعية الدموية في قلب طفلك (Ductus Arteriosus).

إذا احتجت لعلاج متواصل لأكثر من بضعة أيام، قد يوصي الطبيب بإجراء فحوص متابعة إضافية.

لا يوصى بأكامول فوكوس خلال الإرضاع.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

ينتمي أكامول فوكوس إلى مجموعة الأدوية (NSAIDs) والتي من شأنها أن تسبب ضررا على خصوصية النساء. هذا التأثير قابل للإصلاح عند التوقف عن تناول الدواء.

**السياقة واستعمال الماكينات:**

ليس هناك أي تأثير معروف لتناول أكامول فوكوس على قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات. إذا كنت لاحظا أعراضا جانبية مثل النوار أو الفعاس، عليك الامتناع عن السياقة واستعمال الماكينات. أخبر الطبيب بأسرع ما يمكن.

**معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:**

يحتوي أكامول فوكوس على صبغة حمراء الورا ريد (Allura Red) وصبغة صفراء سنسبت FCF (Sunset Yellow FCF) واللّتين قد تسببان ردود فعل تحسسية.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالواء.

الجرعة المُتّبعة عادة، هي:

**لعلاج ألم الرأس المرتبط بالشفيقة:**

بالبالغون: 2 حبيسولات. إذا تم أخذ الدواء لعلاج الشفيقة (الصداع النصفي) ولم يطرأ تحسن أو طرأ تفاقم بعد الجرعة الأولى، فيجب استشارة الطبيب.

الأطفال دون سن 18 عاما: يجب استشارة الطبيب.

يمنع تناول الدواء لأكثر من 48 ساعة لعلاج الشفيقة.

**لآلام الرأس، الألم الإزعاج الطمئي الألم المصحوب بارتفاع الحرارة:**

البالغون والأطفال فوق سن 12 عاما: 2 حبيسولات كل 6 ساعات.

قد يتم الشعور بتحسن الألم خلال 15 دقيقة من تناول الجرعة.

يمنع تناول أكثر من 8 حبيسولات كل 24 ساعة.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

يُمنع استعمال الدواء لفترة زمنية تزيد عن 5 أيام للألم أو 3 أيام للآلم المصحوب بارتفاع الحرارة دون استشارة الطبيب.

المسنون:

ليست هنالك توصية بجرعة خاصة. إذا كان لديك وزن جسم منخفض، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يجب بلع الدواء كاملا مع كأس مليئة من الماء.

يُمنع شطر أو سحق الدواء.

لا تتوفر معلومات حول الشطر/السحق/المضغ.

يُمنع الاستلقاء خلال 15-30 دقيقة بعد تناول الدواء.

تحتوي حبيسولات أكامول فوكوس على حمض الساليسيليك (أسبرين)، پاراسيتامول وكافيين. يُمنع تناول أكثر من الجرعة الموصى بها ويُمنع تناول الأدوية الأخرى التي قد تحتوي على هذه المركبات أو مركبات أخرى تستعمل لعلاج الألم، الالتهاب أو الحرارة المرتفعة (الأدوية الالاستيرويدية المضادة للالتهاب) خلال استعمال أكامول فوكوس.

يجب الامتناع عن تناول جرعة مرتفعة (في حدود الموصى به) من هذه الأدوية خلال الصوم.

إذا **تناولت جرعة مفرطة** أو إذا قام طفل بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ أو المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

يعتبر العلاج الطبي الغروي بالغ الأهمية، على ضوء المخاطر المحتملة لحصول ضرر غير قابل للإصلاح للكبد بسبب الپاراسيتامول. لا تنتظر ظهور الأعراض، لأنه من شأن الجرعة المفرطة ألا تسبب في البداية أية أعراض بالإمكان ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض الجرعة المفرطة، فإنها قد تكون:

- بالنسبة لحمض الساليسيليك (أسبرين):** دوار، طنين في الأذنين، صمم، تعرق، فرط التنفس، ارتفاع الحرارة، غثيان، تقيؤ، ألم في الرأس، تلكث (بذيلة) أو انعدام الراحة، انهيار الدورة الدموية (تفقق الدم)، أو فشل تنفسي.

- بالنسبة للپاراسيتامول:** الأعراض الأولى التي من شأنها أن تظهر هي الغثيان، التقيؤ، الإسهال، فقدان الشهية، شحوب، الفعاس، التعرق وبعد ذلك ألم البطن (مغص)، انتفاخ، ألم أو حساسية في أعلى البطن والتي قد لا تعكس مدى حدة الضرر اللاحق بالكبد.

- بالنسبة للكافيين:** هلع، عصبية، انعدام الراحة، اضطرابات النوم، الانفصال، تشنج العضلات، التلثيق، نوبات صرع، فرط سكر الدم، تسرّع القلب (وتيرة نبض سريعة) أو اضطرابات في وتيرة نظم القلب.

حتى لو لم تظهر هذه الأعراض، أو إذا اختلفت، من المهم التوجه لتلقي العلاج الطبي فوراً.

إذا **نسيت تناول الدواء**، يجب تناول الدواء لحظة تذكرك ذلك لكن يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يُمنع تناول أكثر من 8 حبيسولات خلال فترة 24 ساعة.

**يُمنع تناول الأدوية في الغلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

**جميع الأدوية، قد يسبب استعمال أكامول فوكوس أعراضا جانبية لدى قسم من المستخدمين.** لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

**يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً للطبيب إذا شعرت بوحد أو أكثر من الاعراض الجانبية الشديدة التالية:**

- ردّة فعل تحسّسية مصحوبة بانتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق. حيث قد يسبب ذلك صعوبات في البلع، صغير خلال التنفس، صعوبات في التنفس وشعور بالضغط في الصدر (أعراض ربو). قد تصاب بطفح جلدي أو حكة أيضا، أو قد تصاب بالإغماء.

- طفح جلدي (بما في ذلك الشرى، الحكة)، احمرار الجلد، بثرات في الشفتين، في العينين أو في الفم، تقشّر الجلد، جروح، تقوّحات في الفم.

في حالات نادرة، قد يسبب پاراسيتامول ظهور أمراض جلدية حادة من الممكن أن تكون أعراضها الاحمرار، الطفح الجلدي، تضمر جلدي على نطاق واسع.

قد تحصل أعراض جلدية شديدة حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول دون أي مشكلة.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه للطبيب فوراً.

- إذا ظهرت أعراض لتغييرات في جهاز الدم مثل حالات نزيف، كدمات، نشوء التهابات بسهولة شديدة.

- نزيف في المعدة أو الأمعاء، قرحة معدية أو قرحة في الأمعاء، والتي من شأنها أن تكون مصحوبة بآلم بطن شديد، براز دموي أو أسود أو تقيؤ دموي. كما هي الحال عند تناول أي نوع من مسكّنات الأم وخافضات الحرارة، قد تحصل هذه الأعراض الجانبية في أي وقت خلال العلاج، دون وجود تاريخ سابق، وقد تكون قاتلة. يكون هذا العرض الجانبي شديدا، خصوصا لدى المسنين.

- اصفرار الجلد أو العينين (علامات لفشل الكبد).

- دوار أو ألم رأس طفيف (علامات انخفاض ضغط الدم).

- نظم قلب غير منتظمة.

- شعرت بمشاكل في التنفس مع حمض الساليسيليك أو مضاد التهاب غير سترونيدي، وكنت تشعر برد فعل مشابه مع أكامول فوكوس.

- كدمات أو حالات نزيف لا تفسير لها.

- ارتفاع في عدد حالات النزيف من الأنف أو الكدمات.

- انتفاخ أو تراكم الماء.

- طنين في الأذنين أو فقدان السمع المؤقت.

- تغييرات في السلوك، حالات غثيان وتقيؤ (قد تكون هذه علامة لمتلازمة راي).

**أعراض جانبية إضافية**

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في إطار 16 بحثا سريريا تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متلقي علاج.

أخبر الطبيب إذا لاحظت أحد هذه الاعراض الجانبية:

**أعراض جانبية شائعة (common) –** أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من **10**

- عصبية، دوار
- غثيان، انزعاج في البطن

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) –** أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من **100**

- اضطرابات في النوم (أرق)، رجفة، شعور بالخدر، صداع
- جفاف في الفم، إسهال، تقيؤ
- تعب، الشعور بالعصبية
- ارتفاع وتيرة نبض القلب

**أعراض جانبية نادرة (rare) –** أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من **1,000**

- آلم في الحلق، صعوبات في البلع، شعور بالخدر أو السعسات حول الفم، فرط إفراز لللعاب
- تراجع الشهية، تغييرات في حساسة النوق
- هلع، نشوة، توتّر

- اضطرابات التركيز، فقدان الذاكرة، تغييرات في التماسق الحركي (تناسق حركات الجسم)
- شعور بالألم في الوجنتين والجبهة

- الام في العينين، اضطرابات في الرؤية

- هبات حرارة، مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية (مثل في الذراعين والرجلين)

- نزيف من الأنف، تنفس بطيء، وسطحي، سيلان الأنف

- تجشؤ، انتفاخات (غازات)

- فرط التعرق، حكة، طفح جلدي مصحوب بحكة، ازدياد حساسية الجلد
- تصلّب العضلات، العظام أو المفاصل؛ ألم في العنق، ألم في الظهر، تشنج العضلات
- ضعف، انزعاج في البطن

**أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتمّ تحديدها تواترها بعد)**

كذلك، تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية منذ بدء تسويق الدواء. بصورة عامة، ليس بالإمكان تحديد مدى انتشارها بصورة دقيقة خلال فترة المتابعة أو في فترة ما بعد التسويق، ولذلك فإن نسبة شيوعها معرّفة على أنها "غير معروفة".

- انعدام الراحة، شعور عام سيء أو غير سليم

- نعاس، صداع نصفي (شفيقة)

- احمرار الجلد، طفح جلدي. تم الإبلاغ عن حالات نادرة جدا من ردود الفعل الجلدية الحادة

- خفقان القلب، ضيق التنفس، صعوبات مفاجئة في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع صغير أو سعال (ربو)

- آلم في البطن، انزعاج في البطن بعد تناول الوجبات

- ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد

- انتفاخ وتهيّج داخل الأنف

- مشاكل في الكلى

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دونائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة للتبليغ عن الأعراض

الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب الترسّؤ! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp