

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

היקומיזין

משחת עור

הרכב

Hydrocortisone 2.5% w/w

Neomycin Sulfate 0.5% w/w

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואולרגנים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עור. אל תעביר אותה לאחרים.

היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בדלקות זיהומיות של העור.

קבוצה תרופית

הידרוקורטיזון: קורטיקוסטרואיד

נאומיזין סולפאט: אנטיביוטיקה מקבוצת אמינוגליקוזידים

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) להידרוקורטיזון, לנאומיזין סולפאט, לתרופות אחרות ממשפחת האמינוגליקוזידים או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה המפורטים בפרק 6.
- אתה סובל מזיהומים נגיפיים כמו פצעי קור, הרפס או מאבעבועות רוח.
- אתה סובל מזיהומים פטרייתיים, לדוגמה בכפות הרגליים, גזזת או פטרת בפה.
- אתה סובל מלשלפוחיות בעור או מפצעים שנגרמו על ידי זיהום חידיקי כגון אימפטיגו, שחפת העור.
- כמו עם כל התכשירים לשימוש חיצוני המכילים נאומיזין, אין להשתמש בתרופה זו בדלקת האוזן החיצונית, אם קיים נקב בעור התוף.
- אם אחד מהמצבים מעלה נכונים לגביך, התייעץ עם הרופא או הרוקח.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או פצעים פתוחים אלא על פי הוראה מפורשת מהרופא.

אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם עיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיד עם מים.

לפני הטיפול בהיקומיזין, ספר לרופא אם:

- אתה משתמש במשחה תחת תחבושת אוטמת, כולל חיתול לתינוק. תחבושות אלה מאפשרות לחומר הפעיל להיספג דרך העור בקלות רבה יותר, ועלולות לגרום למינון יתר.
- יש לך בעיות בכליות. ייתכן שהרופא יחליט לשנות את כמות ותדירות מריחת המשחה.
- אתה סובל או סבל בעבר מבעיות שמיעה, אובדן שמיעה, לצלולים באזניים, סחרחורת.

אם יש החמרה במצבך בזמן השימוש בתרופה, היוועץ ברופא שרשם לך את התרופה - ייתכן שאתה חווה תגובה אלרגית, או שמצבך מצריך טיפול אחר.

אם זמן קצר לאחר הפסקת הטיפול, תוך שבועיים, אתה חווה חזרה למצבך לפני הטיפול, אל תחזור להשתמש בתרופה לפני היוועצות עם הרופא שרשם לך את התרופה, אלא אם כן קודם לכן, הורה לך הרופא לעשות כן.

אם אחרי הטיפול אתה חווה חזרה למצבך לפני הטיפול, ובזמן החזרה האדמומיות התפשטה אל מעבר לאזור שטופל לראשונה ואתה חווה תחושת בעירה, יש לפנות לרופא לפני שחוזרים על הטיפול.

המשחה מכילה פרפין. בדים (בגדים, מצעים, תחבושות וכד') שהיו במגע עם תרופה זו עלולים להתלחך ולבעור בקלות רבה יותר. אל תעשן ולא תחשף לאש גליונה בגלל הסיכון לכוונות תמורות. כביסת הבדים יכולה להקטין את הסיכון אבל לא להסיר לחלוטין.

צור קשר עם הרופא אם אתה חווה שטטשו ראייה או הפרעות ראייה אחרות.

אם אתה לא בטוח אם אזהרות אלו נוגעות אליך, היוועץ עם הרופא או הרוקח לפני התחלת השימוש בתרופה.

ילדים ומתבגרים

זיהרות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ומתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אם הרופא שנספגת לגוף בכמויות גדולות, מרכיב הנאומיזין יכול להאריך או להגדיל את ההשפעה של תרופות המרפות שרירים בזמן ניתוח. אם אתה עובר ניתוח ספר לרופא שהשתמשת במשחה.

היריון והנקה

השימוש בתרופה זו בזמן היריון או הנקה אינו מומלץ.

אם את היריון או מיניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת היריון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

הגיה ושמוש במכונות

לא סביר שהמשחה תשפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה את המרכיב לנולין (Lanolin anhydrous) אשר עלול לגרום לגירוי בעור (למשל דלקת עור ממגע).

התרופה מכילה את המרכיב מתיל פרבן (Methyl p-hydroxybenzoate (E218), העלול לגרום לתגובות אלרגיות (ייתכן שמאחרות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא שנית.

אין לטפל בתכשיר בתינוקות ובילדים מתחת לגיל 4 שנים יותר מ-3 שבועות, במיוחד באזורים המכוסים על ידי חיתולים.

במידה ולא הותווה על ידי הרופא יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע (חיתולים מפלסטיק מהווים חבישה אוטמת).

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת השימוש

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם עיניים או רקמות ריריות (כגון בפה ובאף) (ראה בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תהוית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במשחת היקומיזין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד אם מופיעה אחת התופעות הלוואי הבאות

- מצב העור מחמיר או השעור מתנפח בזמן הטיפול. ייתכן שאתה אלרגי לתרופה, יש לך זיהום או שאתה צריך טיפול אחר.

תופעות לוואי אחרות שאתה עלול להרגיש בזמן השימוש במשחה

- גירוי או גירוד במקום בו מורחים את המשחה.

- צמיחת שיער מוגברת ושינוי בצבע העור.

- טשטוש ראייה.

תופעות לוואי אם אתה משתמש במשחה זמן ממושך, בכל פעם בכמות משחה גדולה או שאתה משתמש במשחה תחת תחבושת אוטמת או חיתול

- הדקקות העור ושללול להיזק בקלות רבה יותר

- עלייה במשקל, התעגלות של הפנים ולחץ דם גבוה.

תופעות אלה יכולות להופיע יותר בתינוקות ובילדים.

תסמיני גמילה מסטרואידים:

לאחר שימוש רציף לתקופות ארוכות, עם הפסקת השימוש ייתכן הופעה של תסמיני גמילה הכוללים: אדמומיות של העור העלולה להתפשט מעבר לאזור הטיפול הראשוני, הרגעה של בעירה או עקצוץ, גירוד עז, קילוף של העור, פצעים מפרשיים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדייווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לתשע ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנע הרעלה. אל תגרום להלקא ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **יש לאחסן תרופה זו במקום יבש, מתחת ל-25°C.**

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

white petrolatum, mineral oil, lanolin anhydrous, paraffin hard, Super Harlotan wool wax alcohols, methylparaben, butylparaben.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בכל אריזה שפופרת המכילה 15 גרם משחה הומוגנית בצבע לבן-צהבהב

שם בעל הרישום, היצרן וכתובת:

טבע ישראל בע"מ, רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

נערך באוגוסט 2025.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 051-45-24387

לשם הפטנט והלקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוני מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:
For further information about the medicine and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:



ניתן לפנות לבעל הרישום לקבלת עלון לצרכן מודפס באנגלית בכתובת: Tevacare@med-trix.com או בטלפון: 1-800-805-005

You may contact the license holder for a printed leaflet in English at: Tevacare@med-trix.com or by telephone: 1-800-805-005