

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

جولوكا أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

dolutegravir (as sodium) 50 mg
rilpivirine (as hydrochloride) 25 mg

دولوتيجرافير (على شكل صوديوم) 50 ملغ
ريلبيفيرين (على شكل هيدروكلورايد) 25 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل جولوكا لمعالجة HIV لدى الكبار من عمر 18 سنة وما فوق المتعالجين بأدوية مضادة للفيروسات الرجعية والذين تلوث الـ HIV-1 لديهم مُسيطر عليه لفترة 6 أشهر على الأقل، من دون سوابق لفشل فيروسي وبدون خشية لحدوث مقاومة أو مقاومة معروفة لمثبطات إنزيم ترانسكريباز العكسي اللا نوكلوزيدية (NNRTIs) أو مثبطات الإنزيم إنتجراز.

جولوكا يُحافظ على نسبة منخفضة من الفيروس في جسمك. بذلك يُساعد على المحافظة على تعداد خلايا الـ CD4 في دمك. خلايا CD4 هي نوع من خلايا الدم البيضاء الهامة التي تساعد جسمك على محاربة التلوث.

الفصيلة العلاجية:

جولوكا هو دواء يحتوي على مُركّبين فعّالين يستعملان لمعالجة تلوث HIV: دولوتيجرافير وريلبيفيرين. دولوتيجرافير ينتمي إلى مجموعة الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي تسمى مثبطات الإنزيم إنتجراز (INIs) وريلبيفيرين ينتمي إلى مجموعة الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي تسمى مثبطات إنزيم ترانسكريباز العكسي اللا نوكلوزيدية (NNRTIs).

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمواد الفعالة دولوتيجرافير أو ريلبيفيرين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
 - كنت تتناول واحداً من الأدوية التالية، وذلك لأن بإمكانها التأثير على طريقة عمل جولوكا:
 - فامبريدين (fampridine) (المعروف أيضاً بإسم دالفامبريدين dalfampridine)، المستعمل لعلاج التصلب المتعدد.
 - كاربامازيبين، أوكسكاربازيبين، فينوباربيتال، فينيتوين (أدوية لمعالجة الصرع ولمنع الإختلاجات)
 - ريفامبيسين، ريفاننتين (أدوية لمعالجة بعض التلوثات الجرثومية مثل السل)
 - أومبيرازول، إيزوميبرازول، لانسوبرازول، بانتوبرازول، راببيرازول (أدوية لمنع ولمعالجة القرحات المعديّة، الحرقان أو مرض الإرتداد الحمضي)
 - ديكساميثازون (كورتيكوستيرويد الذي يستعمل لمعالجة العديد من الحالات مثل الإلتهابات وردود الفعل التحسسية) عندما يؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن، عدا العلاج لمرة واحدة
 - مستحضرات حاوية على St. John's wort (هيبيريكوم بيرافراتوم) (مستحضر نباتي يستعمل لمعالجة الإكتئاب)
- ← إذا كنت تتناول واحداً من المستحضرات التي ذُكرت سابقاً، إسأل الطبيب بالنسبة لأدوية بديلة.
إحك للطبيب إذا كنت تعتقد بأن واحد مما ذُكر ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء
إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول جولوفا.

ردود فعل تحسسية

جولوفا يحتوي على دولوتيغرافير. دولوتيغرافير يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي حاد يُعرف بإسم: رد فعل فرط الحساسية. عليك أن تعرف العلامات والأعراض الهامة التي يجب الإنتباه إليها عندما تتناول جولوفا.
← إقرأ المعلومات "ردود فعل تحسسية" في الفقرة 4 من هذه النشرة.

مشاكل في الكبد تشمل إلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B و/أو C

إحك للطبيب إذا وجدت لديك أو كانت لديك مشاكل في الكبد، بما في ذلك إلتهاب الكبد من نوع B و/أو C. يدرس الطبيب إلى أي حد مشكلة الكبد خطيرة لديك قبل أن يقرر فيما إذا كان بمقدورك تناول جولوفا.

إنتبه لأعراض هامة

يتطور لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية لتلوث HIV مشاكل أخرى، التي قد تكون خطيرة. هذه تشمل:
• أعراض لتلوثات وإلتهاب
• آلام في المفاصل، تصلب ومشاكل في العظام
عليك أن تتعرف على العلامات والأعراض الهامة التي يجب توخي الحذر منها أثناء تناول جولوفا.
← إقرأ المعلومات "الأعراض الجانبية المحتملة الأخرى" في الفقرة 4 من هذه النشرة.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة، وذلك لأنه لم يتم فحصه لدى هؤلاء المتعالجين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

ممنوع تناول جولوفا سوية مع بعض الأدوية الأخرى (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2). من شأن بعض الأدوية أن تؤثر على طريقة عمل جولوفا، أو تزيد من إحتمال أن تقاسي من أعراض جانبية. جولوفا يمكنه أيضاً أن يؤثر على طريقة عمل الأدوية الأخرى.
بلغ الطبيب إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية المذكورة في القائمة التالية:

- ميتفورمين، لعلاج السكري.
- أدوية قد تؤدي لعدم إنتظام نظم القلب الذي يشكل خطراً على الحياة (*Torsade de Pointes*). وذلك لأن هذه الحالة يمكن أن تنجم عن عدد من الأدوية المختلفة، عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
- أدوية مسماة مضادات الحموضة، لمعالجة عسر الهضم والحرقان. لا تتناول مضاد الحموضة خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناول جولوفا، أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله (أنظر أيضاً الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- يجب تناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد ومتعدد الفيتامينات بنفس الوقت مع جولوفا، مع وجبة الطعام. فإذا كنت غير قادر على تناول الإضافات التي ذكرت سابقاً بنفس الوقت مع جولوفا، لا تتناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناول جولوفا أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله (أنظر أيضاً الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- أدوية مسماة مضادات المستقبل H_2 (مثلاً: سيميتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين، رانيتيدين) التي تُعطى لمعالجة القرحة المعدية أو المعوية أو للتخفيف من الحرقان أو الإرتداد الحمضي.
- لا يجوز تناول هذه الأدوية خلال الـ 12 ساعة التي تسبق تناول جولوفا أو أربع ساعات على الأقل بعد تناول جولوفا (أنظر أيضاً الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- كل دواء آخر يستعمل لمعالجة تلوث HIV.
- ريفابوتين، لعلاج السل (TB) وتلوثات جرثومية أخرى. إذا كنت تتناول ريفابوتين فمن الجائز أن يضطر الطبيب إعطائك مقدار دوائي إضافي من ريليفيرين من أجل معالجة تلوث HIV (أنظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- أرتيمتر/لوميفانترين، أدوية لمنع العدوى بالمalaria.
- كلاريتروميسين وإريثروميسين، أدوية لمعالجة التلوثات الجرثومية.

- ميتادون، دواء يستعمل لمعالجة الإدمان على المستحضرات الأفيونية.
 - دابيجاتران إتيكسيلات، دواء يستعمل لمعالجة أو لمنع الخثرات الدموية.
- ← **بلغ الطبيب** إذا كنت تتناول واحداً من تلك الأدوية. من شأن الطبيب أن يقرر بأنك بحاجة لإجراء فحوص إضافية.

الحمل والإرضاع

الحمل

إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل، أو إذا كنت تخططين للحمل:

← لا يوصى باستعمال جولوفا. **استشيري الطبيب.**

يجب إبلاغ الطبيب بشكل فوري إذا أصبحت حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل. يقوم الطبيب بفحص علاجك. لا يجوز التوقف عن تناول جولوفا بدون إستشارة الطبيب، وذلك لأن هذا الأمر قد يلحق الضرر بك وبجنينك.

الإرضاع

لا يوصى بالإرضاع لدى نساء يتعايشن مع HIV وذلك لأن تلوث الـ HIV يمكن أن ينتقل إلى الرضيع عبر حليب الأم.

يمكن أن تنتقل كمية قليلة من دولوتيجر أثير، أحد مركبات المستحضر جولوفا، إلى حليبك. من غير المعروف فيما إذا كان المركب الثاني ريليفيرين يمكن أن ينتقل إلى حليبك.

إذا كنت مرضعة أو تفكرين بالإرضاع، عليك إستشارة الطبيب بأسرع ما يمكن.

السياسة وإستعمال الماكينات

جولوفا قد يسبب لك دوار، إرهاق، نعاس وأعراض جانبية أخرى التي تجعلك أقل يقظة.

← لا يجوز القيادة أو تشغيل الماكينات إلا إذا كنت واثقاً من عدم تأثرك بذلك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي جولوفا على اللاكتوز

إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع الطبيب قبل تناول هذا الدواء. يحتوي الدواء على أقل من 1 mmol صوديوم (23 ملغ) لوحدة مقدار دوائي ولذلك يعتبر عملياً خالٍ من الصوديوم.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

المقدار الدوائي الإعتيادي من جولوفا هو قرص واحد مرة في اليوم. يجب تناول جولوفا مع وجبة الطعام. وجبة الطعام هامة من أجل الحصول على المستويات الصحيحة من الدواء في جسمك. مشروب البروتينات (شراب غني بالبروتين) لوحده، لا يشكل بديلاً عن وجبة الطعام.

ممنوع سحق/شطر/مضغ القرص، وذلك للتأكد من تناول المقدار الدوائي بأكمله.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

ريفابوتين:

ريفابوتين هو دواء لمعالجة بعض التلوثات الجرثومية. يمكن لهذا الدواء أن يقلل من كمية جولوفا بجسمك ويجعلها أقل نجاعة. فإذا كنت تتناول ريفابوتين، من شأن الطبيب أن يعطيك مقدراً دوائياً إضافياً من ريليفيرين. تناول قرص ريليفيرين بنفس الوقت مع جولوفا.

← إستشر الطبيب بالنسبة لتناول ريفابوتين سوية مع جولوفا.

الأدوية المضادة للحموضة

مضادات الحموضة، لمعالجة عسر الهضم والحرقان، يمكنها أن تمنع من إمتصاص جولوفا لداخل جسمك وأن تجعله أقل نجاعة.

لا تتناول مضاد الحموضة خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناولك لـ جولوفا، أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.
← راجع الطبيب للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول الأدوية الخافضة للحموضة مع جولوفا.

إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد ومتعدد الفيتامينات
إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات يمكنها أن تمنع من إمتصاص جولوفا لداخل جسمك وأن تجعله أقل نجاعة.
يجب تناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات بنفس الوقت مع جولوفا سوية مع وجبة الطعام. إذا كنت غير قادر على تناول هذه الإضافات بنفس الوقت مع جولوفا، لا يجوز تناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناول جولوفا، أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.
← راجع الطبيب للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات مع جولوفا.

الأدوية المثبطة للمستقبل H_2 (مثلاً: سيميتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين، رانيتيدين)
الأدوية المثبطة للمستقبل H_2 يمكنها أن تمنع من إمتصاص جولوفا لداخل جسمك وأن تجعله أقل نجاعة.
لا تتناول هذه الأدوية خلال الـ 12 ساعة التي تسبق تناول جولوفا أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.
← راجع الطبيب للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول هذه الأدوية مع جولوفا.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا تناولت بالخطأ أكثر من اللازم من أقراص جولوفا، توجه حالاً إلى الطبيب أو الصيدلي. أرهم علبة جولوفا إذا أمكن.
إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء
في حال ملاحظتك لهذا الأمر خلال 12 ساعة من موعد تناول المقدار الدوائي الإعتيادي الخاص بك، تناول القرص لحظة تذكرك بذلك. يجب تناول قرص جولوفا مع وجبة الطعام. واصل بعد ذلك العلاج الخاص بك كالمعتاد.
في حال ملاحظتك لهذا الأمر بعد 12 ساعة، فوّت المقدار الدوائي المنسي وتناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي.
← لا تتناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

في حال التقيؤ بعد أقل من 4 ساعات من موعد تناول جولوفا، تناول قرصاً إضافياً مع وجبة الطعام. في حال التقيؤ بعد أكثر من 4 ساعات من موعد تناول جولوفا، لا داعي لتناول قرصاً إضافياً حتى موعد تناول الجرعة القادمة.

لا يجوز التوقف عن تناول جولوفا بدون إستشارة الطبيب
تناول جولوفا لطالما أوصاك الطبيب بذلك. لا تتوقف إلا إذا أوصاك الطبيب بفعل ذلك.
يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال جولوفا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
من المهم جداً إبلاغ الطبيب عن أي تغيير يطرأ على صحتك.

ردود فعل تحسسية

جولوفا يحتوي على دولوتيچرافير. دولوتيچرافير يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي حاد يُعرف باسم: رد فعل فرط الحساسية. رد الفعل هذا غير شائع (قد يظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص) لدى الأشخاص الذين يتناولون دولوتيچرافير. إذا ظهر واحد من الأعراض التالية لديك:

- طفح جلدي

- سخونة عالية
 - قلة حيوية (إرهاق)
 - إنتفاخ، أحياناً في الفم أو الوجه (وذمة وعائية)، الذي يسبب صعوبة في التنفس
 - آلام في العضلات أو المفاصل
- ← توجه حالاً إلى الطبيب. من شأن الطبيب أن يقرر على إجراء فحوص للكبد، الكلى أو الدم لديك، ومن شأنه أن يوصيك بالتوقف عن تناول جولوكا.

أعراض جانبية شائعة جداً

هذه من شأنها أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص:

- صداع
- دوار
- إسهال
- غثيان
- صعوبات في النوم (أرق)

أعراض جانبية شائعة جداً التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- ارتفاع نسب إنزيمات الكبد (أمينو ترانسفيراز)
- ارتفاع الكولسترول
- ارتفاع إنزيم الأميلاز الخاص بالبنكرياس (إنزيم هضمي)

أعراض جانبية شائعة

هذه من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص:

- فقدان الشهية للطعام
- طفح
- حكة
- تقيؤ
- ألم في البطن (آلام في أعلى البطن) أو إنزعاج
- زيادة في الوزن
- غازات (نفخة)
- الميل للنوم
- اضطرابات في النوم
- أحلام شاذة
- قلة حيوية (إرهاق)
- إكتئاب (الشعور بحزن عميق وقلة تقدير الذات)
- مزاج إكتنابي
- قلق
- جفاف الفم

أعراض جانبية شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- ارتفاع نسبة الإنزيمات التي تنتجها العضلات (كرياتين فوسفوكيناز)
- انخفاض تعداد الصفائح الدموية، خلايا الدم التي تساهم في مسيرة تخثر الدم
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء
- انخفاض الهيمو غلوبين
- ارتفاع الشحوم الثلاثية (نوع من الشحوم)
- ارتفاع إنزيم الليپاز (إنزيم يشترك في تفكيك الشحوم)
- ارتفاع البيليروبين في الدم (فحص الأداء الوظيفي للكبد)

أعراض جانبية غير شائعة

هذه من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص:

- رد فعل تحسسي (فرط حساسية) (أنظر "ردود فعل تحسسية" فيما سبق في هذه الفقرة)

- التهاب الكبد (hepatitis)
- أفكار وتصرفات إنتحارية (خاصة لدى المتعالجين الذين كان لديهم في السابق إكتئاب أو مشاكل في الصحة النفسية)
- نوبة هلع
- ألم في المفاصل
- ألم في العضلات

أعراض جانبية نادرة

- هذه من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص:
- فشل كبدي (العلامات يمكن أن تشمل: إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين أو بول داكن اللون عن المعتاد)
 - إنتحار (خاصة لدى متعالجين عانوا من إكتئاب أو من مشاكل نفسية في الماضي)
 - ← **إحك للطبيب فوراً** إذا قاسيت من أية مشاكل نفسية (أنظر أيضاً مشاكل نفسية أخرى أعلاه).

أعراض جانبية شيوها غير معروف

- ليس بالإمكان تقدير الشيوها من المعطيات المتوفرة:
- علامات وأعراض لإلتهاب أو تلوث، مثلاً: سخونة، قشعريرة، تعرق (*immune reactivation syndrome*)
 - حالة لا يتم فيها إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل سليم (فقر الدم الحديدي الأرومات).

أعراض جانبية محتملة أخرى

قد تتطور لدى الأشخاص الذين يتناولون علاجاً مشتركاً لـ HIV أعراضاً جانبية أخرى.

أعراض لتلوث وإلتهاب

الأشخاص الذين يعانون من تلوث HIV متقدم (إيدز) هم ذوي جهاز مناعي ضعيف، ولديهم ميل أكثر لتطوير تلوثات خطيرة (تلوثات إنتهازية). أعراض الإلتهاب قد تتطور نتيجة تلوثات قديمة "مستترة" التي تظهر من جديد عندما يبدأ الجسم بمحاربتها. الأعراض تشمل عادة سخونة، بالإضافة لبعض مما يلي:

- صداع
- ألم في البطن
- صعوبات في التنفس
- في حالات نادرة، عندما يقوى جهاز المناعة، فيمكنه أن يهاجم أيضاً نسيج سليم في الجسم (إضطرابات مناعية ذاتية). أعراض الإضطرابات المناعية الذاتية قد تتطور بعد أشهر كثيرة من بدء تناولك دواء لمعالجة تلوث HIV لديك. الأعراض يمكن أن تشمل:
- نبضات قلب (نبض قلب سريع أو غير منتظم) أو رجفان
- فرط حيوية (قلة راحة وحركة مبالغ فيها)
- ضعف يبدأ من اليدين وراحتي القدمين ويتقدم إلى الأعلى باتجاه مركز الجسم
- إذا تطورت لديك أية أعراض لتلوث أو إذا كنت تلاحظ حدوث أي واحد من الأعراض السابقة:
- ← **توجه حالاً إلى الطبيب.** لا تتناول أدوية أخرى ضد التلوث بدون إستشارة الطبيب.

آلام في المفاصل، تصلب ومشاكل في العظام

تتطور لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون علاجاً مشتركاً لـ HIV حالة تُسمى نخر العظم (*osteonecrosis*). في هذه الحالة، تموت بعض أجزاء النسيج العظمي جراء تناقص تزويد الدم للعظم. قد يكون لدى الأشخاص إحتمال أكبر لتطوير هذه الحالة:

- إذا كانوا يتناولون علاجاً مشتركاً لفترة طويلة من الزمن
- إذا كانوا يتناولون أيضاً أدوية مضادة للإلتهاب المسماة كورتيكوستيروئيدات
- إذا كانوا يشربون الكحول
- إذا كان جهازهم المناعي ضعيف جداً
- إذا كانوا ذوي وزن زائد
- **علامات نخر العظم تشمل:**

- تصلب المفاصل
- آوجاع وآلام في المفاصل (خاصة في الفخذ، في الركبة أو في الكتف)

- صعوبة في الحركة
- في حال ملاحظتك لإحدى تلك الأعراض:
- ← **بلغ الطبيب.**

التأثيرات على الوزن، الشحوم في الدم والجلوكوز في الدم

- خلال العلاج بـ HIV من الجائز حدوث زيادة في الوزن وفي نسب الشحوم والجلوكوز في الدم. ترتبط هذه الأعراض جزئياً بإستعادة الوضع الصحي ونمط الحياة، وأحياناً هنالك علاقة للأدوية ذاتها لعلاج الـ HIV. سيفحص الطبيب هذه التغيرات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب حفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة. يجب حفظ القنينة محكمة الإغلاق. لا يجوز إخراج ماص الرطوبة.
- يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو للقمامة المنزلية، إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:
أنظر أيضاً الفقرة 2 في النشرة - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
mannitol, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, silicified microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (type A), povidone K29/32, sodium stearyl fumarate, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, povidone K30, macrogol/PEG, talc, magnesium stearate, croscarmellose sodium, polysorbate 20, yellow iron oxide, red iron oxide.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أقراص جولوكا المطلية هي زهرية، بيضوية، محدبة الجانبين ومطبوع عليها "SV J3T" من جانب واحد.
الأقراص المطلية متوفرة ضمن قنينة مغلقة بغطاء صعب الفتح من قبل الأطفال.
تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل والتدوير لليساار (عكس عقارب الساعة) بنفس الوقت.
تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنينة جيداً بالغطاء، والتدوير بإتجاه اليمين (بإتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.
تحتوي كل قنينة على 30 قرصاً مطلياً وماص للرطوبة لتقليل الرطوبة. يجب حفظ ماص الرطوبة بداخل القنينة بعد فتحها، لا يجوز إخراجها.
- صاحب الإمتياز: جلاكسوسميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: ViiV هيلتكير UK م.ض.، لندن، إنجلترا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 161-69-35445-00
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في كانون الثاني 2026.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات ViiV Healthcare.
© 2026 مجموعة شركات ViiV Healthcare أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Jul tab PT v12