

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

לוטן 12.5, 50, 100

טבליות

הרכב:

Losartan potassium 12.5 mg	לוסרטן פוטסיום 12.5 מ"ג	כל טבליה של לוטן 12.5 מכילה:
Losartan potassium 50 mg	לוסרטן פוטסיום 50 מ"ג	כל טבליה של לוטן 50 מכילה:
Losartan potassium 100 mg	לוסרטן פוטסיום 100 מ"ג	כל טבליה של לוטן 100 מכילה:

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגנים בתכשיר אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2.7 סעיף "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של לוטן".

### קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על לוטן. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח שלך.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשלך.

### 1. למה מיועדת התרופה?

לוטן 12.5 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג מותווים לטיפול באי ספיקת לב. לוטן 50 ולוטן 100 מותווים גם לטיפול ביתר לחץ דם (לחץ דם גבוה) וסיוע בהורדת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים, כגון שבץ, בחולים עם לחץ-דם גבוה ועיבוי החדר השמאלי (החדר העיקרי) של הלב. לוטן 50 ולוטן 100 גם מספקים הגנה כלייתית על ידי דחיית ההחמרה של מחלת הכליה בחולי סוכרת מסוג 2 המלווה בהפרשת חלבון בשתן (פרוטאינוריה).

קבוצה תרפויטית: לוטן הינו חוסם הרצפטור אנגיוטנסין II.

### 2. לפני השימוש בתרופה

#### 2.1 אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) ללוסרטן או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- הנך בהיריון יותר מ-3 חודשים (עדיף גם להימנע מלוטן בתחילת ההיריון -ראי סעיף 2.5 "הריון הנקה ופוריות").
- יש לך ליקוי חמור בתפקוד הכבד.
- יש לך סוכרת או ליקוי בתפקוד הכלייתי והנך מטופל בתרופה להורדת לחץ דם המכילה אליסקירן

#### 2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה

שוחח עם הרופא שלך, רוקח או אחות בטרם תיטול את התרופה. חובה עלייך לספר לרופא שלך אם את חושבת שאת בהריון (או עשויה להיכנס להריון). לוטן אינו מומלץ בתחילת ההיריון ואין ליטול אותו אם הנך בהריון יותר מ-3 חודשים, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק חמור לתינוק שלך אם הוא ניטל בשלב זה (ראי סעיף 2.5 "הריון, הנקה ופוריות").

#### לפני הטיפול בלוטן חשוב לספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של אנגיודדמה (התנפחות של הפנים, השפתיים, הגרון ו/או הלשון) (ראה גם סעיף 4, "תופעות לוואי").
- הנך סובל מריבוי הקאות או שלשולים המובילים לאיבוד קיצוני של נוזלים ו/או מלחים מהגוף שלך.
- אתה מקבל משתנים (תרופות המגדילות את כמות המים שאתה מפריש באמצעות הכליות שלך) או נמצא תחת הגבלת מלח בתזונה המובילה לאיבוד קיצוני של נוזלים ומלחים מהגוף שלך (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?").
- ידוע שיש לך היצרות או חסימה בכלי הדם המובילים לכליות שלך או אם עברת השתלת כליה לאחרונה.
- תפקוד הכבד שלך לקוי (ראה סעיפים 2.1 "אין להשתמש בתרופה אם" ו-3 "כיצד תשתמש בתרופה?").
- הנך סובל מאי-ספיקת לב, עם או ללא פגיעה כלייתית, או בשילוב עם הפרעות קצב לבביות חמורות ומסכנות חיים. יש להיזהר במיוחד כאשר אתה מטופל במקביל עם חוסם בטא ( $\beta$ -blocker).
- יש לך בעיות עם מסתמי הלב או שריר הלב.
- אתה סובל ממחלת לב כלילית (הנגרמת על ידי זרימת דם מופחתת בכלי הדם של הלב) או ממחלה צרברו-וסקולרית (הנגרמת על ידי זרימת דם מופחתת במוח).
- אתה סובל מהיפראלדוסטרוניזם ראשוני (תסמונת הקשורה לעלייה בהפרשת ההורמון אלדוסטרון על ידי בלוטת האדרנל, הנגרמת עקב ליקוי בבלוטה).
- הנך נוטל כל אחת מהתרופות הבאות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה: - מעכב ACE (לדוגמא: אנלפריל, ליזינופריל, רמיפריל), במיוחד אם יש לך בעיות בכליות הקשורות לסוכרת. - אליסקירן

הרופא שלך עשוי לבדוק את תפקוד הכליות שלך, לחץ הדם וכמות האלקטרוליטים (לדוגמה אשלגן) בדם שלך במרווחי זמן קבועים. ראה גם מידע בסעיף 2.1 "אין להשתמש בתרופה אם".

- הנך נוטל תרופות אחרות העלולות להעלות את רמות האשלגן בסרום (ראה גם מידע בסעיף 2.3 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

ספר לרופא שלך אם אתה חווה כאבי בטן, בחילות, הקאות או שלשולים לאחר נטילת **לוטן**. הרופא שלך יחליט על המשך הטיפול. אל תפסיק את נטילת **לוטן** על דעת עצמך.

### 2.3 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

ספר לרופא שלך אם הנך נוטל תוספי אשלגן, תחליפי מלח המכילים אשלגן, תרופות אוצרות אשלגן כגון משתנים מסוימים (אמילוריד, טריאמטרן, ספירונולקטון) או תרופות אחרות העלולות להעלות את רמות האשלגן בסרום (לדוגמה, הפריין, תרופות המכילות טרימתופרים), אשר שילובן עם **לוטן** אינו מומלץ.

היזהר במיוחד אם הנך נוטל את התרופות הבאות בזמן הטיפול ב**לוטן**:

- תרופות אחרות להורדת לחץ דם, מכיוון שהן עשויות להוריד עוד יותר את לחץ הדם שלך. לחץ דם עלול לרדת גם כתוצאה מנטילת אחת מהתרופות/קבוצת תרופות הבאות: נוגדי דיכאון מסוג טריציקליים, תרופות אנטיפסיכוטיות, באקלופן, אמפוסטין.
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות - כגון אינדומטאצין, כולל מעכבי cox-2 (תרופות המפחיתות דלקת ושניתן להשתמש בהן על מנת לסייע בהקלת כאב), מכיוון שהן עשויות להפחית את ההשפעה מורידת לחץ-הדם של לוסרטן.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה ו/או לנקוט אמצעי זהירות אחרים:  
אם הנך נוטל מעב ACE או אליסקירן (ראה גם מידע בסעיף 2.1 "אין להשתמש בתרופה אם" ובסעיף 2.2 "אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה").

אם יש לך ליקוי בתפקוד הכליות, שימוש בו זמני בתרופות אלה עלול להוביל להרעה בתפקוד הכליתי.

אין ליטול לוסרטן בשילוב עם תרופות המכילות ליתיום ללא השגחה צמודה של הרופא שלך. אמצעי זהירות מיוחדים (לדוגמה, ביצוע בדיקות דם) עשויים להיות מתאימים.

### 2.4 שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול **לוטן** עם או בלי אוכל.

יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות בזמן נטילת **לוטן**.

### 2.5 הריון, הנקה ופוריות

#### הריון

חובה עלייך לספר לרופא שלך אם את חושבת שאת בהריון (או עשויה להיכנס להריון). הרופא שלך ימליץ לך בדרך כלל להפסיק ליטול **לוטן** לפני כניסתך להריון או ברגע שנודע לך כי הנך בהריון וימליץ לך ליטול תרופה אחרת במקום **לוטן**. **לוטן** אינו מומלץ בתחילת ההיריון ואין ליטול אותו אם הנך בהריון יותר מ-3 חודשים, מכיוון שהוא עלול לגרום נזק חמור לתינוק שלך אם הוא ניטל לאחר החודש השלישי להריון.

#### הנקה

ספרי לרופא שלך אם הנך מניקה או עומדת להתחיל להניק. **לוטן** אינו מומלץ לאימהות מניקות, והרופא שלך עשוי לבחור עבורך טיפול אחר אם את מעוניינת להניק. במיוחד אם התינוק שלך נולד זה עתה, או נולד לפני הזמן.

יש להימנע משימוש ברופא שלך או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

### 2.6 נהיגה ושימוש במכונית

לא נעשו מחקרים בנוגע להשפעות על היכולת לנהוג או לתפעל מכונית.

לא סביר כי **לוטן** ישפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכונית. למרות זאת, כמו עם תרופות רבות אחרות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה, לוסרטן עלול לגרום לסחרחורת או נמנום באנשים מסוימים. אם אתה חווה סחרחורת או נמנום, עליך להתייעץ עם הרופא שלך לפני שאתה מנסה לבצע פעילויות כאלה.

### 2.7 מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של לוטן

**טבליות לוטן מכילות לקטוז** (לתכולת לקטוז, ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.  
**טבליות לוטן מכילות אשלגן** (לתכולת אשלגן, ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול במכשיר.

הרופא שלך ייקבע את המינון המתאים של **לוטן** ומשך הטיפול, בהתחשב במצבך ואם אתה נוטל תרופות אחרות. חשוב להמשיך ליטול **לוטן** כל עוד הרופא שלך רושם לך אותו, על מנת לשמר את השליטה בלחץ הדם שלך.

#### חולים מבוגרים עם לחץ דם גבוה

הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 50 מ"ג של לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 50**) פעם ביום. ההשפעה המרבית של הורדת לחץ הדם אמורה להיות מושגת 3-6 שבועות לאחר תחילת הטיפול. בחולים מסוימים לעיתים יהיה צורך להעלות את מינון התרופה לאחר מכן ל-100 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 100**), פעם ביום.

אם הנך מתרשם כי ההשפעה של לוסרטן הינה חזקה או חלשה מדי, אנא דבר עם הרופא שלך או הרוקח.

חולים מבוגרים עם לחץ דם גבוה, סוכרת מסוג 2 וחלבון בשתן

הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 50 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 50**) פעם ביום. בחולים מסוימים לעיתים יהיה צורך להעלות את מינון התרופה ל-100 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 100**), פעם ביום, בהתאם להשפעת התרופה על לחץ הדם.

ניתן ליטול לוסרטן יחד עם תרופות אחרות להורדת לחץ הדם (למשל משתנים, חוסמי תעלות סידן, חוסמי-אלפא או חוסמי-בטא ותכשירים בעלי פעילות מרכזית) וכן, גם עם אינסולין ותרופות אחרות המשמשות באופן נפוץ להורדת רמת הגלוקוז בדם (למשל, סולפונילאוריאה, גליטזון ומעכבי גלוקוזידאז).

חולים מבוגרים עם אי-ספיקת לב

הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 12.5 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 12.5**) פעם ביום. בדרך כלל, יש להעלות את המנה כל שבוע, צעד אחר צעד (כלומר 12.5 מ"ג ליום במהלך השבוע הראשון, 25 מ"ג ליום במהלך השבוע השני, 50 מ"ג ליום במהלך השבוע השלישי, 100 מ"ג ליום במהלך השבוע הרביעי, 150 מ"ג ליום במהלך השבוע החמישי) עד למנת האחזקה כפי שנקבעה על ידי הרופא שלך. המנה המקסימלית היא 150 מ"ג (שלוש טבלייות של **לוטן 50** מ"ג), פעם ביום.

בטיפול באי ספיקת לב, לוסרטן ניתן לרוב בשילוב עם משתן (תרופה אשר מעלה את כמות המים שהנך מפריש באמצעות הכליות שלך) ו/או דיגיטליס (תרופה המסייעת לחיזוק וייעול פעילות הלב) ו/או חוסם-בטא.

**מינון בקבוצות חולים מיוחדות**

הרופא עשוי להמליץ על מינון נמוך יותר, במיוחד כשמתחילים טיפול בחולים מסוימים, כגון אלו המטופלים עם משתנים במינונים גבוהים, בחולים עם ליקוי בכבד או בחולים מעל גיל 75 שנים. אין להשתמש בלוסרטן בחולים עם ליקוי חמור בכבד (ראה סעיף 2.1 "אין להשתמש בתרופה אם").

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן המתן**

יש לבלוע את הטבלייות בשלמותן עם כוס מים. עליך לנסות ליטול את המנה היומית שלך בערך באותו זמן כל יום. חשוב להמשיך ליטול **לוטן** עד שהרופא שלך יאמר לך אחרת.  
**לוטן 12.5:** אין לחצות את הטבלייה.  
**לוטן 50, לוטן 100:** במידת הצורך ניתן לחצות את הטבלייה לשימוש מידי.  
אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבלייה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

תסמינים של מינון יתר הם: לחץ דם נמוך, דופק מוגבר, תיתכן ירידה בדופק.  
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת את המנה היומית, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.  
חשוב להמשיך ליטול **לוטן** כל עוד הרופא שלך רושם לך אותו על מנת לשמר את השליטה בלחץ-הדם שלך.

**אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח שלך.**

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ב**לוטן** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא או לחדר המיון הקרוב אם הופיעה:**

תגובה אלרגית חמורה (פריחה, גירוד, התנפחות של הפנים, השפתיים הפה או הגרון אשר עלולים לגרום לקושי בבליעה או בנשימה). זוהי תופעת לוואי חמורה אך נדירה אשר מופיעה בשכיחות של 1-10 מטופלים מתוך 10,000. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף או לאשפוז.

**תופעות הלוואי הבאות דווחו עם לוטן:**

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:**

- סחרחורת;
- לחץ דם נמוך (במיוחד לאחר אובדן מוגבר של מים מהגוף מתוך כלי הדם, לדוגמה בחולים עם אי ספיקת לב קשה או תחת טיפול במינונים גבוהים של משתנים);
- תופעות של תת-לחץ דם תנחתית התלויות במינון כגון, ירידת לחץ דם המופיעה כשקמים ממצב של שיכבה או ישיבה;
- תשישות;
- עייפות;
- סוכר נמוך מידי בדם (היפוגליקמיה);
- אשלגן גבוה מדי בדם (היפרקלמיה);
- שינויים בתפקוד הכליה, כולל אי ספיקת כליות;

- ירידה במספר תאי דם אדומים (אנמיה);
- עליה באוריאיה בדם, בקריאטינין בסרום ובאשלגן בסרום בחולים עם אי-ספיקת לב.

#### תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:

- ישנוניות;
- כאב ראש;
- הפרעות בשינה;
- הרגשה של קצב לב מוגבר (פלפיטציות);
- כאב חמור בחזה (אנגינה פקטוריס);
- קוצר נשימה (דיספניאה);
- כאב בטן;
- עצירות קשה;
- שלשול;
- בחילה;
- הקאה; סרפדת (אורטיקריה);
- גרד (פרוריטוס);
- פריחה;
- נפיחות מקומית (בצקת);
- שיעול.

#### תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

- רגישות יתר;
- אנגיואדמה;
- אנגיואדמה במעיים: נפיחות במעיים המלווה בתסמינים כמו כאבי בטן, בחילות, הקאות ושלשולים;
- דלקת של כלי הדם (וסקוליטיס, כולל Henoch-Schönlein purpura);
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ (פאראסטזיה);
- התעלפות (סינקופה);
- דופק מהיר מאוד ולא סדיר (פרפור עליות);
- שבץ;
- דלקת של הכבד (הפטיטיס);
- עלייה ברמות בדם של אלאנין אמינוטראנספראז (ALT), שעוברת בדרך כלל עם הפסקת הטיפול.

#### תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- ירידה במספר הטרומבוציטים;
- מיגרנה;
- ליקויים בתפקודי כבד;
- כאבי שרירים ומפרקים;
- תסמינים דמויי שפעת;
- כאבי גב ודלקת בדרכי השתן;
- עלייה ברגישות לשמש (פוטוסנסיטיביטי);
- כאבי שרירים בלתי מוסברים עם שתן כהה (בצבע תה) (רבדומיליזיס);
- אין-אונות;
- דלקת הלב (פנקראטיטיס);
- רמות נמוכות של נתרן בדם (היפונתרמיה);
- דיכאון;
- הרגשה כללית לא טובה;
- צלצולים, זמזמים, שאגות או נקישות באוזניים (טיניטוס);
- הפרעה בטעם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/> בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

#### 5. כיצד לאחסן את התכשיר?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בלוטן לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצוין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצוין.

- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. היוועץ ברוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בהן עוד צורך. נקיטה באמצעים אלו תסייע בשמירה על איכות הסביבה.

## 6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose anhydrous; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol).

**לוטן 12.5** מכיל אשלגן בכמות הבאה: 1.06 מ"ג (0.027 מילי-אקוויוולנט).

**לוטן 50** מכיל אשלגן בכמות הבאה: 4.24 מ"ג (0.108 מילי-אקוויוולנט).

**לוטן 100** מכיל אשלגן בכמות הבאה: 8.48 מ"ג (0.216 מילי-אקוויוולנט).

**לוטן 12.5** מכיל לקטוז בכמות הבאה: 25.1 מ"ג.

**לוטן 50** מכיל לקטוז בכמות הבאה: 100.4 מ"ג.

**לוטן 100** מכיל לקטוז בכמות הבאה: 200.8 מ"ג.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**לוטן** ארוז בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה יש 5,7,10,14,15,20,28 או 30 טבליות. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

טבליות של **לוטן 12.5** הינן מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע לבן.

טבליות של **לוטן 50** הינן מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן עם קו חצייה מצדן האחד, בצבע לבן.

טבליות של **לוטן 100** הינן מצופות, אובליות, קמורות משני צידיהן עם קו חצייה מצדן האחד, בצבע לבן.

**שם בעל הרישום וכתובתו:** אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, ת"א, 6116401.

**שם היצרן וכתובתו:** אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

**לוטן 12.5:** 137 93 31629 01

**לוטן 50:** 137 94 31630 01

**לוטן 100:** 139 36 31707 01

נערך בפברואר 2026 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוני מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:  
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the following code:

LOTAN 100 לוטן



LOTAN 50 לוטן



LOTAN 12.5 לוטן



ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: [info@unipharm.co.il](mailto:info@unipharm.co.il) או בטלפון מספר: 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: [info@unipharm.co.il](mailto:info@unipharm.co.il) or by telephone: 03-6135050.