

עלון לזכרון לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פוליסקין תמיסה

החומר הפעיל וריכוזו:

פובידון יודין w/v 10% (השווה ל-1% יודין (Iodine))

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בטעיני המיון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לעזרה ראשונה בפצעים, שרשיות וכוויות קלות. לחיטוי פצעים וכוויות קלות לטיפול בזיהומי עור.

2. קבוצה תרופית: חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

3. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוד.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתכשיר.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להימנע משימוש על אזורים נרחבים של העור.

לפני הטיפול בפוליסקין תמיסה:

- יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול בפצעים עמוקים.
- אין להשתמש מבלי היועץ ברוקח לפני החלת הטיפול אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם הנך לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון או מיניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

שים לב: לא לבלוע! תכשיר זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש בתכשיר – הוראות כלליות:

- ניתן לטפטף תמיסת פוליסקין ישירות על העור והפצע ולהשאירה להתייבש על העור (תיווצר שכבה מגינה). ניתן גם לטבול גזה בחומר, לשים על הפצע ולכסות בתחבושת.
- בעזרה ראשונה: לטיפול בפצעה – שים תמיסת פוליסקין 2-4 פעמים ביום עד שהפצע יתפא. לזיהומי עור יש למרוח תמיסת פוליסקין כנ"ל עד לריפוי מלא או בהתאם להוראות הרופא.
- אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע ימים יש לפנות לרוקח.
- כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנקות על-ידי שטיפה במים.

אין לבלוע על המנה המומלצת.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את ארזית התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה

בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים

אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברוקח או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפוליסקין תמיסה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: פריחה, גירוי או נפיחות מתמשכים.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. אין לאחסן את התרופה!

- מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לרישג ידם וישו ראיתם של ילדים /או חיות ונקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- ניתן להשתמש בפוליסקין תמיסה לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה עד תאריך התפוגה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:

סוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם: Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid, Purified Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

נוזל צלול בצבע חום כהה. תכולת האריזה: 20 מ"ל.

יצרן ובעל רישום: בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 17400-2017.

נערך ב-2026-01 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות

הממלכתי במשרד הבריאות: 134-07-31367-00

למשל הפסוטה ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.