

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשפ"א 1986

אציקלוויו 200 מ"ג טבליות

אציקלוויו 200 מ"ג טבליות
אציקלוויר (acyclovir 200 mg).
אציקלוויו 400 מ"ג טבליות
אציקלוויר (acyclovir 400 mg).
לרשימת החומרים הלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אציקלוויו מכילה תרופה הנקראת אציקלוויר. היא פועלת על ידי קטיילה או עצירת הגדילה של אציקלוויו ויכולה לשמש ל:
• טיפול באבעבועות רוח ובשלבקת חוגרת.
• טיפול בפצעי קור, בהרפס של איברי המין ובזיהומים אחרים של הרפס סימפלקס.
• מניעת חזרה של זיהומי הרפס סימפלקס בחולים עם מערכת חיסונית תקינה.
• מניעת זיהומי הרפס סימפלקס באנשים שהמערכת החיסונית שלהם מתפקדת פחות טוב, כלומר הגוף שלהם פחות מסוגל להילחם בזיהומים.
קבוצה רפואית: אנטי ויראליים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאציקלוויר או לואלאציקלוויר או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- אל תיקח אציקלוויו אם זה חל עליך. אם אינך בטוח, פנה לרוקח או לרופא שלך לפני נטילת אציקלוויו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באציקלוויו, ספר לרוקח את הרופא אם:
• חוותי תגובות עור חמורות בעקבות שימוש באציקלוויו או בואלאציקלוויר.
• יש לך בעיות כליה.
• אתה מעל גיל 65 שנים.
• אם אינך בטוח אם אלה חלים עליך, דבר עם הרוקח או הרופא שלך לפני נטילת אציקלוויו.
חשוב שתשתה הרבה מים בזמן נטילת אציקלוויו.

מצבים שעליך לשים אליהם לב
אציקלוויו עלולה לגרום לתגובות עור חמורות. עליך לשים לב לסמנים מסוימים במהלך הטיפול באציקלוויו, כדי להפחית את הסיכון לסיבוכים. אם אתה חווה סימנים אלה, השתמש בתרופה עור חמורות, הפסק להשתמש באציקלוויו ופנה לרופא באופן מיידי (ראה פרק "תופעות לוואי").

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:
אם אתה לוקח, או ייתן לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במויחד אם אתה לוקח:
• פרובנצייד, משמשת לטיפול בגידונו.
• סימטידין, משמשת לטיפול בכיבי קיבה.
• מיקופנולטאט מופטיל, משמשת למנוע מגופר לדחות איברים מושלמים.

הריון, הנקה ופוריות:
אם הניך בהריון או מניקה, חושבת שאת להריון או מתכננת להרות, התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.
נהיגה ושימוש במכוונות:
תופעות לוואי מסוימות כמו תחושת נמנום או שינויות לעולות פגעו באיכות שלך להתרכז ולהגיב. עליך לוודא שאינך מופעט מתנועת אלה לפני שאתה נוהג, מפעיל מכוונות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
התרופה מכילה פחות מ-2 מ"ג נתרן בטבליה ולהגיב. עליך לוודא שאינך מופעט מתנועת אלה לפני שאתה נוהג, מפעיל מכוונות ובכל פעילות המחייבת ערנות.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
התרופה מכילה פחות מ-2 מ"ג נתרן בטבליה ולהגיב. עליך לוודא שאינך מופעט מתנועת אלה לפני שאתה נוהג, מפעיל מכוונות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
יש להשתמש בתכשיר תמיד כפי שהתאם להוראות הרופא. עליך לבלוע עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הנחיה שאתה צריך לקחת תהיה תלויה בסיבה שלשמה אציקלוויו ניתנת לך. הרופא שלך ישוחח איתך על זה.

יתכן שהרופא שלך יתאים עבורך את מינון האציקלוויו אם:
• היא מיועדת לילד.
• אתה מעל גיל 65 שנים.
• יש לך בעיות כליה. אם יש לך בעיות כליה, חשוב שתשתה הרבה מים בזמן שאתה מטופל באציקלוויו.

דבר עם הרופא שלך לפני נטילת אציקלוויו אם אחד מעלה חל עליך.
אין לעבור על הנחיה המומלצת.
צורת הכנתה
יש לקחת תרופה זו דרך הפה.
בלע את התרופה בשלמותה עם מעט מים.
עליך לוודא שאתה שותה הרבה נוזלים כמו מים במשך הטיפול באציקלוויו.

יש להתחיל לקחת אציקלוויו בהקדם האפשרי. **כתשח/חצייה/לעיסה:**
• אין ללעוס. הטבליה מיועדת לבלעיה.
• אסור להצות על מנת לטול מה מופחתת כיוון שהמינון אינו שווה בכל חצי טבליה. במידת הצורך, ניתן להצות או לכתוש את הטבליה על מנת להקל על הבלעיה ויש לבלוע מיד את כל החלקים עם מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אציקלוויו אינה מזיקה בדרך כלל, אלא אם לקחת יותר מדי במשך מספר ימים. פנה לרופא או לרוקח אם לקחת יותר מדי אציקלוויו. הבא את אריזת התרופה איתך.
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול ברגע שאתה זוכר. אולם, אם זכרכת קרוב למועד לקחת תרופה המהנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה.
אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. אין להפסיק את הטיפול בטרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין לקחת תרופות בחושיך! בודק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש באציקלוויו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל אחת מהן.
מצבים שעליך לשים אליהם לב
תגובות אלרגיות (עשויות להופיע בעד 1 מכל 1,000 אנשים)
אם יש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת אציקלוויו ופנה מיד לרופא. הסימנים עשויים לכלול:
• פריחה, גרד או חרלת (גבשושיות מגרדות) על העור שלך.
• נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים של הגוף שלך.
• קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה.
• התמוטטות.

תגובות עור חמורות: תגובות אלו נדירות מאוד (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 אנשים הנוטלים אציקלוויו). הסימנים כוללים:
• פריחה אדומה או קשקשית נרחבת עם שלפוחיות (העלולות להכיל מגולה), גבשושיות מתחת לעור או קילוף של עור. חסימים דמויי שפעת המלווים בפריחה, בחום, בבלוטות מגודלות ובתוצאות חריגות בבדיקת דם.

4. פנה לרופא מיד אם מופיעים תסמינים אלה. הפסק ליטול אציקלוויו.
תופעות לוואי נוספות כוללות:
תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-100 משתמשים מתוך 100
• כאב ראש.
• תחושת סחרחורת.
• בחילה או הקאה.
• שלשול.
• כאבי בטן.
• פריחה.
• תגובה עורית לאחר חשיפה לאור (רגישות יתר לאור).
• גרד.
• תחושת עייפות.
• חום (טמפרטורה גבוהה) לא מוסבר ותחושת עלפון, במיוחד כאשר נעזמים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000
• פריחה מגרדת דמוית חרלת.
• נשירת שיער.
תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000
• השפעות על בדיקות דם ושתי מסוימות.
• עלייה באנזימים הפועלים בכבד.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות בכחות ממשמש 1 מתוך 10,000
• ירידה במספר תאי הדם האדומים (אנמיה).
• ירידה במספר תאי הדם הלבנים (ליקופניה).
• ירידה במספר טסיות הדם (תאים העוזרים לדם להקשר) (טרומבוציטופניה).
• תחושת חולשה.
• תחושת אי שקט או בלבול.
• רעידות.
• הזיות (ראיה או שמיעה של דברים שאינם קיימים).
• פרכוסים.
• תחושת נמנום או שינויות רגילה.
• חוסר יציבות בעת הליכה וחוסר קואורדינציה.
• קושי בדיבור.
• חוסר יכולת לחשוב או לשפוט בבהירות.
• אובדן הכרה (תרדמת).
• שיתוק של חלק או של כל גופך.
• פגיעות בהתנהגות, בדיבור ובתנועות העין.
• קושי בצוואר ורגישות לאור.
• דלקת בכבד (הפטטיס).
• הצהבה של עורך והחלק הלבן של עיניך (צהבת).
• בעיות כליה בהן אתה נותן מעט שתן או בכלל לא.
• כאבים בגבך התחתון, באזור הגב שבו ממוקמת הכליה שלך או מעל אגן הירכים שלך (כאב כלייתי).

• תגובות עור חמורות, כגון: פריחה אדומה או קשקשית נרחבת עם שלפוחיות (שלוליות להכיל מגולה). גבשושיות מתחת לעור או קילוף של עור. חסימים דמויי שפעת המלווים בפריחה, בחום, בבלוטות מגודלות ובתוצאות חריגות בבדיקות דם. (ראה "מצבים שעליך לשים אליהם לב").

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י ניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראיינים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה הממוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
אציקלוויו 200:
Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

אציקלוויו 400:
Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Povidone, Magnesium Stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אציקלוויו 200: טבליות לבנות, קמורות משני הצדדים.
אציקלוויו 400: טבליות לבנות, קמורות משני הצדדים עם קו סימן (שיאנו משמש להציה). הטבליות מסופקות באריזת קרטון המכילה 2, 10, 20, 25, 30, 60, 70 או 100 טבליות באריזת בליסטר.
ניתן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
היצרן/בועל הרישום: כסט תעשיות כימיות בע"מ, ת.ד. 385, קרית מלאכי

עלון זה נערך בתאריך 02/2026 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אציקלוויו 200: 00-28104-62
אציקלוויו 400: 00-28105-63
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלבן שזר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.