

## إيميتريكس أقراص 50 ملغ

### أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

سوماتريبتان (على شكل سوكنينات) 50 ملغ

Sumatriptan (as succinate) 50 mg

## إيميتريكس أقراص 100 ملغ

### أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

سوماتريبتان (على شكل سوكنينات) 100 ملغ

Sumatriptan (as succinate) 100 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل إيميتريكس أقراص للتخفيف الحاد في نوبات الشقيقة، مع أو بدون هالة. يجب استعمال إيميتريكس أقراص فقط عندما يكون هنالك تشخيص واضح لوجود شقيقة. قد تحدث أعراض الشقيقة نتيجة توسع مؤقت للأوعية الدموية في الرأس. إيميتريكس أقراص يعتبر كخافض لتوسع تلك الأوعية الدموية. هذا الأمر بحد ذاته يساعد على تسكين الصداع وتخفيف الأعراض الأخرى لنوبة الشقيقة، مثل الغثيان أو التقيؤ والحساسية للضوء والصوت.

### الفصيلة العلاجية

مسكنات للألام: تريبتانات - من المقدرات الانتقائية لمستقبل 5-HT<sub>1</sub>.

### 2) قبل استعمال الدواء

#### لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (ألرجي) لسوماتريبتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- إذا وجدت لديك مشكلة في القلب مثل تضيق الشرايين (مرض قلبي إقفاري) أو آلام في الصدر (ذبحة صدرية)، أو إذا حدثت لديك نوبة قلبية.
- إذا وجدت لديك مشاكل في جريان الدم في رجلينك التي تسبب لك آلام تشبه التقلص أثناء المشي (مرض الأوعية الدموية المحيطية).

- إذا كان لديك حادث دماغي أو حادث دماغي عابر (يسمى أيضاً نوبة إقفارية عابرة أو TIA).
  - إذا كان لديك ضغط دم مرتفع. من الجائز أن يكون بوسعك استعمال إيميتركس أقراص إذا كان ارتفاع ضغط الدم لديك معتدلاً وقيده المعالجة.
  - إذا وجد لديك مرض كبدي حاد.
  - مع أدوية أخرى للشقيقة، بما في ذلك تلك التي تحوي إرغوتامين، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسير جيد ماليات (methysergide maleate)؛ أو أي تريبتان أو مقلد لـ 5-HT<sub>1</sub> (مثل ناراتريبتان أو زولميتريبتان).
  - مع أي من مضادات الإكتئاب التالية:
    - مثبطات مونوأمين أو أكسيداز (MAOIs) أو إذا تناولت MAOI في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كان واحد مما ذكر يخصك:
- ← بلغ طبيبك، ولا تستعمل إيميتركس أقراص.

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إيميتركس أقراص إحك للطبيب:

إذا وجدت لديك أية عوامل خطورة إضافية

- إذا كنت من المدخنين بكثرة، أو تستعمل علاج ببدائل النيكوتين، وخاصة
- إذا كنت رجلاً تجاوز عمر 40 سنة، أو
- إذا كنت امرأة بعد سن اليأس

في حالات نادرة جداً، تطور لدى الأشخاص مشاكل قلبية شديدة بعد استعمال إيميتركس أقراص، على الرغم من أنه لم تكن لديهم علامات لمرض قلبي قبل ذلك. إذا كانت إحدى البنود السابقة تخصك فمن الجائز أن تكون معرضاً لخطورة أكبر لتطوير مرض قلبي - لذلك:

← بلغ طبيبك ليتمكن من فحص وظيفة قلبك قبل أن يصف لك إيميتركس أقراص.

إذا وجدت لديك سابقة لحدوث نوبات (اختلاجات)

أو إذا كانت لديك حالات أخرى التي قد تزيد من احتمال حدوث نوبة لديك - مثلاً، إصابة في الرأس أو الإدمان على الكحول:

← بلغ طبيبك وذلك لكي تخضع لمراقبة حثيثة بشكل أكثر.

إذا كان لديك ضغط دم مرتفع فمن الجائز أن إيميتركس أقراص غير مناسب لك

← بلغ طبيبك أو الصيدلي عن ذلك قبل استعمال إيميتركس أقراص.

إذا كان لديك مرض في الكبد أو في الكلية

إذا كان واحد مما ذكر يخصك:

← بلغ طبيبك أو الصيدلي عن ذلك قبل استعمال إيميتركس أقراص.

إذا كان لديك عدم تحمل لسكريات معينة

← بلغ طبيبك وذلك لكي تخضع لمراقبة حثيثة بشكل أكثر.

إذا كنت حساساً لمضادات حيوية المسماة سولفوناميدات

إذا كنت كذلك، فمن الجائز أن تكون حساساً أيضاً لـ إيميتركس أقراص. إذا كنت تعلم بأن لديك حساسية لمضاد حيوي ولكنك غير واثق من أنه سولفوناميد:

← بلغ طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال إيميتركس أقراص.

إذا كنت تتناول أدوية مضادة للإكتئاب المسماة SSRIs (مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين الإنتقائية) أو SNRIs (مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين والنورأدرينالين) أو TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة) ← بلغ طبيبك أو الصيدلي عن ذلك قبل إستعمال إيميتركس أقراص. أنظر أيضاً "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية"، في السياق.

إذا كنت تستعمل إيميتركس أقراص في أوقات متقاربة إن تكرار إستعمال إيميتركس أقراص الزائد عن الحد قد يفاقم من الصداع لديك. ← بلغ طبيبك إذا كان هذا الأمر يخصك. من شأن طبيبك أن يوصيك بالتوقف عن إستعمال إيميتركس أقراص.

إذا كنت تشعر بألم أو بضغط في صدرك بعد إستعمالك لـ إيميتركس أقراص تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة. إذا لم تزول بسرعة، أو إذا تفاقمت: ← توجه حالاً لتلقي مساعدة طبية. تحوي الفقرة 4 (تظهر في السياق) معلومات إضافية عن تلك الأعراض الجانبية المحتملة.

#### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

هناك أدوية ممنوع تناولها مع إيميتركس أقراص، وأخرى قد تسبب أعراض جانبية إذا تم تناولها مع إيميتركس أقراص.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- إرغوتامين الذي يستعمل أيضاً لعلاج الشقيقة، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد (أنظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس أقراص بنفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس أقراص. لا تتناول ثانية أي دواء يحوي إرغوتامين أو مركبات مشابهة لإرغوتامين بعد 6 ساعات على الأقل من إستعمال إيميتركس أقراص.
- تريبتانات/مقلدات المستقبل 5-HT<sub>1</sub> أخرى (مثل ناراتريبتان، ريزاتريبتان، زولميتريبتان)، المستعملة أيضاً لعلاج الشقيقة (أنظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس أقراص بنفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس أقراص. لا تتناول ثانية تريبتان/مقلد للمستقبل 5-HT<sub>1</sub> إضافي بعد 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس أقراص.
- أدوية MAOIs المستعملة لعلاج الإكتئاب. إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين فلا تستعمل إيميتركس أقراص.
- أدوية SSRIs، و SNRIs - و TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة) المستعملة لعلاج الإكتئاب. إن إستعمال إيميتركس أقراص مع هذه الأدوية يمكن أن يسبب متلازمة السيروتونين (مجموعة أعراض التي يمكن أن تشمل قلة راحة، إرتباك، تعرق، هلوسات، زيادة المنعكسات، تقلصات عضلية، قشعريرة، زيادة النبض ورجفة). بلغ طبيبك حالاً في حال تأثرك على هذا النحو.
- هيبيريكوم بيرفوراتوم (St. John's Wort). إن تناول أدوية نباتية الحاوية على هيبيريكوم سوية مع إيميتركس أقراص قد يزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية.

#### الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل إستعمال الدواء. هناك معلومات محدودة فقط حول أمان إيميتركس أقراص لدى النساء الحوامل، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على حصول زيادة في الخطورة لحدوث عيوب خلقية. يناقشك طبيبك فيما إذا كنت بحاجة أو لست بحاجة لإستعمال إيميتركس أقراص عندما تكونين حاملاً.

- لا ترضعي رضيعك خلال 12 ساعة بعد استعمال إيميتركس أقراص. إذا كنت تقومين بسحب الحليب خلال هذه الفترة، أتلفي الحليب ولا تعطيه لرضيعك.
- تُبلغ بعض النساء المرضعات عن ألم في الثدي و/أو الحلمة بعد استعمال سوماتريبتان. عادةً ما يكون الألم مؤقتاً ويختفي خلال 3 إلى 12 ساعة.

### السياسة وإستعمال الماكنات

قد يسبب لك دوائك أو أعراض الشقيقة الميل إلى النوم. في حال تأثرتك، فلا تقم بقيادة السيارة أو تشغيل الماكنات.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

لكتوز: إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه لطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الصاديوم: يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) للقرص، لذا يمكن القول بأنه فعلياً "خال من الصوديوم".

## 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

### متى يجب تناول إيميتركس أقراص

- يفضل تناول إيميتركس أقراص لحظة شعورك ببدء الشقيقة، رغم أنه يمكنك تناوله في أي وقت خلال النوبة.
  - لا يجوز إستعمال إيميتركس أقراص لمحاولة منع النوبة - إستعمله فقط بعد بدء أعراض الشقيقة لديك.
- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

### الكبار بعمر 18 حتى 65 سنة

- المقدار الدوائي الإعتيادي لكبار بعمر 18 حتى 65 سنة هو قرص واحد من إيميتركس أقراص 50 ملغ، الذي يتم بلعه بأكمله مع الماء. من الجائز أن يحتاج بعض المتعالجين لمقدار دوائي قدره 100 ملغ - عليك التصرف حسب توصية طبيبك.

### الأطفال دون عمر 18 سنة

- إيميتركس أقراص غير مخصص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

### كبار السن (فوق عمر 65 سنة)

- إيميتركس أقراص غير مخصص للإستعمال لدى أشخاص فوق عمر 65 سنة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

### في حال تجدد الأعراض لديك

- يمكنك تناول قرص ثاني من إيميتركس أقراص إذا مرت على الأقل ساعتين من القرص الأول. لا تتناول أكثر من 300 ملغ إجمالياً خلال 24 ساعة.

### إذا لم يكن هناك تأثير للقرص الأول

- لا تتناول قرص ثاني أو أي مستحضر آخر من إيميتركس لنفس النوبة. لا زال بالإمكان إستعمال إيميتركس أقراص لنوبتك القادمة.

إذا لم يخفف إيميتركس أقراص عنك أبداً:  
← راجع طبيبك أو الصيدلي للإستشارة.

#### السحق/الشطر/المضغ

الأقراص مطلية لذا لا يجوز سحقها/شطرها/تقسيمها. يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الماء.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من إيميتركس أقراص

• لا تتناول أكثر من ستة أقراص ذات 50 ملغ أو ثلاثة أقراص ذات 100 ملغ (إجمالي 300 ملغ) خلال 24 ساعة.

إن تناول أكثر من اللازم من إيميتركس أقراص يمكن أن تسبب لك الإعياء. إذا تناولت أكثر من 300 ملغ خلال 24 ساعة:

← توجه إلى طبيبك للإستشارة.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيميتركس أقراص قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. بعض الأعراض قد تحدث نتيجة الشقيقة ذاتها.

رد فعل تحسسي: توجه حالاً إلى الطبيب لتلقي مساعدة طبية

لقد حدثت الأعراض الجانبية التالية ولكن شيوعتها الدقيق غير معروف.

• علامات الحساسية تشمل طفح، شرى (طفح حاك)؛ صفير؛ إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين؛ إنهيار تام للأجهزة.

إذا قاسيت من واحد من تلك الأعراض بعد وقت قصير من إستعمال إيميتركس أقراص:

← لا تستعمل الدواء ثانية. توجه حالاً إلى الطبيب.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين)

• ألم، ثقل، ضغط أو توتر في الصدر، في الحنجرة أو في أجزاء أخرى من الجسم، أو شعور غير عادي، يشمل خدر، وخز وإحساس بسخونة أو برودة. تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة.

إذا إستمرت أو تفاقمت تلك الأعراض (خاصة الألم في الصدر):

← توجه لتلقي مساعدة طبية عاجلة. يمكن أن تحدث تلك الأعراض لدى عدد قليل جداً من الأشخاص نتيجة نوبة قلبية.

أعراض جانبية شائعة أخرى تشمل:

• غثيان أو تقيؤ، رغم أن هذا الأمر قد يحدث جراء الشقيقة نفسها

- إرهاق أو نعاس
- دوام، الشعور بضعف أو هبات من الحر
- ارتفاع مؤقت بضغط الدم
- ضيق في التنفس
- آلام عضلية.

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل)  
• ألم في الثدي.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل)

- تغيرات في الأداء الوظيفي للكبد. إذا توجب عليك إجراء فحص دم لوظائف الكبد، بلغ الطبيب بأنك تتناول إيميتركس أفراس.

قد يقاسي بعض المتعالجين من الأعراض الجانبية التالية، لكن لا يُعرف ما هي وتيرة ظهورها:

- إختلاجات/نوبات، رجفان، تقلصات عضلية لوقت قصير/مؤقتة (التي قد تؤثر على حركة الفك)، تصلب مؤخره الرقبة
- اضطرابات في الرؤية مثل وميض، تدني الرؤية، إزدواجية الرؤية، فقدان الرؤية لا بل قد يحدث في حالات معينة خلل غير عكوس في الرؤية (رغم أن هذه قد تحدث بسبب نوبة الشقيقة نفسها)
- مشاكل قلبية، قد يصبح فيها نبضك أسرع، أبطأ أو يتغير النظم، آلام في الصدر (نبحة صدرية) أو نوبة قلبية
- جلد شاحب، بلون مائل للأزرق و/أو ألم في الأصابع، في أصابع القدم، في الأذنين، في الأنف أو في الفك لديك كرد فعل للبرودة أو للتوتر (ظاهرة رينو)
- الشعور بإغماء (قد ينخفض ضغط الدم)
- ألم في الجانب الأيسر السفلي من البطن وإسهال دموي (إلتهاب القولون الإفقاري)
- إسهال
- إذا حدثت لديك مؤخراً إصابة أو إذا وجد لديك إلتهاب (مثل الروماتيزم أو إلتهاب الأمعاء الغليظة) فقد تقاسي من ألم أو من تفاقم الألم في مكان الإصابة أو الإلتهاب
- ألم في المفاصل
- الشعور بقلق
- صعوبة في البلع
- تعرق مفرط.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

## 6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً -  
إيميتريكس أقراص 50 ملغ:

Lactose, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide red (E172).

إيميتريكس أقراص 100 ملغ:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171).

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
أقراص إيميتريكس 50 ملغ هي زهرية على شكل كبسولة. متوفرة ضمن علبة لويحة (بليستر) تحوي 2 أو 6 أقراص.  
أقراص إيميتريكس 100 ملغ هي بيضاء على شكل كبسولة. متوفرة ضمن علبة لويحة (بليستر) تحوي 2 أو 6 أقراص.  
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز والمستورد: چلاكوسميتكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكوسميتكلاين تريدينج سيرفيسس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:  
إيميتريكس أقراص 50 ملغ: 102-91-28531  
إيميتريكس أقراص 100 ملغ: 055-93-26919
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- تم إعدادها في كانون الأول 2025.
- العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
- ©2026 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.