

Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

Полискин Раствор

Активный ингредиент и его концентрация:

Повидон Йод Povidone Iodine 10% w/w (эквивалентно 1% w/w йода iodine)

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в разделе 6 («Дополнительная информация»).

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата.

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Способ применения препарата изложен в разделе «Способ применения и дозы» данной инструкции. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения в течение 7 дней следует обратиться к врачу.

1. Показания к применению:

Данное лекарство предназначено для оказания первой помощи при ранах, царапинах и легких ожогах. Для дезинфекции ран и легких ожогов, а также для обработки кожи при кожных инфекциях.

Терапевтическая группа: Антисептики (дезинфицирующие средства).

2. Перед применением препарата: Противопоказания к применению препарата:

- Гиперчувствительность (аллергия) к какому-либо из ингредиентов препарата или к йоду.

До начала применения препарата следует сообщить врачу о повышенной чувствительности к какому бы то ни было продукту питания или лекарственному препарату.

Особые предостережения относительно использования препарата:

- Следует избегать нанесения на обширные участки кожи.

Перед обработкой препаратом Полискин раствор

- Следует проконсультироваться с врачом, прежде чем обрабатывать глубокие раны.
- Не используйте препарат без предварительной консультации с врачом, если вы страдаете или ранее страдали дисфункцией щитовидной железы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Если вы принимаете другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и биодобавки, или если недавно закончили курс лечения другим лекарственным препаратом, следует сообщить об этом врачу или фармацевту во избежание рисков или неэффективности в результате межлекарственного взаимодействия.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность:

Если вы беременны или кормите грудью, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед применением препарата.

3. Способ применения и дозы

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Внимание! Не глотать! Данный препарат предназначен исключительно для наружного использования.

Способ применения препарата - общие указания

- Можно наносить капли раствора Полискин непосредственно на кожу и на рану и дать препарату высохнуть на коже (при этом образуется защитный слой). Можно смочить раствором марлю, наложить на рану и забинтовать.
- Первая помощь: для обработки ран – наносить раствор Полискина 2-4 раза в день, пока рана не заживет. При кожных инфекциях – смазывать раствором

Полискина с той же периодичностью до полного заживления, либо в соответствии с указаниями врача.

- Если нет улучшения состояния после недели применения, следует обратиться к врачу.
- Пятна на теле или на хлопковых тканях можно удалить, промывая водой.

Не превышать рекомендуемую дозу. В случае передозировки или случайного проглатывания препарата ребенком немедленно обратитесь в приемное отделение больницы; возьмите с собой упаковку препарата.

Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом применении препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при использовании любого лекарства, применение препарата Полискин раствор может привести к побочным эффектам у некоторых людей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Наряду с желаемым действием лекарства в период его использования могут появиться и побочные явления, такие как длительно сохраняющаяся сыпь, раздражение или отечность.

В случае появления или усугубления какого-либо из побочных эффектов, либо проявления побочного эффекта, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Извещение о побочных эффектах

Сообщить о побочных эффектах в Министерство здравоохранения можно, заполнив формуляр по ссылке «Уведомление о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), либо по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Условия хранения препарата

- Не допустите отравления!** Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства,

следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

- Полискин раствор можно использовать после первичного вскрытия флакона до окончания срока годности.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Хранить в прохладном месте, при температуре ниже 25°C.

6. Дополнительная информация:

Помимо действующего вещества, препарат содержит также: Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid, Purified Water.

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета.

Содержимое упаковки: 20 мл.

Производитель и держатель лицензии: Бен Шимон Флорис ЛТД. Индустриальный парк Мисгав. Почтовый ящик Мисгав 2017400.

Отредактировано в январе 2026 г. в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре Министерства здравоохранения: 134-07-31367-00