

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

**פרילידן
קרם**

החומרים הפעילים וריכוזם:
לידוקאין 2.5% lidocaine
פרילוקאין 2.5% prilocaine

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עלך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

קרם פרילידן משמש ל:

- אלחוש מקומי של העור במבוגרים ובילדים בהקשר של:
 - החדרת מחט, כגון בעירוניים תוך-ורידיים או בדיקות דם
 - ניתוחים שטחיים
- אלחוש מקומי של ריריות איברי המין, למשל לפני ניתוחים שטחיים או הרדמה באמצעות זריקה
- אלחוש מקומי של כיבי רגליים על מנת להקל ניקוי או הסרת רקמה פגועה, במבוגרים בלבד.

קבוצה תרפויטית: מאלחש מקומי מקבוצת האמידים.

קרם פרילידן פועל על ידי אלחוש פני העור לתקופת זמן קצרה. מורחים אותו על העור לפני הליכים רפואיים מסוימים. זה מסייע בשיכוך הכאב על העור, אך עדיין ייתכן שתחוש בלחץ ומגע.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה או למאלחש מקומי דומה אחר (ראה פרק 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בקרם פרילידן ספר לרופא אם:

- לך או לילדך יש מחלה תורשתית נדירה המשפיעה על הדם, שנקראת "מחסור בגלוקוז-6-פוספאט דהידרוגנאז" (אנזים G6PD, רגישות לפול).
- לך או לילדך יש בעיה ברמות פיגמנט בדם הנקראת מטהמוגלובינמיה (כחלת).
- אין להשתמש בקרם פרילידן באזורים שבהם יש פריחה בעור, חתכים, שפשופים, שריטות או פצעים פתוחים אחרים, פרט לכיב ברגל. אם אחת מבעיות אלו קיימת, בדוק עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.
- אתה או ילדך סובלים ממצב של גירוי בעור הנקרא אטופיק דרמטיטיס. ייתכן שמשך שהייה קצר יותר על העור יספק.
- השארת הקרם על העור למשך יותר מ-30 דקות יכולה לגרום לעלייה בשכיחות של תגובות עוריות מקומיות (ראה גם פרק 4 "תופעות לוואי").
- אתה נוטל תרופות מסוימות להפרעות בקצב הלב (אנטי-ארייתמיות מקבוצה class III, כגון אמיודארון). במקרה זה הרופא ינטר את תפקוד הלב.

עקב הפוטנציאל לספיגה מוגברת בעור שגולח לאחרונה, חשוב לעקוב אחר המינון המומלץ, אזורי העור ומשך השארת הקרם המרוח על פני העור.

יש להימנע מכוניסית קרם פרילידן לתוך העיניים, מאחר שזה יכול לגרום לגירוי. אם בטעות קרם פרילידן חדר

לעין, יש לשטוף מייד היטב את העיניים במים פושרים או בתמיסת מי מלח (סודיום כלוריד). היזהר שלא להכניס כל דבר לעין עד לחזרת התחושה. אין למרוח קרם פרילידן על עור תוף פגום (באוזן). כאשר אתה משתמש בקרם פרילידן לפני שאתה מתחנן עם חיסונים חיים (לדוגמה חיסון שחפת), עליך לחזור לרופא או לאחות לאחר תקופת הזמן המבוקשת לצורך מעקב אחר תוצאות החיסון.

שימוש חוזר ונשנה בפרילידן עלול להעלות את הרמות בדם של החומרים הפעילים לידוקאין ופרילוקאין. יש להשתמש בפרילידן בזהירות במטופלים העלולים להיות רגישים יותר להשפעות חומרים אלה בדם, כולל מטופלים החולים במחלה חמורה, מוחלשים או קשישים, ומטופלים עם פגיעה חמורה בכבד.

ילדים ומתבגרים

ביילודים/תינוקות מתחת לגיל 3 חודשים נצפית בדרך כלל עלייה זמנית, שאינה רלוונטית מבחינה קלינית, ברמות הפיגמנט מטהמוגלובין בדם עד 12 שעות לאחר מריחת פרילידן.

יעילות פרילידן בעת לקיחת דם מהעקב של יילודים לא אושרה במחקרים קליניים.

אין להשתמש בפרילידן בתינוקות מתחת לגיל 12 חודשים שמטופלים בו זמנית בתרופות אחרות המשפיעות על רמות הפיגמנט בדם מטהמוגלובין (כגון, סולפונאמידים, ראה גם סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"). אין להשתמש בפרילידן ביילודים פגים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה ותרופות צמחיות, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מאחר שקרם פרילידן יכול להשפיע על האופן שבו תרופות מסוימות פועלות, ותרופות מסוימות יכולות להשפיע על הפעילות של קרם פרילידן.

ספר לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה או ילדך לקחתם לאחרונה:

- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים, הנקראות סולפונאמידים וניטרופורנטואין.
- תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה, הנקראות פניטואין ופנוברביטל.
- מאלחשים מקומיים אחרים.
- תרופות לטיפול בקצב לב לא סדיר, כגון אמיודארון.
- סימטידין או חוסמי בטא, אשר עלולים לגרום לעלייה ברמות לידוקאין בדם. לתגובה בין תרופתית זו אין רלוונטיות קלינית בטיפול קצר-טווח עם קרם פרילידן במינונים המומלצים.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם רופא או רוקח טרם השימוש בתרופה זו.

שימוש מזדמן בקרם פרילידן במהלך היריון לא אמור לגרום לתופעות לוואי בעובר. החומרים הפעילים בקרם פרילידן (לידוקאין ופרילוקאין) מופרשים לחלב האם. אולם, הכמות היא קטנה מאוד כך שבדרך כלל אין סיכון לילד.

ניסויים בבעלי חיים לא הראו פגיעה בפוריות הזכר או הנקבה.

נהיגה ושימוש במכוונות

לקרם פרילידן אין השפעה כלל או יש השפעה זניחה על יכולת הנהיגה והשימוש במכוונות כאשר משתמשים במינונים המומלצים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פרילידן מכיל polyoxyl 40 hydrogenated castor oil. חומר זה עלול לגרום לתגובות עוריות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתרופה.

שימוש בקרם פרילידן

היכן למרוח את הקרם, באיזו כמות להשתמש ומשך הזמן הנדרש להשארותו על העור תלויים במטרת השימוש.

פס קרם שאורכו כ-3.5 ס"מ, שווה בקירוב ל-1 גרם קרם.

מריחה של קרם פרילידן על ריריות איברי המין, עור איברי המין או כיבי רגליים צריכה להתבצע רק תחת השגחה של איש צוות רפואי, למעט כאשר משתמשים בו בתינוקות לצורך ברית מילה.

אין להשתמש בקרם פרילידן באזורים הבאים:

- חתכים, שפשופים, שריטות או פצעים, למעט כיבים ברגליים
- באזורים שבהם ישנה פריחה בעור או אקזמה
- בתוך העיניים או בסמוך אליהן
- בתוך האף, באוזן או בפה
- בפני הטבעת.

אנשים שמורחים או מסירים קרם לעיתים קרובות צריכים לוודא שהמגע נמנע על מנת למנוע התפתחות של רגישות יתר.

הממברנה המגינה של השפופרת ניתנת לניקוב על ידי שימוש במכסה.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:

מינון במבוגרים ובמתבגרים (מעל גיל 12):

שימוש על העור לפני פרוצדורות זעירות (כגון החדרת מחט או ניתוחים מינוריים בעור):

יש למרוח על העור שכבה עבה של קרם. יש לעקוב אחר ההוראות בעלון או הוראות הרופא. במקרים מסוימים הרופא או האחיות ימרחו את הקרם.

יש לכסות את הקרם שנמרח על ידי כיסוי אטום (ניילון נצמד) אשר מוסר ממש לפני תחילת הפעולה.

המינון המקובל עבור מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 הוא 2 גרם.

עבור מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 יש למרוח את הקרם לפחות 60 דקות לפני ההליך (אלא אם משתמשים בקרם על איברי המין). עם זאת, אין למרוח אותו יותר מ-5 שעות לפני כן.

מינון בילדים:

לשימוש על העור לפני פעולות רפואיות זעירות (כגון החדרת מחט או ניתוחי עור זעירים).

משך השארת הקרם על פני העור: יש למרוח כשעה לפני הפעולה.

יילודים ותינוקות בני 0-2 חודשים:

עד 1 גרם קרם על שטח עור שאינו גדול מ-10 ס"מ² (10 סנטימטרים רבועים). זמן ההשארה על העור: **שעה אחת, לא יותר.**

רק מנה אחת צריכה להינתן בכל 24 שעות.

בשימוש בתינוקות עבור ברית מילה, מנה יחידה של 1.0 גרם קרם פרילידן על העורלה הוכחה כבטוחה. בתינוקות שנולדו במועד ובתינוקות מתחת לגיל 3 חודשים, יש למרוח רק מנה יחידה בכל 24 שעות.

תינוקות בני 3-11 חודשים:

עד 2 גרם קרם על שטח עור שאינו גדול מ-20 ס"מ² (20 סנטימטרים רבועים). זמן ההשארה על העור: בערך **שעה.**

ילדים בני 1-5 שנים:

עד 10 גרם קרם על שטח עור שאינו גדול מ-100 ס"מ² (100 סנטימטרים רבועים). זמן ההשארה על העור: בערך **שעה**, מקסימום 5 שעות.

ילדים בני 6-11 שנים:

עד 20 גרם קרם על שטח עור שאינו גדול מ-200 ס"מ² (200 סנטימטרים רבועים). זמן ההשארה על העור: בערך **שעה**, מקסימום 5 שעות.


מקסימום של 2 מנות במרווח של לפחות 12 שעות עשוי להינתן לילדים מעל גיל 3 חודשים במהלך 24 שעות.

ניתן להשתמש בפרילידן בילדים עם אטופיק דרמטיטיס, אך זמן ההשארה על העור במצב זה הוא 30 דקות

ולא יותר.


אופן השימוש:

כשאתה מורח את הקרם, חשוב מאוד לעקוב בדיוק אחר ההוראות הבאות:
1. לחץ על שפופרת פרילידן להוצאת שכבת קרם באזור הנדרש על העור (למשל היכן שהמחט עומדת להיות מוחדרת). פס קרם שאורכו כ-3.5 ס"מ, שווה בקירוב ל-1 גרם קרם. אין לעסות את הקרם לתוך העור.




1

2. כסה בזהירות את העור שעליו נמרח פרילידן בעזרת כיסוי אטום, כגון ניילון נצמד. אין למרוח את הקרם שמתחת לכיסוי.




2

3. השאר את הכיסוי במקומו לפחות 60 דקות אם העור אינו פגום. אין להשאיר את הקרם המרוח יותר מ-60 דקות בילדים מתחת לגיל 3 חודשים, או יותר מ-30 דקות בילדים עם מצב של עור מגרד הנקרא אטופיק דרמטיטיס. אם משתמשים בקרם במריחה על איברי המין או על כיבים, יש להשאיר את הקרם לפרקי זמן קצרים יותר כפי שמתואר בהמשך.



3

4. הרופא או האחיות יסירו את הכיסוי ויסירו את קרם פרילידן מייד לפני תחילת ההליך הרפואי (למשל לפני החדרת מחט).



4

שימוש על אזורים גדולים של עור שגולח לאחרונה לפני הליכים שלא דורשים אשפוז בבית חולים (כגון טכניקות הסרת שיער):

עקוב אחר הוראות הרופא והצוות הרפואי. המינון המקובל הוא 1 גרם קרם לכל אזור עור שגודלו 10 ס"מ² (10 סנטימטרים רבועים), להשארה על העור למשך 1 עד 5 שעות תחת כיסוי. אין להשתמש בקרם פרילידן על אזור של עור שגולח לאחרונה שגודל יותר מ-600 ס"מ² (600 סנטימטרים רבועים, לדוגמה 30 ס"מ על 20 ס"מ). המינון המרבי הוא 60 גרם.

שימוש על העור לפני הליכים המבוצעים בבית חולים (כגון השתלת עור) הדורשים הרדמה עורית עמוקה:

- ניתן להשתמש בפרילידן למטרה זו במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12, אך רק תחת השגחת רופא או אחות.
- המינון המקובל הוא 1.5 גרם עד 2 גרם קרם לכל אזור עור שגודלו 10 ס"מ² (10 סנטימטרים רבועים).
- יש להשאיר את הקרם תחת הכיסוי 2 עד 5 שעות.

שימוש על העור לפני הסרת נגעים דמויי יבלות הנקראים מולוסקה:

- ניתן להשתמש בפרילידן בילדים ובמתבגרים שיש להם אטופיק דרמטיטיס.
- המינון המקובל תלוי בגיל הילד והוא ניתן לשימוש למשך 30 עד 60 דקות (30 דקות אם למטופל יש אטופיק דרמטיטיס). הרופא יורה לך מהי כמות הקרם שיש להשתמש בה.

שימוש על עור איברי המין לפני זריקות של הרדמה מקומית:

- ניתן להשתמש בפרילידן למטרה זו רק באמצעות אנשי צוות רפואי, במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12.
- המינון המקובל הוא 1 גרם קרם (1 גרם עד 2 גרם לעור איברי המין בנשים) לכל אזור עור שגודלו 10 ס"מ² (10 סנטימטרים רבועים).
- הקרם נמרח ומכוסה בכיסוי למשך 15 דקות על עור איברי המין בגברים ולמשך 60 דקות על עור איברי המין בנשים.

שימוש על איברי מין לפני ניתוח עור מינורי (כגון הסרת יבלות):

- ניתן להשתמש בפרילידן למטרה זו רק באמצעות אנשי צוות רפואי, במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12.
- המינון המקובל הוא 5 עד 10 גרם ל-10 דקות. אין להשתמש בכיסוי. ההליך הרפואי צריך להתחיל מייד לאחר מכן.

שימוש לכיבי רגליים לפני ניקוי או הסרת עור פגום:

- ניתן להשתמש בפרילידן למטרה זו במבוגרים, אך רק תחת השגחת רופא או אחות.
- המינון המקובל הוא 1 גרם עד 2 גרם קרם לכל אזור עור שגודלו 10 ס"מ² (10 סנטימטרים רבועים) עד כמות כוללת של 10 גרם.
- הקרם נמרח תחת כיסוי אטום לאוויר כמו ניילון נצמד ונשאר למשך 30 עד 60 דקות לפני שהכיב ינוקה. הסר את הקרם עם פד גזה מכותנה והתחל בניקוי ללא עיכוב.
- ניתן להשתמש בפרילידן לפני ניקוי כיבי רגליים עד 15 פעמים במהלך תקופה של 1-2 חודשים.
- השפופרת של פרילידן מיועדת לשימוש חד-פעמי כאשר משתמשים בה לכיבי רגליים: יש להשליך את השפופרת עם כל התכולה הנוותרת לאחר כל טיפול.

קשישים

אין צורך בהפחתת מינון בקרב מטופלים קשישים.

מטופלים בעלי תפקוד כבדי לקוי

אין צורך בהפחתת מנה יחידה בקרב מטופלים עם תפקוד כבד לקוי (ראה בפרק 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

מטופלים בעלי תפקוד כלייתי לקוי

אין צורך בהפחתת מינון בקרב מטופלים עם תפקוד כלייתי לקוי (ראה בפרק 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

אין לעבור על המנה המומלצת

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם מרחת כמות גדולה יותר מהמומלץ בעלון זו או יותר מהכמות שהרופא או הרוקח הורו לך, שוחח איתם מייד, גם אם אינך חש בתסמינים.

התסמינים של מריחת יתר של קרם פרילידן מפורטים מטה. לא סביר כי תסמינים אלה יתרחשו בשימוש בקרם פרילידן בהתאם למינון המומלץ.

- תחושת ערפול או סחרחורת
- עקצוץ של העור סביב הפה ותחושת נימול של הלשון
- תחושת טעם בלתי רגילה
- ראייה מטושטשת
- צפצופים באוזניים
- קיים גם סיכון למטהמולובינמיה חריפה (בעיה ברמות פיגמנט הדם). סביר יותר שזה יתרחש כאשר תרופות מסוימות נלקחו בו זמנית. אם זה קורה, העור הופך לכחלחל-אפור בשל חוסר חמצן. במקרים חמורים של מנת יתר, התסמינים יכולים לכלול התקפים, לחץ דם נמוך, נשימה מואטת, הפסקת נשימה וקצב לב משתנה. תופעות אלו עשויות להיות מסכנות חיים.

אם מרחת קרם פרילידן בכמות גדולה מהמומלץ או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקרם פרילידן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פנה לרופא או לרוקח אם תופעת לוואי כלשהי מבין תופעות הלוואי הבאות מטרידה אותך או שלא נראה שעומדת לחלוף. ספר לרופא על כל דבר אחר הגורם לך לחוש לא טוב בזמן שאתה משתמש בקרם פרילידן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא אם אתה חווה אחת מהתופעות הבאות במהלך השימוש בקרם פרילידן:

- תגובות אלרגיות, שבמקרים נדירים עלולות להתפתח לשוק אנפילקטי (פריחה בעור, נפיחות, חום, קשיי נשימה ועילפון) במהלך הטיפול בעור, ברירית איברי המין או בכיבים ברגליים.
- מטהמולובינמיה (בעיה בדם), שבמקרים נדירים עלולה להתפתח במהלך הטיפול בעור, ועלולה לגרום לסימנים ותסמינים של היפוקסמיה (רמות נמוכות חריגות של חמצן בדם). מטהמולובינמיה נצפתה בתדירות גבוהה יותר, לעיתים קרובות בקשר למינון יתר, בתינוקות שזה עתה נולדו ובתינוקות מגיל 0 עד 12 חודשים.

תגובה קלה (חיורון או אדמומיות של העור, נפיחות קלה, תחושת צריבה ראשונית או גירוי) עלולה לקרות באזור מריחת קרם פרילידן. אלו הן תגובות תקינות לקרם ולחומרים מאלחשים והן ייעלמו תוך זמן קצר ללא צורך בשימוש באמצעים נוספים.

אם אתה חווה השפעות מטרידות או יוצאות דופן כשאתה משתמש בקרם פרילידן, הפסק את השימוש בקרם ובדוק עם הרופא או הרוקח מוקדם ככל שניתן.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- תגובות עוריות מקומיות חולפות (חיורון, אדמומיות, נפיחות) במקום המטופל במהלך הטיפול בעור, ברירות של איברי המין או בכיבים ברגליים.
- תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול ברירות איברי המין או בכיבים ברגליים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול בעור.
- חוסר תחושה (עקצוץ) באזור המטופל במהלך הטיפול ברירות איברי המין.
- גירוי העור המטופל במהלך הטיפול בכיבי רגליים.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- דימום בצורת נקודות קטנות באזור המטופל (במיוחד אצל ילדים עם אקזמה לאחר זמני השארה ממושכים יותר של הקרם) במהלך הטיפול בעור.
- גירוי של העיניים אם קרם פרילידן בא במגע עימן בטעות במהלך הטיפול בעור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל-25°C. אין להקפיא.
- ניתן להשתמש בקרם פרילידן עד 6 חודשים לאחר פתיחת השפופרת לראשונה.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאינן משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, carbomer, sodium hydroxide, purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

קרם לבן רך הארוז באריזה המכילה שפופרת אלומיניום של 30 גרם קרם.

בעל הרישום וכתובתו:

הלפרין אנ הייץ' מדיק בע"מ, רח' צור 19, מעיין צבי 30805.

שם היצרן וכתובתו:

Rafarm S.A. 12 Korinthou St., 154 51 N Psihiko, Athens, Greece.

נערך בינואר 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 160-64-35545

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.