

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

רקטוזורין® משחה

הרכב

אבץ אוקסיד
ביסמוט אוקסיכלוריד
בנזוקאין
תימול בי-יודיד
מנטול

רקטוזורין® פתילות

הרכב

כל פתילה מכילה:

תימול בי-יודיד
ביסמוט סבגאלט
אבץ אוקסיד
בנזוקאין
חומצה טאנית
מנטול

למידע על מרכיבים בלתי פעילים
ואלרגניים ראה סעיף – "מידע חשוב
על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף
"מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע
תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות
בסעיף בעלון זה. היוועץ ברוקח אם
אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות
לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים)
מחמירים או אינם משתפרים.
התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת
לגיל שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

הקלה בכאבי טחורים.

קבוצה תרפויטית

תכשירים לטיפול בטחורים לשימוש בפי
הטבעת (שימוש רקטאלי).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, ראה סעיף – "מידע נוסף".
- אתה רגיש למאלחשים מקומיים (פרוקאין, בוטאקאין) או לחומצה פרא-אמינובנזואית, לפראבנים או ל- () או לצבעי שיער. ראה סעיף – "מידע נוסף".
- מדובר בשטחי עור גדולים, בפריחה עורית, בכוויות שמש, בעור פגום או מודלק או בפה או בעיניים.
- יש לך קצב לב איטי או לא סדיר.
- יש לך היסטוריה או חשד למטהמוגלובינמיה, הפרעת דם נדירה שמשפיעה על היכולת של תאי הדם האדומים להעביר חמצן.
- יש שילוב עם תרופות מסוג סולפונאמידים, מעכבי כולין-אסטראז או אם יש לך פעילות מופחתת של כולין-אסטראז.
- יש לך חבישה אוקלוסיבית (חבישה שהיא אטומה לאוויר ולמים).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברקטוזורין ספר לרופא אם:

- את בהיריון, או אם את מניקה.
- יש לך דימום מפי הטבעת (דימום רקטאלי), דם בצואה או אם אתה חושש שמקור הדימום שאתה חווה אינו בטחורים.
- יש לך גרד כללי בכל הגוף.
- אתה מתחת לגיל שנים.
- אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- אתה רגיש לiodine.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת למטופלים מתחת לגיל שנים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, הנקה ופוריות

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהיריון או מניקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

רקטוזורין משחה ופתילות אינן בעלות השפעה על יכולת הנהיגה והשימוש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

רקטוזורין משחה מכילה לנולין (wool fat) העלול לגרום לתגובה מקומית בעור (כגון דלקת עור ממגע).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

פתילות

פתילה אחת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה (פעולת מעיים).

משחה

יש למרוח את המשחה באזור פי הטבעת בבוקר ובערב וכן לאחר כל יציאה (פעולת מעיים).

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

אופן השימוש

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש בפי הטבעת (רקטום) בלבד.

התרופות אינן מיועדות מתחת לגיל 18 שנים.

משה:

• רחץ ויבש בעדינות את אזור פי הטבעת.

• מרח כמות קטנה של המשחה באזור פי הטבעת ועסה בעדינות.

• סגור היטב את השפופרת.

• רחץ ידך.

פתילות:

• רחץ ויבש בעדינות את אזור פי הטבעת.

• **הוראות פתיחה:** הפרד פתילה אחת מסרט הפתילות. להסרת עטיפת הפלסטיק, הפרד הלשוניות בחלק השטוח של עטיפת הפלסטיק ומשוך לצדדים עד יציאת הפתילה החוצה. ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה (ראה הערה מטה).

• שכב על צידך והחדר הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע.

• בסיום, רחץ היטב את ידך.

הערה: אם הפתילה רכה מדי, ניתן לצננה במקרר במשך כ- דקות או לצננה תחת מים קרים לפני הסרת עטיפת הפלסטיק.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר בשימוש בכמות מעבר למנה המומלצת, ייתכן שתחוה תסמינים, כגון קוצר נשימה, כאבי ראש, הרגשה לא טובה, עייפות, עור או שפתיים כחולים או אפורים, סחרחורת ובלבול. אם אתה חווה תסמינים אלה, יש להפסיק להשתמש בתרופה ולהתייעץ עם הרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלעת או בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אם שכחת ליטול את התרופה, קח את המנה הבאה לפי הצורך. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברקטוזורין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-עד משתמש 1 מתוך 1,000):

יש להפסיק את השימוש ברקטוזורין ולפנות מייד לרופא אם:

- יש לך תגובת רגישות יתר, היכולה להתבטא בפריחה, אודם בעור, נפיחות קלה בעור, שלפוחיות, החמרה בגרד ו/או בגירוי.

תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- צריבה, אדמומיות, גירוי, גרד או כאב בזמן מריחה/החדרה של התרופה. אם תופעות אלה נמשכות יותר מכמה ימים, יש להיוועץ ברופא.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה () המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **יש לאחסן תרופות אלו מתחת ל-25°C.**

• **ניתן להשתמש ברקטוזורין משחה עד 12 חודשים לאחר פתיחת השפופרת לראשונה, אך לא לאחר תאריך התפוגה המופיע על האריזה.**

• אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

משחה:
Petrolatum, mineral oil, wool fat, purified water, yellow wax,

פתילות:

Witepsol E-76, witepsol W-35

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

רקטוזורין משחה:

משחה בצבע צהבהב.

האריזה מכילה שפופרת אלומיניום המכילה גרם משחה.

רקטוזורין פתילות:

פתילות בצבע צהבהב עד חום בהיר. האריזה מכילה פתילות.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ,

רחוב דבורה הנביאה , תל אביב

העלון נערך בנובמבר 2025.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רקטוזורין משחה:

רקטוזורין פתילות:

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.