

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

دائالون شراب

المادة الفعالة وتتركيزها:

يحتوي كل 1 ملل على:
بريدنيزولون (Prednisolone) 3 ملغ

المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر البند 6 "معلومات إضافية". انظر أيضاً "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء" في البند 2.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات مهمة عن مرضة. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه لأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

جلوكوكورتيكويد (قشراني سكري) ذو تأثير مضاد للإلتهاب.

الدواء مخصص لعلاج (6) أعراض الحساسية الحادة من شأنها أن تشمل طلع أحمر وبارز في الجلد، الصمءاء، وظائف المفاصل، الوظائف النموية، أمراض الكولاجين، أمراض العينين، أمراض الجلد، أمراض في الجهاز التنفسي، أمراض ورمية، أمراض في الجهاز الهضمي، حالات التحسس والوذمة.

الفصيلة العلاجية: كورتيكوستيرويدات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجحي) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (الرجاء انظر البند 6) أعراض الحساسية الحادة من شأنها أن تشمل طلع أحمر وبارز في الجلد، صعوبات في التنفس، انتفاخ في الوجه، في الفم، في الشفتين وفي الجفون، سخونة مرتفعة غير مفسّرة وشعور بالإغماء. **في حال كان الانتفاخ يؤثر على التنجسب ويصعب عملية التنفّس والبُلع، يجب التوجه فوراً إلى المستشفى.**
- كنت تعاني من ثلوث الذي يؤثر على الجسم بأكمله (إلا إذا كنت تحصل على علاج للثلوث).
- حصلت مؤخراً على لقاح حي.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بدائالون احك لطبيب إذا:

كنت تعاني في الماضي من الكنايب أو اكتئاب شديد أو من هوس اكتئابي (اضطراب ثنائي القطب)، الذي يشمل اكتئاب قبل أو خلال استعمال أدوية التي تحتوي على ستيرويدات مثل: دائالون.

- يعاني أو عانى أحد افراد عائلتك المقربين في الماضي من مشاكل نفسية المذكورة أعلاه. إذا كنت تعاني من تصلّب الجلد، تصلّب الأوعية الشاملة (مرض المناعة الذاتية)، نظراً لأن المقادير الدوائية اليومية ذات 15 ملغ أو أكثر يمكن أن تزيد من خطورة الإصابة بآزمة تصلب الجلد الكولي. العلامات لأزمة تصلب الجلد الكولي هي: ارتفاع ضغط الدم، انخفاض نتاج البول. بإمكان طبيبك أن يوصيك بمراقبة ضغط الدم والبول.

اتصل بالطبيب في حال شعرت بضبابية في الرؤية أو أي اضطراب آخر في الرؤية.

- مشاكل نفسية أثناء استعمال دائالون**، من الممكن حدوث مشاكل نفسية خلال استعمال أدوية تحتوي على ستيرويدات مثل: دائالون.
 - قد تكون هذه الأمراض خطيرة.
 - قد تبدأ المشاكل النفسية خلال عدة أيام أو أسابيع من بدء العلاج.
 - المشاكل النفسية متوقّعة أكثر في المقادير الدوائية العالية.
 - غالبية المشاكل النفسية تزول عند خفض المقدار الدوائي أو إيقاف العلاج. على أي حال، في حال حدوثها يحتاج علاجها.
 - أخبر الطبيب إذا ظهر لديك (أو لدى المتعالج الذي يتناول الدواء) علامات مشاكل نفسية، خاصة إذا كنت تعاني من اكتئاب أو تفكر بالانتحار.** في حالات قليلة، حدثت مشاكل نفسية عندما تم خفض المقدار الدوائي أو تم إيقاف الدواء.
- جدي الماء، القوياء المنطقية أو الحصبية.**
 - أخبر الطبيب إذا مرضت في الماضي بجديري الماء، بالقوياء المنطقية أو بالحصبية أو في حال حصلت في الماضي على لقاح لهذه الثلوثات.
 - أثناء تناول الدواء يجب الامتناع عن التواجد بالقرب من مرضى جديري الماء، القوياء المنطقية أو الحصبية، خاصة إذا لم تصب بهذه الأمراض في الماضي. في حال تواجدت بالقرب من مرضى مع جديري ماء، قوياء منطقيه أو حصبية **يجب التوجه فوراً إلى الطبيب**.
 - في حال مرضت بجديري ماء، قوياء منطقيه أو حصبية **يجب التوجه فوراً إلى الطبيب**. سيصلحك الطبيب حول كيفية تناول الدواء، ومن الجائز أن يغير لك الطبيب المقدار الدوائي من دائالون.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من السل أو تعفن الدم (تسمم الدم) .
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى.

- كنت تعاني من فرط ضغط الدم (أو كانت لديك سابقة عالية لفرط ضغط الدم)، من مشاكل في القلب أو إذا عانيت مؤخراً من نوبة قلبية.
- كنت تعاني أو إذا كانت لديك سابقة عائلية لـ:
 - السكري.
 - هشاشة العظام.
 - جلوكوما (ارتفاع الضغط داخل العين).
 - صرع (اختلاجات).

عانيت في الماضي من ضعف في العضلات أثناء استعمال بريدنيزولون أو أدوية أخرى التي تحتوي على ستيرويدات.

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة في المعدة.

كنت تعاني من قصور في عمل الغدة الدرقية.

إذا كنت تعاني من أحد الحالات المذكورة أعلاه، من الجائز أن يقوم الطبيب بمراقبة حالتك عن كثب، خلال العلاج بدائالون.

تحذيرات إضافية:

تداخلات/ تفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. وخاصةً يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- هناك أدوية قد تزيد من تأثير دائالون، ومن الجائز أن يرغب طبيبك في مراقبة حالتك بعناية إذا كنت تتناول هذه الأدوية (بما في ذلك أدوية فيروس نقص المناعة البشرية HIV: ريتونايفير وكوبيسيستات).**
- رفاهيين ورفاغوتين (مضادات حيوية لعلاج السل)،** استعمال هذه الأدوية مع بريدنيزولون يمكنه أن يمنع بريدنيزولون من العمل كما ينبغي.
- كارامازيبين، فينيتوين، بريمدون، فينوباربينون (لعلاج الصرع)،** استعمال هذه الأدوية مع بريدنيزولون يمكنه أن يمنع بريدنيزولون من العمل كما ينبغي.
- أفيديرين (لعلاج احتقان الأنف)،** استعمال أفيديرن مع بريدنيزولون يمكنه أن يمنع بريدنيزولون من العمل كما ينبغي.
- أمينوجلوثيميد (لعلاج الحمل)،** استعمال هذا الدواء مع بريدنيزولون يمكنه أن يمنع بريدنيزولون من العمل كما ينبغي.
- ميفيريستون (إيقاف الحمل)،** استعمال ميفيريستون مع بريدنيزولون يمكنه أن يمنع بريدنيزولون من العمل كما ينبغي لعدة أيام.
- إريثرومايسين (مضاد حيوي لعلاج التلوثات)،** عند تناول هذا الدواء مع بريدنيزولون، قد يقوم الطبيب بتغيير المقدار الدوائي من بريدنيزولون، لأنه خلاف ذلك من الجائز أن تعانish أعراض جانبية أكثر.
- كينوكسازول (لعلاج ثلوث فطري)،** عند تناول الدواء مع بريدنيزولون، قد يقوم الطبيب بتغيير المقدار الدوائي من بريدنيزولون، لأنه خلاف ذلك من الجائز أن تعانish أعراض جانبية أكثر.
- سيكلوسبورين (لمنع رفض عضو بعد عملية زرع)،** عند تناول هذا الدواء مع بريدنيزولون، قد يقوم الطبيب بتغيير المقدار الدوائي من بريدنيزولون، لأنه خلاف ذلك من الجائز أن تعانish أعراض جانبية أكثر.
- هورمونات الحايوية (إسروجينات تشمل حبوب منع الحمل،** من الجائز أن تعانish أعراض جانبية أكثر. من شأن الطبيب تغيير المقدار الدوائي من بريدنيزولون.
- أدوية للسكري (مثل: إنسولين)،** عند استعماله مع بريدنيزولون من الجائز أن لا تعمل هذه الأدوية كما ينبغي.
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم (مثل: هيدرالازين)،** عند استعمالها مع بريدنيزولون من الجائز أن لا تعمل هذه الأدوية كما ينبغي.
- أدوية مدرّة للبول (مثل: بيندروفلوميثايزيد)،** عند تناولها مع بريدنيزولون من الجائز أن لا تعمل هذه الأدوية كما ينبغي.
- سوماتروبين (هورمون النمو)،** عند استعماله مع بريدنيزولون من الجائز أن لا يعمل هذا الدواء كما ينبغي.
- أدوية لعلاج الوهن العضلي الوبيل myasthenia gravis (ضعف العضلات)،** مثل نيوستيجمين، عند تناولها مع بريدنيزولون من الجائز أن لا تعمل هذه الأدوية كما ينبغي.
- أدوية يتم تناولها لفحص بالأشعة السينية (رينجنج)،** عند تناولها مع بريدنيزولون من الجائز أن لا تعمل هذه الأدوية كما ينبغي.
- الأدوية المضادة لتخثر الدم (مثل: وارفارين وكومادين)،** عند تناولها مع بريدنيزولون يزيد احتمال حدوث أزمة نزف، لذلك سيؤمّم الطبيب بمراقبة وضِعك عن كثب.
- أسبيرين وأدوية مضادة لالتهابات ليست ستيرويدية (مثل: إيبوبروفين)،** عند تناولها مع بريدنيزولون يزيد احتمال تطور قرحات أو أزمة من المعدة.
- سالييسيلات (مثل أسبيرين)،** من الجائز أن تشعر بأعراض جانبية أكثر للسالييلات عند إيقاف العلاج مع بريدنيزولون.
- ميثوتريكسات (كعلاج مضاد للسرطان)،** عند التناول مع بريدنيزولون من الجائز أن تعانish أعراض جانبية شديدة أكثر.
- بالإضافة إلى ذلك، أخبر الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول الأدوية التالية، تناول هذه الأدوية سوية مع دائالون ممكن أن يؤدي إلى انخفاض في نسب اليوتاسيوم في الدم (Hypokalemia):
- أستزولاميد (لعلاج الجلوكوما والصرع).
- مدرات البول مثل: فوروسيميد وبنيدروفلوميثايزيد (لعلاج فرط ضغط الدم).

- كربنوكسولون (لعلاج نقرح المعدة).**
- أدوية لعلاج الربو (مثل: ثيوفيلين، ماموتيرول، فينوتيرول، فورموتيرول، ريتودرين، سالبوتامول، سالميتيرول وتيروبالتين).**
- أمفوتريسين (لعلاج ثلث فطري).**

- لقاحات،** في حال كنت قد حصلت على لقاح مؤخراً أو إذا كنت تخطط الحصول على لقاح، أخبر الطبيب قبل تناول دائالون. وذلك لأن هناك حقن أو لقاحات التي لا يجوز إعطاؤها للمرضى الذين يتناولون بريدنيزولون.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع أو مباشرة بعد وجبة الطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، متعتدين للحمل، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

كل 1 ملل من الدواء تحتوي على:

- 0.86 ملغ صوديوم.

- 0.36 غرام سوكروز.

إذا أخبرك الطبيب بانك تعاني، أو يعاني طفلك من عدم التحمل لسكريات معينة، توجه للطبيب قبل تناول/إعطاء هذا الدواء. السكر قد يضر بالأسنان.

- 1 ملغ حمض البنزويك.

حمض البنزويك قد يزيد من اليرقان (الاصفرار) لدى حديثي الولادة.

- 0.23 غرام بروبيلين غليكول.

الأطفال دون عمر 5 سنوات، يجب استشارة الطبيب/الصيدلي قبل إعطاء الدواء خاصة إذا كان الطفل يتناول أدوية أخرى تحتوي على بروبيلين غليكول أو كحول.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات إضافية أثناء تناول الدواء.

إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو في الكلى يجب استشارة الطبيب. من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات إضافية أثناء تناول الدواء.

- 1 36.1 ملغ إيثانول.

الكمية الإجمالية من الإيثانول بالعينة: 2,166 ملغ.

يحتوي المستحضر على 4.6% v/v إيثانول (كحول).

3. كيفية استعمال الدواء؟

سيقرر الطبيب المقدار الدوائي الأكثر ملاءمة لك أو لابنك.

يجب الإستعمال دائماً بحسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

انتبه:

في الأدوية السائلة، عليك استعمال محقنة لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. لا تستعمل ملعقة صغيرة بيئية لقياس كمية الدواء. الملاعق البيئية تختلف بحجمها ومن الجائز أن لا تحصل على كمية الدواء الصحيحة.

الأغطية المقاومة للنتح من قبل الأطفال قلصت بصورة واضحة عدد حالات التسمّم الناجمة عن الأدوية في كل سنة. إذا كنت تواجه صعوبة في فتح العبوة، بإمكانك التوجه إلى الصيدلي للحصول على مساعدة.

إذا تناولت جرعة وادنية مفرطة بالخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة الدوائية التالية بأسرع ما يمكن. إذا كان وقت الجرعة التالية قريباً، تحطى الجرعة الدوائية المفصية واستمر بالمقدار الدوائي المعتاد، ولا تتناول جرعة مضاعفة.

يجب المواظبة على العلاج وفقاً لتعليمات الطبيب.

إذا توقفت عن تناول دائالون:

استشر الطبيب قبل إيقاف العلاج بدائالون.

- لا يجوز إيقاف العلاج بدواء بشكل مفاجئ.** سيؤمّم الطبيب بإرشادك حول كيفية خفض المقدار الدوائي ببطء على مدى عدة أسابيع أو أشهر من أجل تقليل خطورة ظهور أعراض فطام.
- إيقاف العلاج بدائالون (خاصة بشكل مفاجئ)** ممكن أن يؤدي إلى ظهور **أعراض فطام.** الأعراض الشائعة هي:
 - سخونة مرتفعة.
 - آلام العضلات والمفاصل.
 - رشح.
 - انخفاض بالوزن.
 - حكة في الجلد.
 - عيون حمراء، مؤلمة وملتصقة (التهاب في ملتصحة العين).
 - صداع.

- غثيان.
- تشوش الروئية.
- انخفاض ضغط الدم.
- إذا كنت تعاني من أعراض فطام صعبة، أخبر الطبيب فوراً. من الجائز أن يطلب منك الطبيب العودة لتناول الدواء ومن ثم التوقف عن تناوله بوتيرة أبطأ.
- لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال دالانول شراب قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تجزع لقرءة قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني من أي منها.

يجب التوجه فوراً للطبيب في حال ظهور الأعراض التالية:

- رد فعل تحسسي حاد الذي يشمل طفح أحمر وبارز في الجلد، صعوبات في التنفس، انتفاخ في الوجه، في القدم، في الشفتين، والحنون. سخونة مرتفعة غير مفسرة وشعور بالإغماء. في حال كان الانتفاخ يؤثر على الحجرة ويصعب عملية التنفس والبلع، يجب التوجه فوراً إلى المستشفى.
- مشاكل نفسية خطيرة. ستيرونيدات، بما في ذلك بيريدنيولون، ممكن أن تؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة. هذه الظاهرة ممكن أن تحدث لدى البالغين والأطفال أيضاً. هذه الظاهرة ممكن أن تصيب 5 أشخاص من بين 100 مستعمل لـ بيريدنيولون تشمل الأعراض:
- شعور بالانقباض، يشمل أفكار انتحارية.
- شعور بالثوب (الوس) أو تغيرات في المزاج.
- قلق، مشاكل في النوم، صعوبات في التفكير أو ارتباك وفقدان الذاكرة.
- شعور، روية أو سماع أمور غير موجودة. أفكار غريبة ومخيفة، تغيرات في التصرفات وشعور بالوحدة.
- كنت مريض صرع وتعالني من اختلاجات أكثر من المعتاد.

الأعراض الجانبية التالية ممكن أن تحدث في حال كان تناول بيريدنيولون لفترة من الزمن:

- الشئوع غير معروف من المعطيات المتوفرة:
- في حال عانيت في الماضي من مرض السل، من شأن السل أن يعود.
- قد تعاني أكثر من التلوثات.
- سرطان نادر الذي ممكن أن يؤثر على الجلد وعلى أعضاء داخلية (ساركومة على اسم كايوسبي).
- ارتفاع في كريات الدم البيضاء.
- وجه مستدير وزيادة في الوزن (Cushingoid).
- عدم تحمل للكربوهيدرات الذي ممكن أن يؤدي إلى الحاجة للعلاج بمضاد للسكري أو ممكن أن يتطور لديك نوع معتدل من السكري بدون أعراض واضحة.
- اندام التوازن في الأملح أو احتباس السوائل في الجسم.
- انخفاض في نسب البوتاسيوم في الدم، الذي ممكن أن يؤدي إلى إرهاق، ارتباك، ضعف العضلات أو تشنج العضلات.
- ازدياد الشهية للطعام.
- فقدان بروتينات واندغام التوازن في الكالسيوم.
- دوار.
- صداع.
- ارتفاع في الضغط داخل العين، انتفاخ في العين، كتراكت.
- انفصال الشبكية في العين الذي يؤدي إلى خلل في الرؤية.
- بروز مقلة العين نحو الخارج.
- ترقق غشاء العين، تقام التهاب العين.
- دوار (فيرتجو).
- تمزق نسيج عضلة القلب، خاصة إذا أصبت مؤخراً بنوبة قلبية.
- قصور في القلب لدى المرضى الحساسين (لمشاكل في القلب).
- فرط ضغط الدم.
- انسداد في الأوعية الدموية (انصمام).
- فواق أو فساد المعدة.
- غثيان أو تقيؤات.
- انتفاخ في البطن أو أوجاع بطن.
- إسهال.
- تفرح في المريء.
- فطريات في الفم.
- التهاب البنكرياس الذي يؤدي إلى ألم بطني.
- تفرح في المعدة (الذي قد ينزف).
- ترقق الجلد، علامات أو كدمات على الجلد.
- ظهور أعراض شد.
- حب الشباب.
- شعيرات دموية منتفخة وبارزة للعين.
- زيادة الترقق.

- طلع، حكة في الجلد.
- فرط الشعر في الجسم (خاصة لدى النساء).
- تتاقص كتلة العضلة، ضعف أو الإم في العضلات.
- ترقق العظم مع ازدياد خطورة حدوث كسور (هشاشة العظم).
- أمراض في العظام.
- عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقف الدورة الشهرية تماماً.
- شفاء بطيء للجروح.
- شعور عام سيء.
- زيادة في الوزن.

تمزق في الوتر. الأعراض تشمل سمع أو إحساس بالتمزق، ألم شديد، كدمة فورية، اندغام القدرة على حمل وزن أو استعمال المنطقة المصابة.

- تشوش الروئية.
- أزمة تصلب الجلد الكلي - لدى متعالجين يعانون من تصلب الجلد (مرض المناعة الذاتية). العلامات لأزمة تصلب الجلد الكلي تشمل: ارتفاع ضغط الدم، انخفاض نتاج البول.

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال والمراهقين:
استعمال متواصل لهذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين ممكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو. إذا كنت الشخص المتعالج أو المعالج وتخشي من تأثير الدواء، عد واستشر الطبيب.

يجب على الأهل تبليغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وعن كل دواء إضافي يُعطى للطفل. انظر أعلاه الأعراض الجانبية وتفاعلات خاصة بين الأدوية التي تم تفصيلها.

مستون:

إذا كنت مسناً، سيقوم الطبيب بمراقبة وضعتك عن كثب أثناء تناول المستحضر، لألك ممكن أن تعالشي أعراض جانبية أكثر.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضع وبهذا الشكل تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة/المصفاة. يتغير تاريخ الصلاحية في اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- يمكن الاستعمال لمدة 6 أشهر بعد الفتح الأولي.
- لحماية المستحضر من الضوء، يجب حفظه في العبوة الأصلية.
- لا يجوز استعمال المستحضر عند وجود علامات واضحة لضرر على القنينة. قم بإرجاع المستحضر للصيدلية.
- لا يجوز رمي بقايا الأدوية المجارية أو لسلة النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من بقايا أدوية للحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
Sucrose, propylene glycol, glycerin, alcohol 95%, saccharin sodium, apricot vanilla flavor, benzoic acid, citric acid anhydrous, disodium edetate, purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟
محلول عديم اللون مائل للصففر، صاف ذو رائحة القنينة-شمش.
تحتوي كل عبوة على قنينة وعبوة 610 ملل شراب ومحقنة قياس 5 ملل.
- صاحب الإمتياز: شركة ميخافارم ج.مض،
ص.ب. 519، هود هشارون، 4510501، إسرائيل
- المنتج: تريما، منتجات طبية إسرائيلية معجارت ج.مض.
معجارت 4023000، إسرائيل.

تم إعداد هذه النشرة في آب 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 133.81.31155.00
من أجل سهولة وتوحيين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.