

## أبيترن فتائل 50 ملغ

### التركيب

تحتوي كل فتيلة على:

ديكلوفيناك صوديوم 50 ملغ

(Diclofenac sodium 50 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتعمن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه

النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية،

راجع الطبيب أو الصيدلي.

وَصِفَ هذا الدواء لعلاج مريضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى

ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مضاد للإلتهابات ومسكن للألام مثل تلك المتعلقة بالمفاصل، وبالعضلات وبالهيكال العظمي، وبالعمليات الجراحية السنية وبالعمليات الجراحية البسيطة الأخرى.

### الفصيلة العلاجية

من مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية (NSAIDs).

### 2) قبل إستعمال الدواء

#### لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت تعتقد بأنك حساس (ألرجي) للمادة الفعالة (ديكلوفيناك صوديوم)

أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة

6 - "معلومات إضافية")، أو كنت حساساً (ألرجي) لأسبيرين، إيبوبروفن

أو مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية (NSAIDs) الأخرى. علامات

لرد فعل تحسسي مفرط تشمل إنتفاخ الوجه والرقم (وذمة وعائية)،

مشاكل في التنفس، ألم في الصدر، رشح، طفح جلدي أو أي رد فعل

تحسسي أخطر.

● كنت حالياً، أو كانت لديك في الماضي قرحة (ulcer) في المعدة أو في

الديكتي عشر (قرحة هضمية) أو نزف في الجهاز الهضمي (هذا يمكن

أن يشمل دم في القيء، نزف عند إفراغ الأمعاء، دم جديد في البراز أو

براز أسود).

● كانت لديك مشاكل في المعدة أو في الأمعاء بعد تناول مضادات الإلتهاب

لا ستيروئيدية (NSAIDs) أخرى.

● وُجِدَ لديك فشل في القلب، الكلى أو الكبد.

● كنت مريض معروف في القلب و/أو مرض في الأوعية الدموية الدماغية

مثل: إذا إجتزت في الماضي نوبة قلبية، سكتة دماغية، سكتة إقفارية

عابرة (TIA)، إندساد الأوعية الدموية المؤدية للقلب أو للدماغ أو إذا

إجتزت أي عملية لإزالة أو لتجاوز الإندساد.

● وجدت لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في الدورة الدموية

(مرض في الشرايين المحيطية).

● كنت في الثلث الثالث من الحمل.

● كنت في فترة الإرضاع.

● كنت تعاني من بزل مجهود غير مجدي لإفراغ الأمعاء، إسهال أو نزف

شرجي.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

#### قبل العلاج بـ أبيترن فتائل 50 ملغ، إكح للطبيب إذا:

● كنت تعاني من إضطرابات في المعدة أو الأمعاء، بما في ذلك الإلتهاب القولون

التقرحي (ulcerative colitis) أو مرض كرون (Crohn's disease).

● وجدت لديك مشاكل في الكلى أو الكبد، أو كنت أنت مسناً.

● كنت أنت تعاني من اليورفيريا (porphyria).

● كنت أنت تعاني من أية إضطراب في الدم أو من نزف. إذا كنت كذلك، فمن

الجانز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوص روتينية خلال فترة إستعمال

هذه الفتائل.

● وُجِدَ لديك ذات مرة ربو.

● وُجِدَ لديك نيجة صدرية، خثرات دموية، ضغط دم مرتفع، نسب أعلى

من الحد الطبيعي للشحوم في الدم (ارتفاع الكولسترول أو ارتفاع نسبة

الشحوم الثلاثية).

● لديك مشاكل في القلب، كانت لديك سكتة دماغية، أو كنت تعتقد بأنك

معرض لخطورة حدوث هذه الحالات (مثلاً، إذا وجد لديك ارتفاع في

ضغط الدم، سكري أو ارتفاع في الكولسترول أو كنت من المدخنين).

● لديك سكري.

● أنت من المدخنين.

● لديك مرض الذئبة (ذئبة إحصارية جهازية (SLE)) أو حالة مشابهة.

### تحذيرات خاصة إضافية

● عليك إستعمال المقدار الدوائي الأكثر إنخفاضاً من فتائل أبيترن 50 ملغ

للفترة الزمنية الممكنة الأقصر، خاصة إذا كنت تعاني من نقص في الوزن

أو كنت مسناً.

● مثل الأدوية الأخرى المشابهة - أبيترن، فإن أبيترن فتائل 50 ملغ قد

يزيد قليلاً من خطورة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. تكون الخطورة

أكبر إذا كنت تستعمل مقدارا دوائيا أكبر لفترة طويلة. دائماً يجب التقيد

بتعليمات الطبيب بالنسبة للمقدار الدوائي ولمدة العلاج.

● إذا شعرت في أي وقت خلال فترة إستعمال الدواء بعلامات أو بأعراض

لمشاكل في القلب أو في الأوعية الدموية، مثل ألم في الصدر، ضيق في

التنفس، ضعف أو صعوبة في النطق، إنبصل بطبيعي فوراً.

● خلال فترة إستعمالك - أبيترن فتائل 50 ملغ، من الجائز أن يوجهك

الطبيب لإجراء فحوص روتينية من حين لآخر.

● إذا وجدت لديك سابقة لمشاكل في المعدة عند إستعمالك لمضادات الإلتهاب لا ستيروئيدية (NSAIDs)، خاصة إذا كنت مسناً، عليك التبليغ للطبيب فوراً إذا لاحظت أعراض شاذة.

● بسبب كون هذا المستحضر مضاد للإلتهاب، فإن أبيترن فتائل 50 ملغ قد

يجب علامات لحدوث ثلوث مثل صداع وسخونة مرتفعة. إذا شعرت بسوء

وعلك التوجه للطبيب، تذكر التنويه بأنك تستعمل أبيترن فتائل 50 ملغ.

● قبل إستعمال أبيترن فتائل 50 ملغ، إكح لطبيبك إذا إجتزت مؤخرًا، أو

أنت مقبل على إجتياز عملية جراحية في البطن أو في الجهاز الهضمي،

لأنه أحياناً قد تعرقل الفتائل شفاء الجروح بعد عملية جراحية في الأمعاء.

### التداخلات بين الأدوية

● إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك

أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إكح للطبيب أو الصيدلي

عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

● مضادات العلاج السكري

● أدوية التخثر (أقراص لتميع الدم مثل وارفارين)

● مدرات للبول

● ليثيوم (لعلاج مشاكل نفسية معينة)

● ميتوتريكسات (لأمراض الإلتهابية معينة وأنواع سرطان معينة)

● سيكلوسبورين و تاكلوريموس (المستعملان لعلاج أمراض الإلتهابية معينة

و بعد زراعة أعضاء)

● تريمتوپريم (دواء لمنع حدوث ثلوثات في المسالك البولية أو لعلاجها)

● مضادات حيوية من نوع كوينولون (للثلوثات)

● أي دواء آخر من نوع NSAIDs (مضادات الإلتهاب لا ستيروئيدية) أو مثبطات

COX-2 (cyclo-oxygenase-2)، مثلاً أسبيرين أو إيبوبروفن

● ميفيبريستون (دواء يستعمل لإيقاف الحمل)

● الأليكلوزيدات القلبية (مثلاً ديجوكسين)، المستعملة لعلاج المشاكل القلبية

● أدوية تسمى SSRIs المستعملة لعلاج الإكتئاب (مثبطات إنتقائية لإعادة

إمتصاص السيروتونين)

● ستيرويدات بالإعطاء عن طريق الفم (دواء مضاد للإلتهاب)

● أدوية تستعمل لعلاج مشاكل قلبية أو ارتفاع ضغط الدم، مثلاً حاجبات

بيتا أو مثبطات ACE

● فوريكوزانول (دواء لعلاج الثلوثات الفطرية)

● فينيوتين (دواء لعلاج الإختلاجات)

● كوليستيول وكوليسيرامين (يستعملان لخفض الكولسترول)

### الحمل، الإرضاع والحساسية

#### الحمل

● يتوفر لهذا المستحضر عرض جانبي مُحتمل لضرر كلوي لدى الجنين وقلّة

أدوية تُستعمل لعلاج إبتداء من الأسبوع الـ 20 للحمل. يوصى بالإمتناع عن

إستعمال المستحضرات من فصيلة الـ NSAIDs إبتداء من الأسبوع الـ 20

للحمل وإستشارة فرد من الطاقم الطبي إذا دعت الحاجة.

● بُلغ عن حدوث تشوهات لدى الرضع الذين تناولت أمهاتهم خلال فترة

الحمل أدوية من فصيلة مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية (NSAIDs)

لكن ليس بشيوع مرتفع.

● لا يجوز إستعمال فتائل أبيترن 50 ملغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من

الحمل، لأن ذلك قد يؤثر على الدورة الدموية لدى الرضيع.

● هل أنت تخططين لحصول حمل؟ إن إستعمال فتائل أبيترن 50 ملغ قد يجعل

من الصعب حصول حمل. عليك إستشارة طبيبك إذا كنت تخططين لحصول

حمل أو إذا وجدت لديك صعوبات في حصول حمل.

#### الإرضاع

● بالمشابه للأدوية الأخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية

(NSAIDs)، فإن ديكوفيناك ينقل إلى حليب الأم. لذا، لا يجوز إستعمال

أبيترن فتائل خلال فترة الرضاعة.

### السياقة وإستعمال الماكينات

● من حين لآخر بعد متعالجون بأن فتائل ديكوفيناك صوديوم سببت لهم

الشعور بدوار، إرهاق أو غثاس. كما أنه بُلغ أيضاً عن مشاكل في الرؤية.

● إذا تأثرت على هذا النحو من إستعمال الدواء، فعليك الإمتناع عن السياقة

وعن إستعمال الماكينات.

### الإستعمال لدى الأطفال

● إن أبيترن فتائل 50 ملغ غير مناسب للإستعمال لدى الأطفال.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

● يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الفتيلة ولذلك يعتبر

خَالٍ من الصوديوم.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

● يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

● عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار

الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

● المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

● المقدار الدوائي الاعتيادي لدى الكبار عادة هو: فتيلتان في اليوم.

● في الحالات الشديدة، من الجائز أن يوصي الطبيب بعلاج مشترك مع

الأقراص. لا يجوز تجاوز مقدار دوائي يومي إجمالي قدره 150 ملغ من

ديكلوفيناك صوديوم.

#### المسنون

● من الجائز أن يوصيك الطبيب بإستعمال مقدار دوائي أخفض من المقدار

الدوائي الاعتيادي لدى الكبار. بالإضافة لذلك، من الجائز أن يرغب الطبيب

بالتأكد من أن فتائل أبيترن لا تؤثر سلباً على معدتك، بالأخص على إمتداد

الـ 4 أسابيع الأولى من إستعمال الفتائل.

● يجب إستعمال هذا الدواء في الأوقات المحددة كما حُدد من قبل الطبيب المعالج.

### لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

### طريقة الإستعمال

● لا يجوز البلع، الفتائل مخصصة للإدخال لفتحة الشرج (rectum).

● يوصى بإستعمال الفتائل بعد حدوث نشاط للأمعاء.

● يتبع

ملاحظة: إذا كانت الفتيلة رخوة بحيث لا يمكن إدخالها، بالإمكان تبريدها بالتخزين في البراد خلال نحو 30 دقيقة، أو بواسطة وضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع الغلاف.

كيفية إدخال الفتيلة:

1. أولاً، اغسل يديك جيداً.
2. إنزع الغلاف عن الفتيلة. بالإمكان ترطيب الفتيلة بالماء لتسهيل الإدخال.
3. استلق على جانبك وأدخل الفتيلة بلطف عميقاً لداخل فتحة الشرج بواسطة الأصبع.
4. اغسل يديك جيداً بعد إدخال الفتيلة.

#### فحوص ومراقبة

خلال فترة العلاج المطول بالدواء، أو في العلاج الذي يلزم استعمال مقادير دوائية عالية، يجب إجراء فحوص دم، بول ووظائف الكبد والكلية، من الجائز حدوث ارتفاع بانزيمات الكبد، الذي يلزم إيقاف العلاج بعد استشارة الطبيب (أنظر الفقرة 4- "الأعراض الجانبية")

إذا كنت تعاني من مرض قلبي موجود أو من أخطار هامة لحدوث مرض قلبي، يقيم طبيبك من جديد ومن حين لآخر فيما إذا كان عليك مواصلة العلاج بالدواء، خاصة إذا كنت تتعالج لفترة تزيد عن أربعة أسابيع.

#### إذا نسبت استعمال الدواء

إذا نسبت استعمال هذا الدواء في الوقت المخصص، فيجب استعمال مقدار دوائي حال تذكرك بذلك، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال مقاديرين دوائيين سوية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

#### إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفلاً بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال أبيترون فنتال 50 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندثر من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها. بالإمكان تقليل الأعراض الجانبية بواسطة استعمال المقارن الدوائي الناجع الأكثر إنخفاضاً للمدة الزمنية اللازمة الأقصر.

#### بعض الأعراض الجانبية يمكن أن تكون جديّة

يجب التوقف عن العلاج والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال ظهور:

- ألم مفاجئ وحاد في الصدر (علامات لإحتماء عضلة القلب أو لنوبة قلبية).
- ضيق في التنفس، صعوبة التنفس في حالة الإستلقاء، إنتفاخ الرجلين أو القدمين (علامات لقصور القلب).

صعاب مفاجئ أو تنمل في الوجه، اليد أو في الرجل، خاصة في جانب واحد من الجسم، فقدان مفاجئ أو جزئي للرؤية، صعوبة مفاجئة في التكلم أو فهم الكلام، صداع مفاجئ من نوع شقيقة الذي يحدث لأول مرة، مع أو بدون إضطراب في الرؤية. هذه العلامات يمكن أن تكون علامة مبكرة لحدوث سكتة.

• ألم في البطن، إضطرابات في الهضم، حرقان، غازات، غثيان أو تقيؤ.

• أية علامة لنزف في المعدة أو في الأمعاء، مثلاً، خلال إفراغ الأمعاء، دم في البراز أو سود.

• ردود فعل تحسسية التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، كدمات، مناطق حمراء مؤلمة، تقشر أو حيوصلات.

• صغير أو ضيق في التنفس (تشنج للقصبات الهوائية).

• إنتفاخ في الوجه، الشفتين، اليدين أو الأصابع.

• تورور الوجه أو بياض العينين.

• ألم متواصل في الحنجرة أو سخونة مرتفعة.

• تغير غير متوقع في كمية البول و/أو مظهره.

• تقلص طفيف وحساسية البطن، الذي يبدأ بعد وقت قصير من بدء العلاج

بقتال، ديكوليفيك، وبعد ذلك نزف شرجي أو إسهال دموي، عادة خلال 24 ساعة من بدء ألم البطن.

• ألم في الصدر، الذي يمكن أن يكون علامة لرد فعل تحسسي جدي يسمى متلازمة كونييس (Kounis syndrome).

• أعراض التهاب السحايا الدماغية مثل: صداع شديد، تصلب الرقبة، تصلب العضلات، غثيان وتقيؤات حادة ومستمرة والألم في العمود الفقري (نادر).

إذا لاحظت بأنه تظهر لديك كدمات بسهولة أكبر من المعتاد أو لديك آلام في الحنجرة أو تلوّثات متكررة، توجه لطبيبك.

أحياناً قد تسبب فنتال أبيترون حكة أو حرقة في فتحة الشرج أو تؤدي إلى تقادم البواسير.

#### أعراض جانبية إضافية بلغ عنها:

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على ما بين 1 إلى 10 من كل 100 متعالج):

• ألم في البطن، حرقان، غثيان، تقيؤ، إسهال، إضطرابات في الهضم، غازات، فقدان الشهية للطعام

• صداع، دوار، قيرتيفو

• طفح جلدي أو بقع جلدية

• نسب مرتفعة لإنزيمات الكبد في الدم

• تهيج في مكان إدخال الفتيلة

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على ما بين 1 إلى 10 من كل 1,000 متعالج):

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، ألم في الصدر، مشاكل في القلب، بما في ذلك نوبة قلبية أو ضيق في التنفس، صعوبة التنفس خلال وضعية الإستلقاء،

أو إنتفاخ الرجلين أو القدمين (علامات لقصور القلب)، خاصة إذا استعملت مقداراً دوائياً مرتفعاً (150 ملغ في اليوم) لفترة طويلة.

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على مستعمل واحد من بين 1,000 إلى بين مستعمل واحد من بين 10,000 متعالج):

• تقرحات معدية أو أنزفة (هناك بلاغات نادرة جدا عن حالات سببت الوفاة، خاصة لدى المسنين)

• التهاب المعدة (Gastritis) (التهاب، تهيج أو إنتفاخ مخاطية المعدة)

• تقيؤ دم

• إسهال يترافق بدم أو نزف من فتحة الشرج

• براز أسود

• نعاس، إرهاق

• طفح جلدي وحكة

• إحتساس سواثل (الأعراض تشمل إنتفاخ الكالحين)

• إضطرابات في الأداء الوظيفي الكبدي، بما في ذلك التهاب الكبد ويرقان

• ربو (الأعراض يمكن أن تشمل صغير، ضيق في التنفس، سعال وضغط على إمتداد الصدر)

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على أقل من 1 من كل 10,000 متعالج):

#### تأثيرات على الجهاز العصبي:

التهاب السحايا الدماغية (meningitis)، وخز أو خدر في الأصابع، إرتجاج، إضطرابات في الرؤية مثل تشوش أو ازدواج في الرؤية، تغيرات في مذاق، فقدان السمع أو تضمر السمع، طنين (رنين في الأذنين)، قلة النوم، كوابيس، تغيرات في المزاج، إكتئاب، قلق، عصبية، إضطرابات نفسية، تورمان وفقدان الذاكرة، إحتلاجات، صداع مع نفور من الضوء الساطعة، سخونة وتصلب الرقبة.

#### تأثيرات على المعدة والجهاز الهضمي:

إسهال، التهاب اللسان، تقرحات في الفم، التهاب الجزء الداخلي من الفم أو الشفتين، إضطرابات في القولون (بما في ذلك التهاب القولون، أو تقادم التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون)، التهاب البنكرياس.

#### تأثيرات على الصدر أو الدم:

فرط ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، إنخفاض ضغط الدم (الأعراض يمكن أن تشمل إغماء أو دوار)، التهاب الأوعية الدموية (vasculitis)، التهاب الرئتين، إضطرابات في الدم (بما في ذلك فقر الدم).

#### تأثيرات على الكبد أو الكلى:

إضطرابات في الكلى أو إضطرابات خطيرة في الكبد، بما في ذلك فشل كبدي، ظهور دم أو بروتين في البول.

#### تأثيرات على الجلد أو الشعر:

إنتفاخ الوجه، طفح جلدي خطير بما في ذلك متلازمة ستيفنس - جونسون، متلازمة لايل (Lyell's syndrome) وحالات طفح جلدي أخرى، التي قد تتفاقم عند التعرض لضوء الشمس. تساقط الشعر.

#### تأثيرات على الجهاز التناسلي:

عجز جنسي.

#### أعراض جانبية أخرى بلغ عنها بشيوع غير معروف تشمل:

إضطرابات في الحنجرة، إرتباك، هذيان، قلة راحة (شعور عام بالإنزعاج)، التهاب أعصاب العين، إضطرابات في الإحساس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التجميد يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (Expiry date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الإجراءات على الحفاظ على البيئة.

### 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

فنتال بلون أبيض - كريم.

علبة تحتوي على 10 أو 100 فتيلة.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تبلغ إسرائيل م.ض.

شارع دقوره منهقيته 124، تل أبيب 6944020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

015.72.24237

تم إعداد النشرة في آب 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتكوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

ABIT 50 SUPP PL SH 300921