

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب
أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كل أي دواء قد يؤدي إلى استعمال ميكرووليت لاعراض جانبية. لا تفزع من قائمة الاعراض الجانبية. من الممكن أن لا تتعارى مع أي واحد منها.

ان استعمال ميكرووليت عادة لا يسبب اعراضًا جانبية، لكن أحياناً قد يظهر تشنج طفيف في البطن.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا ثقاك أحد الاعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الاعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "https://www.torofra.gov.eg" أو الكتب "الطب والعلوم" الموجود في المكتبة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.eg) الموجه للاستمارة الالكترونية للتبلغ عن اعراض جانبية أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.eg>

5. كيفية تخزين الماء؟

- تحتوى هذه الدواء وكل دواء آخر فى مكان مغلق بعيداً من متداول أيدي الأطفال وأى الرضع ومحال نظرهم وبذلك تمنع التسمم.
- لا يسبب التلوّن دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد过ارث انتهاء الصلاحية (EXP) (الذى يظهر على غالبية تاريف انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر).
- شروط التخزين: حزن تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التناول من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو الفيارات المنزلية. إسال الصيدلى عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركيبات الفعالة يحتوى الدواء أيضًا على:

Sorbitol, water, potassium sorbate

كيف يبدو الدواء وهو محتوى العبوة:
سائل شفاف في أنبوبة بلاستيكية من 5 مل.
احجام العبوات المصادق عليها: 12, 100 أو 500 أنبوبة في العبوة.
قد لا تكون جميع احجام العبوات مموزفة.

تم التقديم في أي 2021 حسب تعليمات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
047-20-23432-03

للتوضيح وتسيير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.
بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الحمل والإرضاع

يمكن استعمال ميكرووليت بشكل آمن في فترة الحمل، قبل الولادة وفي فترة الإرضاع، لكن كما في كل دواء، استشيري الطبيب قبل الاستعمال.

معلومات مهمة عن جزء من مرکبات الدواء
يحتوي ميكرووليت على سوربات الذي قد يسبب تهيج موضعى في الجلد على سبيل المثال التهاب الجلد التماقسي.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً بالخصوصية الطبية وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الإعتمادية بشكل عام هي: لدى البالغين والأطفال من جيل 6 سنوات وما فوق: أنيبوبية واحدة

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
لا يجوز تناول هذا الدواء مخصص لاستعمال الخارجي فقط.

تعليمات الفتح:

يجب تدوير اللسان الموجود في طرف الفوهة ومن ثم سحبه حتى يتمزق اللسان.

طريقة الاستعمال:

يجب ترتيب الفوهة بالقليل من المادة. يوصى بالإستفادة على الجالب والركبتين من متصفحين بالطن أو الجلوس على كرسى المراحاض، ومن ثم إدخال الفوهة بكمالها بلطف فتحة الشرج وحصر الأنفوبية حتى تفريغ. يجب الاستمرار بالعصير أثناء إخراج الفوهة من فتحة الشرج، تجنباً لإعادة سحب المادة.

لدى الأطفال:

يجب إدخال الفوهة حتى نصف طولها فقط لداخل فتحة الشرج. لا يجوز إدخال الفوهة في حال وجود مقاومة أثناء الإدخال.

يجب استعمال الدواء فوراً من لحظة فتح الأنفوبية، إذا كانت هناك بقايا، يجب التخلص منها.

يعلم ميكرووليت عادة خلال 15 حتى 60 دقيقة. يوصى بالبقاء قرابة من المراحاض بعد استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال ميكرووليت في أوقات متقاربة أو أكثر من أسبوع بشكل متواصل بدون استشارة الطبيب.

لا يسبب ميكرووليت في أوقات متقاربة أو أكثر من أسبوع بشكل متواصل بدون استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال ميكرووليت بغير تبرير مرتقب للغاية ولفتره طويلة، قد يسبب حساسية في نجاح الملاجء.

يجب حرص على شرب سوائل خلال اليوم (6-8 كوب) للتغذية والشراب.

يتساعد في تلين البراز نظام غذائي غنى بالالياف ومارسة الرياضة البدنية.

إذا استعملت أكثر مما تحتاج من ميكرووليت

إن استعمال ميكرووليت بشكل مفرط قد يسبب الإسهال وفقدان سوائل. إن حدث هذا، اخذ دهوناً أدوية أخرى بما

إن استعمال ميكرووليت تبريره من فتحة الشرج ولفتره طويلة قد يسبب تهيج فتحة الشرج وقد يقل من امتصاص الفيتامينات من الطعام.

لا يجوز تناول الأدوية في النهار! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت

بحاجة إليها.

ميكرووليت، حفنة شرجية

0.625 g (Glycerol)
سيترات الصوديوم (Sodium citrate) 0.450 g (Sodium laurylsulphacetate) 0.045 g (Sodium

مواد غير فعالة ومسبيات الحساسية (ستارج)، في الدواء - انظر للنذر 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مرکبات الدواء".

اقرأ النشرة يامعan حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلنة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

علىك استعمال الدواء حسب تعليمات في بند 3 "كيفية استعمال الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا ثقاك أحد الاعراض جانبية على الطبيب إلى توجيهه إلى الدواء. يرجى بحاجة ل المعلومات اضافية. عليك استشارة الطبيب إذا ثقاك أحد الاعراض المرض أو لم تتحسن بعد عدة أيام.

1. لأى غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الإمساك.
الفصيلة العلاجية: مشهد

ميكرووليت يعمل عن طريق تلين البراز بواسطة امتصاص الماء للأمعاء.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجو) للمواد الفعالة (جليسيرول، سيترات الصوديوم، لوريول، سلفو سليفات الصوديوم) أو لأى واحد من المركيبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للنذر 6).
- كنت تعاني من مرض اعاء التهابي مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.
- عانيت في مرة من المرات ومن وضع شديد من مشكل في الأمعاء أو عدم راحة في المعدة (عدا عن الإمساك).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ ميكرووليت، أخذ الطبيب إذا:

- كنت بحاجة لمكالمات الفيتامينات لأى سبب كان.
- كنت تستعمل ميكرووليت بغير تبرير مرتقب للغاية ولفتره طويلة، قد يسبب حساسية في نجاح الملاجء.

او الصيدلي بذلك، على وجه الخصوص إذا كنت تأخذ هذا، يجب إيقاف استعمال الدواء واستشارة الطبيب.

لا يضر بامتصاص فيتامينات معينة في جسمك.

تفاعلات بين الأدوية إذا كنت تأخذ، أو إذا كنت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما

في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، أخذ الطبيب.

• مكملات الفيتامينات، لأن استعمال ميكرووليت بشكل متواصل قد

المنتج وصاحب التسجيل
دكسل م.ص.

شارع دكسل 1، أور عكينا 3060000، إسرائيل