

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## מיקרוולט® חוקן

כל שפופרת של 5 מ"ל מילה:

גליצירול (Glycerol) 0.625 g

סודיום ציטראט (Sodium citrate) 0.450 g

סודיום לאורילסולפואצט

(Sodium laurylsulphoacetate) 0.045 g

חומרים בלתי אורגניים בתרופה –

ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את שופר של סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלך להשתמש בתרופה על פי ההוראות

בסעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה" בעלון זה.

היוועה ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עלך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (ספטומים) מתחמרים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת עצירות.

**קבוצה תרפויטית:** משלשל

**מיקרוולט** פועלת על ידי ריכוך הצואה באמצעות

ספיגת מים למעי.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (גליצירול, סודיום ציטראט, סודיום לאורילסולפואצט) או לכל אחד מהמרכיבים הנספחים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה סובל ממחלה עם דלקתית כגון, דלקת כיבית של המעי הגס או מחלת קרוחן.
- או פעם סבלת ממצב חרוץ של בעיות במעי או אי נוחות קיבה (מלבד עצירות).

אזהרות וחידוה הנוגעות לשימוש בתרופה

**לפני הטיפול במיקרוולט, ספר לרופא אם:**

• אתה זקוק לתוספי ויטמינים מסביבה כלשהי.

• אתה משתמש במיקרוולט בתדירות גבוהה מדי ולמשך תקופה ארוכה, זה עלול לגרום לשלשול

ואיבוד נוזלים. אם זה קורה, יש להפסיק את השימוש בתרופה וליוועץ ברופא.

שימוש משופר עלול לגרום לתלות במשלשלים.

**תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או ייתכן להקת לאחרונה,**

**תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

במידוח אם אתה לוקח:

• תוספי ויטמינים, מאחר ששימוש ממושך במיקרוולט עלול לפגוע בספיגת ויטמינים מסוימים באופן.

**היריון והנקה**

ניתן להשתמש במיקרוולט בבטחה בזמן

היריון. לפני לידה ובזמן הנקה, אולם כמו בכל תרופה, היוועץ ברופא טרם השימוש.

**עלך חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה מיקרוולט** מכילה סורבאט עלול לגרום לגירוי מקומי בעור (לדוגמה דלקת עור במגע).

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

במבוגרים וילדים מגיל 6 ומעלה: שפופרת אחת בעת הצורך.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אין לבלוע** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

### הוראות פתיחה:

יש לטובב את הלשונות שבצקה הפייה ולמשוך עד שהלשונות יתקרעו.

### אופן השימוש:

יש להרטיב את הפייה עם מעט מן החומר.

מומלץ לשכב על הצד בכריכים צמודות לבטן או לשבת על הסמלה, להדיר בעדינות את הפייה כולה על הטבעות ולסוחט את השפופרת עד שתתרוקן. יש להמשיך ולסוחט בתדירות

הפייה מפי הטבעת, למינת שאיבה חוזרת

של החומר.

### בידלים:

יש להחזיר את הפייה רק עד למחצית אורכה לתוך הטבעת. אין להשתמש במקרה

זה של התנגדות בהחדרה.

יש להשתמש בתרופה מייד מרגע פתיחת השפופרת. אם נותרה שארית, יש להשליך אותה.

**מיקרוולט** פועלת בדרך כלל על 15 עד 60 דקות. מומלץ להישאר בקרבת השירותים

לאחר השימוש בתרופה.

אין להשתמש במיקרוולט לעיתים קרובות או מכבד לשבוע בקרפיות בלי היוועץ ברופא.

### עיצוב תכולת לייטעו להצלת טיפול?

יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך היום (8-8 כוסות) שתעזור בריכוך הצואה, דיאטה עשירה בסיבים ופעילות גופנית.

**אם השתמשת ביותר מיקרוולט ממה שאתה צריך**

• שימוש יתר במיקרוולט עלול לגרום לשלשול ואיבוד נוזלים. אם זה קורה, ספר לרופא.

• שימוש במיקרוולט בתדירות גבוהה מדי

למשך תקופה ארוכה עלול לגרום לגירוי של פי הטבעת ויכול להפחית את הספיגה של ויטמינים מהמזון.

אין ליטול תרופות בחושרך בדוק הותווית

והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הוראת

מספייים אם אתה זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במיקרוולט עלול לגרום לתופעות לוואי. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות

הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

השימוש במיקרוולט בדרך כלל לא גורם לתופעות

לוואי, אך לעיתים עשויה להופיע התכווצות קלה בבטן.

**אם אחת מתופעות הלוואי החמירה או כאשר אתה סובל מתופעת**

**לוואי שלא צויה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדיווח על תופעות לוואי ממשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות

לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית

לואי אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כיסיה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. אור לאחסן את התרופה?

מגע הערלה: תרופה זו וכל תופעה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח

ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך

תמנע הערלה. את הנגרות להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התאריך

הפגרה (EXP). המופיע על גבי האריזה. הפתירה

התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי אחסון:** אחסן מתחת ל-25°C.

• אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה

ובתי. ישלך את הרוקח או להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן

על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:**

Sorbitol, water, potassium sorbate

**כיצד נראית התרופה ממה תוכן האריזה:**

נוזל שקוף בשפופרת פלסטיק של 5 מ"ל.

גודלי אריזות מאושרים: 12, 100 או 500

שפופרת אריזה. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקקים.

נערך באוגוסט 2021 בהתאם להחיות משדר הבריאות.

**מספר ירשום התרופה פננס התרופות**

**ממלכתי ממשרד הבריאות:**

047-20-23432-03

לשם הפישוט ולהקלת ההקלה, עלון זה

נוסח בלשון זכר. על קרא זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**יצרן ובעל רישום:**

**דקסל כ"מ**

רח' דקל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל