نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

سينچولير 4 ملغ
حبيبات للصغار

كل كيس من الحبيبات يحتوي على:
Montelukast 4 mg (as sodium salt)

سينچولير 4 ملغ
أقراص للمضغ لأطفال الروضة

كل قرص للمضغ يحتوي على:
Montelukast 4 mg (as sodium salt)

سينچولير 5 ملغ
أقراص للمضغ

كل قرص للمضغ يحتوي على:
Montelukast 5 mg (as sodium salt)

سينچولير 10 ملغ
أقراص

كل قرص يحتوي على:
Montelukast 10 mg (as sodium salt)

لقائمة المواد غير الفعّالة, أنظر للبند 6.

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.
- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن **سينچولير**. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, إسأل الطبيب أو الصيدليّ الخاص بك.
- هذا الدواء وصف للعلاج لأجلك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل.

1. ما هو سينچولير ولأيّ غرض يستعمل؟
1.1 ما هو سينچولير؟
الفصيلة العلاجية: سينچولير هو مضاد انتقائي لمستقبلات ليوكوتريئين.
سينچولير يعمل بواسطة حصر المستقبلات في الجهاز التنفسي لمواد تدعى لويكوتريئين, التي تسبب تَضَيُّق قَصَبِيّ وتورم في المسالك التنفسية. كما ويسبب اللويكوتريئين أعراض تحسس.
1.2 لأيّ غرض يستعمل سينچولير؟
سينچولير مستطب لعلاج الربو المزمن, بما في ذلك الوقاية من أعراض المرض في النهار والليل, لعلاج مرضى الربو الحسّاسين للأسبرين والوقاية من التَضَيُّق القَصَبِيّ الناتج عن بذل جهد بدني لدى المرضى البالغين والأطفال من عمر 12 شهرًا وما فوق.
سينچولير مُستطب للتقليل من أعراض التهاب الأنف التحسّسي الموسمي لدى البالغين والأطفال ما فوق عمر سنتين.
ما هو الرَبْو؟
الرَبْو هو مرض رئة مزمن. لا يمكن شفاءه – فقط السيطرة عليه.
مميزات الرَبْو تشمل:
- مسالك تنفسية متضيّقة والتي تُصعّب التنفس. هذا التّضيق يتفاقم ويتحسن تجاوبًا إلى عدة حالات.
- مسالك تنفسية ملتهبة; بمعنى آخر, بطانة المسالك التنفسية تتورم.
- مسالك تنفسية حساسة والتي تتأثر بأشياء كثيرة, مثل دخان السجائر, حبوب اللقاح أو الهواء البارد.

أعراض الرَبْو تشمل:
سُعال, صفير (أزيز) وضغط في الصدر. ليس كل الأشخاص المصابين بالربو يصفرون. لدى البعض, قد يكون السُعال العرض الوحيد للرَبْو. تحدث الأعراض على الأغلب خلال الليل أو بعد نشاط بدنيّ.

ما هو الرَبْو الناتج عن نشاط بدنيّ؟
الرَبْو الناتج عن نشاط بدنيّ, وبدقة أكثر يسمى تضيّق قصبيّ (EIB – bronchoconstriction) يحصل عندما يثير النشاط البدنيّ أعراض الرَبْو.
ما هو التهاب الأنف التحسسي الموسمي؟
- التهاب الأنف التحسسي الموسمي (ويسمى أيضًا حُمى القش) يتم إثارته بواسطة مُستَأرِجين خارجيين مثل حبوب اللقاح التي تُحمل في الهواء والتي مصدرها من الأشجار, العشب الأخضر والحشائش.
- الأعراض اليومية والليلية لالتهاب الأنف التحسسي الموسمي غالبًا ما تشمل:
  - انسداد الأنف, سيلان الأنفة وحكة في الأنف.
  - عطاس.
  - عيون دامعة, متورمة, حمراء, بها حكة.

2. قبل تناول سينچولير
2.1 لا تتناول سينچولير إذا كنت:
حساس (أرجي) للمادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال سينچولير
قبل استعمال سينچولير أخبر الطبيب:
- عن جميع المشاكل الطبية أو الحساسيات التي لديك أو لدى طفلك الآن أو كانت لديكما في الماضي ومن ضمنها حساسية للأسپيرين.

- إذا كنت حساسًا لطعام ما أو دواء ما.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد.
- إذا كنت حامل, تخططين للدخول في الحمل أو مرضعة.

تحذيرات إضافية:

- إذا تفاقمت أعراض الربو الخاصة بك أو الخاصة بطفلك, عليك الاتصال بطبيبك بشكل فوري.
- المستحضر غير مخصص لعلاج النوبات الحادة من الربو; في هذه الحالات, يجب إتباع التعليمات التي أعطاها لك طبيبك لهذه الحالات. إحرّص دائمًا بأن تحمل معك مستنشقات الأدوية التي أمرك الطبيب بأن تتناولها وقت نوبة حادة.
- أحيانًا نادرة, يختبر المرضى الذين يتناولون **سينچولير** وضع مركب من عدة أعراض التي لا تنقضي أو حتى تتفاقم. هذه الأعراض قد تشمل:
  - مرض شبيه بالأنفلونزا
  - طفح جلدي
  - شعور بوخز إبر ودبابيس, أو عدم الإحساس في اليدين أو الرجلين
  - صعوبات تنفس
  - الْتِهاب حادّ (ألم وتورم) في الجيوب الأنفية

  هذه الأعراض ظهرت بشكل عام, ولكن ليس دائما, لدى المرضى الذين تناولوا أقراص كورتيكوستيروئيدية فموية لعلاج مرض الرَبْو, عندما تم تقليل تناولها ببطء أو تم توقيفها. بالرغم من أنه لم يثبت أن **سينچولير** يؤدي إلى هذا الوضع, عليك إعلام الطبيب فورًا في حالة وتطور لديك واحدة أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه.
- تمّ التبليغ عن تغييرات في السلوك والمزاج لدى المرضى الذين يتناولون **سينچولير**. إذا كنت أنت أو طفلك تختبران مثل هذه التغييرات أثناء تناول **سينچولير** (أنظر بند 4, "الأعراض الجانبية المحتملة"), أخبر طبيبك عن ذلك.

2.3 تناول أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى, بما في ذلك الأدوية التي تباع بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية, أو إذا أنهيت للتو العلاج بدواء آخر, فيجب عليك إعلام الطبيب المعالج عن ذلك أو الصيدلي بهدف تفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين الأدوية.

على وجه الخصوص, أعلم طبيبك إذا كنت تتناول: أدوية مضادة للرَبْو مثل مُوَسِّعات القَصَبِيّات والستيروئيدات بالاستنشاق أو المتناولة عن طريق الفم.

2.4 تناول سينچولير مع الطعام والشراب

يمكن تناول **سينچولير** مع أو بدون الطعام.

2.5 الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج: إذا كنت حاملاً, تخططين الحمل, أو مرضعة.

2.6 الاستعمال لدى الأطفال

لم يتم إقرار سلامة ونجاعة **سينچولير** لدى الأطفال دون سن 12 شهر.

لقد أظهرت الأبحاث بأن **سينچولير** لا يؤثر على معدل النمو لدى الأطفال.

2.7 القيادة واستعمال الماكينات

سينچولير من غير المتوقع بأن يؤثر على قدرتك على قيادة المركبة أو تشغيل الماكينات. بالإضافة إلى ذلك, أشخاص مختلفون يتجاوبون بشكل مختلف للأدوية. أعراض جانبية معينة (كالدوار والنعاس), التي تم التبليغ عنها بفترات نادرة جدًا مع استخدام **سينچولير**, قد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الماكينات الخطرة لدى أشخاص معينون.

2.8 معلومات هامة فيما يتعلق بجزء من المركبات في سينچولير

سينچولير 10 ملغ أقراص مغلفة تحتوي على لاكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, قم بالاتصال بطبيبك قبل تناول هذا الدواء (أنظر بند 6).

إذا كان طفلك يعاني من بِيلَةُ الفينيل كيتون (اضطراب وراثي نادر في الأيض), عليك المعرفة بأن جميع أقراص المضغ من 5 ملغ وأقراص المضغ من 4 ملغ تحتوي على أسپارتام, والذي هو مصدر للفينيل آلانين (أنظر بند 6).

3. كيف تستعمل سينچولير؟

يجب دائمًا تناول **سينچولير** بالضبط بحسب ما قال لك الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة وطريقة العلاج تُحددان حسب تعليمات الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية هي:

البالغون والمراهقون ما فوق عمر 15 سنة لعلاج الربو و/أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي: قرص واحد من 10 ملغ في اليوم.

الأطفال من عمر 6 حتى 14 سنة لعلاج الربو و/أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي: قرص واحد للمضغ من 5 ملغ في اليوم.

الأطفال من عمر 2 حتى 5 سنوات لعلاج الربو أو التهاب الأنف التحسسي: قرص واحد للمضغ من 4 ملغ في اليوم أو كيس حُبيبات فموية واحد من 4 ملغ في اليوم.

الأطفال من عمر 12 شهرًا حتى سنتين لعلاج الربو: كيس واحد من 4 ملغ حُبيبات فموية في اليوم للتناول عن طريق الفم في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول **سينچولير** مرة في اليوم مع أو بدون طعام, وفقًا لتعليمات الطبيب.

لعلاج الربو, يجب أخذ **سينچولير** مرة في اليوم, في المساء.

لمعالجة التهاب الأنف التحسّسي الموسمي, يجب أخذ **سينچولير** مرة في اليوم وفقًا لتعليمات الطبيب.

إحرص دائمًا بأن تكون أدوية الاستنشاق الخاصة بك المخصصة لنوبة ربو حادة في متناول اليد. لا يجوز أخذ جرعة إضافية من **سينچولير** خلال أقل من 24 ساعة من الجرعة السابقة.

سينچولير أقراص للمضغ غير مُخصصة للأطفال دون عمر سنتين.

كيفيّة الاستعمال:

سينچولير 10 ملغ أقراص

لا يجوز المضغ! يجب بلع القرص مع القليل من الماء, دون علاقة للوجبات.

سينچولير 4 ملغ و- 5 ملغ أقراص للمضغ

يجب مضغ القرص قبل بلعه, دون علاقة للوجبات.
سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار
لا يجوز فتح الكيس إلى أن يحين وقت استعماله.
يمكن إعطاء **سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار**:

- مباشرة للفم;
- مُذاب بملعقة صغيرة (5 ملل) من الغذاء البديل لحليب الأم بارد أو بدرجة حرارة الغرفة أو بحليب الأم;
- مخلوط مع ملعقة كبيرة مليئة بالطعام الرخو البارد أو بدرجة حرارة الغرفة (على سبيل المثال: مهروس التفاح, أرُز أو بوظة).

- إخلط كل محتوى **سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار** مع ملعقة كبيرة مليئة بالطعام الرخو البارد أو بدرجة حرارة الغرفة, أو بملعقة صغيرة واحدة من الغذاء البديل لحليب الأم بارد أو بدرجة حرارة الغرفة أو حليب الأم, مع الانتباه إلى أن كل الجرعة مخلوطة بالطعام, بالغذاء البديل لحليب الأم, أو بحليب الأم.
- يجب التأكد على أن يحصل الطفل على الملعقة التي تحتوي على **سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار** المخلوطة بالطعام, بالغذاء البديل لحليب الأم, أو بحليب الأم بكاملها فورًا (خلال 15 دقيقة). هامّ: لا يجوز حفظ **سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار** المخلوطة بالطعام, بالغذاء البديل لحليب الأم, أو بحليب الأم للاستعمال في وقت لاحق.

سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار غير مخصص للإذابة بسائل ما, باستثناء الغذاء البديل لحليب الأم أو حليب الأم. ومع ذلك, يمكن لطفلك أن يشرب السوائل بعد بلعه **لسينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار**.
إذا أفرطت بتناول سينچولير
إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع طفل من الدواء بالخطأ, توجه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء معك.
لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
إذا نسيت تناول سينچولير
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد, لا يجوز تناول الجرعة المنسية فور تذكرك. يجب الاستمرار بالجدول الزمني الاعتيادي بحسب ما أمرك الطبيب المُعالج. لا يجوز تناول جرعة مُضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسيّة.
كيف يمكنك المساهمة بنجاح العلاج؟
يجب عليك إكمال العلاج بأكمله حسبما أوصى به الطبيب.
حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية أو على حالة طفلك الصحية, أو إذا أنت أو طفلك تمرون بنوبة ربو, لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء أو تغيير موعد تناوله دون استشارة طبيب.
لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من الملصق ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
يجب تفادي, بقدر المستطاع, التماس مع عوامل التي من شأنها التسبب بنوبة ربو, مثل التدخين, عثة الغبار, عفن, غبار الطلع (اللقاح), الحيوانات, تقلبات الطقس, التعرض لهواء بارد.
إذا كان لديك ربو وأسپيرين يفاقم أعراض الربو الخاص بك, واصل الامتناع عن تناول الأسپيرين أو أدوية أخرى التي تُدعى مُضادات التهاب لا ستريؤدية (NSAIDs) وقت تناول **سينچولير**.
إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء, إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

ككل أيّ دواء, قد يسبب استعمال **سينچولير** أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين.
لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة, من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.
يجب التوجه فورًا إلى الطبيب في حال ظهرت لديك أو لدى طفلك الأعراض الجانبية التالية خلال استعمال سينچولير:

- تغيرات المرتبطة بالسلوك والمزاج, [عدم الهدوء (التهيج) بما في ذلك سلوك عنيف أو عُدواني, اكتئاب, توهان, اضطرابات إصغاء, أحلام سيئة أو ملموسة, شعور بالهلع (قلق), هلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة), أرق, انفعالية (غضب), ضعف في الذاكرة, عدم راحة, السير خلال النوم, أفكار وأعمال انتحارية (بما في ذلك انتحار), رجفة].
- ارتفاع في خلايا دم بيضاء معينة (الخلايا يوزينِيَّة) ويُحتمل التهاب في الأوعية الدموية في كل الجسم (التهاب وعائي مجموعي). أعراض هذه الحالات قد تشمل: مرض شبيه بالزكام, طفح جلدي, شعور بوخز إبر ودبابيس أو عدم الإحساس في اليدين أو الرجلين والتِهاب حادّ (ألم وتورم) في الجيوب الأنفية.
  هذه الأعراض الجانبية قد تحدث في أحيان نادرة لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو والذين يتناولون **سينچولير** أو لدى أشخاص الذين يتناولون بالإضافة إلى ذلك ستيروئيدات عن طريق الفم, خلال تخفيض جرعة الستيروئيدات أو عند إيقافها.

سينچولير بشكل عام يُحتمل جيدًا. في الأبحاث, الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم التبليغ عنها كانت:

- تلوث في المسالك التنفسية العليا
- سخونة
- ألم رأس
- ألم حلق
- سُعال
- ألم في البطن
- إسهال
- آلام أو تلوث في الأذنين
- إنفلونزا
- رشح
- تلوث في الجيوب الأنفية

بالإضافة, تم التبليغ أيضًا عن الأعراض الجانبية التالية:

- قابلية متزايدة للنزيف, تعداد منخفض للصفيحات في الدم
- أعراض تحسسية [بما في ذلك تورم الوجه, الشفتين, اللسان و/أو الحلق (التي قد تسبب صعوبة في التنفس و/أو في البلع), شرى, طفح جلدي وحكة]
- دُوار, نعاس, شعور بوخز إبر ودبابيس/انعدام الإحساس, أحيانًا نادرة تشنجات
- خفقان القلب
- نزيف من الأنف; إحتقان في الأنف, تورم (التهاب) في الرئتين
- حرقة, إسهال, اضطرابات في الهضم, غثيان, تقيؤ
- إلتهاب في الكبد
- كدمات, طفح جلدي, تفاعلات جلدية وخيمة (حُمامَى عَديدَة الأَشْكال) والتي يمكن أن تحدث بشكل فجائي
- ألم في المفاصل, آلام في العضلات وتقلصات في العضلات
- تبوّل لا إرادي في الليل لدى الأطفال
- وهن/ إرهاق
- تورم

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الاعراض الجانبية أو إذا لاحظت أي عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة, عليك استشارة الطبيب.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

أنظر الأعراض الجانبية الخاصة والتفاعلات بين الأدوية المُفصلة أعلاه.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (**www.health.gov.il**) الذي يوجهك إلى النموذج الإنترنتي للتبليغ عن أعراض جانبية, أو عن طريق الدخول للرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفيّة تخزين سينچولير؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز استعمال **سينچولير** بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر المذكور.

شروط التخزين:

سينچولير 4 ملغ حُبيبات للصغار: يجب تخزينه بالعبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية. يجب استعماله خلال 15 دقيقة من بعد فتحه.

سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ: يجب تخزينه بالعبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة, يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ: يجب التخزين تحت 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية لوقايته من الضوء والرطوبة.

سينچولير 10 ملغ أقراص: يجب التخزين تحت 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية لوقايته من الضوء والرطوبة.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

6. معلومات إضافية

6.1 على ماذا يحتوي سينچولير؟

المادة الفعالة هي montelukast.

المركبات الأخرى هي:

كل قرص مغلف من 10 ملغ يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

الطلاء مركب من:

Hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, red ferric oxide, yellow ferric oxide, and carnauba wax.

كل قرص للمضغ من 4 ملغ و- 5 ملغ يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Mannitol, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, red ferric oxide, croscarmellose sodium, artificial cherry flavor, aspartame, and magnesium stearate.

كل كيس من 4 ملغ حُبيبات فموية يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Mannitol, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

إنتبه إلى أن الأقراص المغلفة من 10 ملغ تحتوي على لاكتوز. كل قرص من **سينچولير** 10 ملغ يحتوي على 89.3 ملغ لاكتوز أحادي الإماهة (مونوهيدرات).

إنتبه إلى أن الأقراص للمضغ من 4 ملغ و- 5 ملغ تحتوي على أسپارتام, والذي يشكل مصدرًا للفينيل آلانين.

كل قرص للمضغ من 4 ملغ يحتوي على 0.674 ملغ فينيل آلانين, وكل قرص للمضغ من 5 ملغ يحتوي على 0.842 ملغ فينيل آلانين.

6.2 كيف يبدو سينچولير ومحتوى العبوة

سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار هي حبيبات صلبة متجانسة التي تنزلق بسلاسة, بيضاء, خشنة, بدون وجود جزيئات خارجية.

سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ هي أقراص زهرية, بيضويّة, محدّبة من الجهتين, مع **سينچولير** مطبوع على وجه واحد و- MSD 711 في جانبها الثاني.
سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ هي أقراص زهرية, مستديرة, محدّبة من الجهتين مع **سينچولير** مطبوع على وجه واحد و- MSD 275 في جانبها الثاني.
سينچولير 10 ملغ أقراص هي أقراص مطليّة بلون البيج, على شكل مربع مستدير, مع **سينچولير** مطبوع على وجه واحد و- MSD 117 في جانبها الثاني.
حجم العبوات:
سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار: 7, 10, 28, 30 كيس في العبوة.
سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ: 7, 10, 28, 30 قرص للمضغ في العبوة.
سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ: 7, 10, 28, 30 قرص للمضغ في العبوة.
سينچولير 10 ملغ أقراص: 7, 10, 28, 30 قرص في العبوة.
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

صاحب التسجيل وعنوانه:
شركة ميرك, شارب ودوهم (إسرائيل – 1996) م.ض, ص.ب. 7121, پيتح- تكڤا 49170.

تمّ التنقيح في تشرين الأول 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار: 130.14.30912
سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ لأطفال الروضة: 121.67.30155
سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ: 109.90.29316
سينچولير 10 ملغ أقراص: 109.91.29317

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.