

- غثيان
- تعب وضعف
- انخفاض الشهية
- قروح في الفم
- تقيؤ
- انخفاض الوزن
- تساقط الشعر
- التهاب الفم (التهاب الأغشية المخاطية في الفم، بما في ذلك قلاع (aphtha) وقروح فموية)
- عسر الهضم
- التهاب الأغشية المخاطية
- وذمة محيطية
- حرارة مرتفعة
- جفاف الأغشية المخاطية (يشتمل على جفاف الفم، جفاف المهبل والفرج)
- اضطرابات في حاسة التذوق (بما في ذلك فقدان حاسة التذوق وانخفاض الحساسية تجاه الأطعمة)
- صداع
- حكة
- جلد جاف

- تغييرات في بعض فحوصات الدم:

- مستويات مرتفعة من الإنزيمات التالية في الدم: ناقلة الببتيد جاما جلوتاميل، ناقلة أمين الألانين، ليباز
- مستوى كرياتينين مرتفع في الدم
- مستوى منخفض في الدم من اللفاويات، الصفائح الدموية، السكر، الهيموجلوبين و/أو الألبومين في الدم
- ارتفاع زمن الثرومبولاستين الجزئي (activated partial thromboplastin time - مؤشر لأداء تخثر الدم)
- انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم
- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
- انخفاض مستوى المغنسيوم في الدم

أعراض جانبية شائعة (common) (قد تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 100 مستعمل):
- التهاب في المسالك البولية

إذا ظهر أعراض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة أعلى من 30°C، يجب حمايته من الرطوبة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

نواة القرص:

Microcrystalline cellulose, mannitol, sodium starch glycolate, hypromellose, magnesium stearate
مادة الطلاء:

Hypromellose, iron oxide black, iron oxide red, titanium dioxide, macrogol 4000, talc

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

بيكريي 50 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص مستديرة لونها قرنفلي فاتح، وعليها الطباعة "L7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

بيكريي 150 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص بيضوية لونها أحمر فاتح، وعليها الطباعة "UL7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

بيكريي 200 ملغ أقراص مطليّة هي أقراص بيضوية لونها أحمر فاتح، وعليها الطباعة "YL7" في جانب واحد و - "NVR" في الجانب الآخر.

يسوق بيكريي كأقراص مطليّة في لويحات. بيكريي متوفر في الأحجام التالية:

• عبوات مدمجة تحتوي على أقراص مطليّة 50 ملغ و- 200 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 250 ملغ): عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 56 قرصاً مطلياً (28 قرصاً مقدارها 50 ملغ و- 28 قرصاً مقدارها 200 ملغ).

• عبوات تحتوي على أقراص مطليّة 150 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 300 ملغ): عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 56 قرصاً مطلياً.

• عبوات تحتوي على أقراص مطليّة 200 ملغ (للمعالجين الذين يتناولون جرعة يومية مقدارها 200 ملغ): عبوات تحتوي على كمية تكفي لمدة 28 يوماً: 28 قرصاً مطلياً.

قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحريرها في أيلول 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

بيكريي 50 ملغ: 166-20-36150

بيكريي 150 ملغ: 166-18-36148

بيكريي 200 ملغ: 166-19-36149

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيّلها ورد النص بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.