

אמלודיפין טבע 5 מ"ג
טבליות

אמלודיפין טבע 10 מ"ג
טבליות

החומר הפעיל וכמותו:
כל טבליה מכילה:

אמלודיפין (כבזילאט) 5 מ"ג
Amlopidine (as besylate) 5 mg

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים: ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- לטיפול ביתר לחץ דם.
- לטיפול בתעוקת חזה יציבה כרונית.
- לטיפול בתעוקת חזה ואזופוסטיט (על שם פרינצמטל).

קבוצה תרפויטית:

חוסמי תעלות סידן (דהידרופירידינים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה כמפורט בפרק 6 או לחוסמי תעלות סידן אחרים. הרגישות יכולה להתבטא בגרד, אודם של העור או קושי בנשימה.
- יש לך לחץ דם נמוך (תת לחץ דם).
- יש לך היצרות של המסתם האאורטלי (היצרות אבי העורקים) או הלב (למב מבצב בו הלב שלך אינו מסוגל לספק מספיק דם לגוף).
- אתה סובל מאי ספיקות לב לאחר התקף לב.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באמלודיפין טבע ספר לרופא אם יש לך או היה לך אחד מהמצבים הבאים:

- התקף לב שארע לאחרונה.
- אי ספיקת לב.
- עלייה חמורה בלחץ הדם (משבר יתר לחץ דם).
- מחלת כבד.
- הינך מבוגר ויש צורך בהגדלת המינון.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל 6. שימוש בתרופה זו הינו למבוגרים וילדים מגיל 6 ועד גיל 17.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או לוקח את לקחת אחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אמלודיפין טבע יכול להשפיע על תרופות אחרות או להיות מושפע על ידי תרופות אחרות, כגון:

- סימסטטין (תרופה להורדת כולסטרול)
- איטראקאנזול, קטקונאזול (טיפול בפטרת)
- אידינאטור, נלפינאטור, טינטינוור (הנקרים מעכבי פרוטאז, לטיפול באיידס)
- ריפאמפיצין, אריתרומיצין, קלריתרומיצין (אנטיביוטיקות)
- הפיריקום פרופרטום (St. John's wort)
- דילתiazem, ורפמיל (תרופות לב)
- דנטרולן (אינפוזיה להפרעות חמורות בטמפרטורת הגוף)
- ציקלוספורין (מדכא מערכת החיסון)
- טקוליומס, סטרילומס, סטרילומס ואורזולמוס (תרופות המדכאות את מערכת החיסון לאחר השתלה)

אמלודיפין טבע עלול להוריד את לחץ הדם שלך אף יותר במקרה שאתה כבר נוטל תרופות אחרות לטיפול ביתר לחץ הדם.

שימוש בתרופה ומזון

השימוש בתרופה עם או בלי אוכל. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. בזמן הטיפול בתרופה אין לאכול אשכוליות או לשות מים אשכוליות - מכיוון שהשילוב עלול להעלות את רמת החומר הפעיל אמלודיפין, מה שיכול לגרום להגברה לא צפויה של אפקט הורדת לחץ הדם של התרופה.

היריון הנקה ופוריות

היריון
בטיחות אמלודיפין בנשים הרות טרם נקבעה. אם את חושבת שהינך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, עליך לספר על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.

הנקה

נמצא כי אמלודיפין עובר לחלב אם בכמויות קטנות. לפני נטילת התרופה עליך להיוועץ ברופא אם הינך מיניקה או מתכננת להניק.

נהיגה ושימוש במכוונות

אמלודיפין טבע עלול להשפיע על כושר הנהיגה והיכולת להפעיל מכוונות. אם התרופה גורמת לך לבחילה, סחרחורת, יעייפות או כאב ראש אל תנהג או תשתמש במכוונות והיוועץ ברופא מיד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. ניתן ליטול את התרופה ללא קשר לארוחתו. עליך ליטול את התרופה באותה שעה בכל יום עם מים. אין ליטול עם מיץ אשכוליות.

אין לעבור על המנה המומלצת!

הטבליה בשני המינונים (5 ו-10 מ"ג) ניתנת לחציה. אין מידע לגבי כתישה/ לעיסה של הטבליה.

אם נטלת מינון גבוה מדי של אמלודיפין טבע

נטילת כמות גדולה מדי של התרופה עלולה לגרום ללחץ הדם להיות נמוך ואף נמוך במידה מסוכנת. ייתכן שתחוש סחרחורת, הרגשת סחרור, עיולפון או חולשה. אם הירידה בלחץ הדם שלך חמורה, ייתכן שתכנס למצב של הלא. ייתכן שעורך יהיה קריר, חלם ודובק ותאבד הכרה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,

פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא איזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה בזמן הדרוש יש לדלג על המנה שנשכחה

ולקחת את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה!

אם הינך מפסיק ליטול אמלודיפין טבע

הרופא מליץ על משך הזמן בו עליך ליטול תרופה זו. הבעיה הרפואית שלך עלולה לחזור אם תפסיק את השימוש לפני המלצה על כך.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. יש להלמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות נוספות! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באמלודיפין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות לאחר נטילת התרופה:

- צפוצים פתאומיים (בנשימה), כאב בחזה, קשיי נשימה או קוצר נשימה.
- נפיחות בעפעפיים, בפנים או בשפתיים.
- התנפחות הלשון והגרון אשר מקשה על הנשימה.
- נגובות עוריות חמורות הכוללת פריחה בעור, חרלת, אודם בעור בכל הגוף, גרד חריף, פלפוליות בעור, קילוף ונפיחות בעור, דלקת בממברנות ריריות (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) או ללא תגובה אלרגית אחרת.
- התקף לב, שינויים בקצב פעימות הלב.
- דלקת בלב-לב - אשר יכולה לגרום לכאב גב וכאב בטן המלווה בתחושת חולי.

תופעת לוואי שכיה מאד (very common) - מופיעה ביותר ממשמש אחד מתוך עשרה: אם היא מהווה בעיה עבורך או נמשכת מעל שבוע יש לפנות לרופא: בצקת (הצטברות נוזלים).

תופעות לוואי שכוחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10 מתוך 100 משתמשים: אם תופעות אלו מהוות בעיה עבורך או אם הן נמשכות מעל שבוע יש לפנות אל הרופא: כאב ראש או ישינויות או סחרחורת (במיוחד בתחילת הטיפול), דפיקות לב לא סדירות או חזקות (פלפוליות), אודם בפנים, כאב בטן, בחילה, שינויים בהרגלי היציאות, שלשול, קוצר נשימה, נפיחות בקרסול, יעייפות, חולשה, הפרעות בראייה, ראייה כפולה, התכווצות שרירים.

תופעות לוואי שאינן שכוחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10 מתוך 1,000 משתמשים:

שינויים במצבי רוח, חדרה, דיכאון, קשיי שינה, רעד, שינויים בחוש הטעם, תחושת עילפון, חוסר תחושה או תקצוצים בגפיים, איבוד תחושת כאב, צלוצים באוזניים, לחץ דם נמוך, התעטשות או נזלת הנגרמים מדלקת בדופן הפנימי בזה (רייטיס), שיעול, יובש בפה, הקאות (תחושת בחילה), נשירת שיער, הגזפה מוגברת, גרד בעור, שינוי בצבע העור, כתמים אדומים על העור, הפרעה בהטלת שתן, עלייה בדחיסות למתן שתן בלילה, עלייה בתכיפות מתן שתן, קושי בהעגה לרקפה, חוסר נוחות או הגדלה של החזה בגברים, כאב תחושת חולי, כאב שרירים או מפרקים, כאבי גב, עלייה או ירידה במשקל.

תופעת לוואי נדירה (rare) - תופעה שמופיעה ב-10 מתוך 10,000 משתמשים:

תופעות לוואי נדירות מאד (very rare) - תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000 משתמשים:

כמות ירידה של כדוריות דם לבנות, ירידה בכמות טסיות הדם (עלול לגרום לחבורות או דימום בקלות), עלייה ברמת הסוכר בדם (היפרגליקמיה), הפרעה במערכת העצבים היכולה לגרום לחולשת שרירים, עקצוץ או נימול. נפיחות בחניכיים, נפיחות בטנית (גסטריטיס), אי תפקוד הכבד, דלקת בכבד (הפטטיס) העושה, הצהבה של העור (צהבת), עלייה ברמת אנזימי הכבד אשר יכולה להופיע בבדיקות דם, עלייה בטונוס השרירים, דלקת בכלי הדם (מלווה בדרך כלל בפריחה עורית), רגישות לאור, הפרעה המשלבת נוקשות, רעד ו/או הפרעות בתנועה.

תופעות לוואי ששיחותן אינה ידועה (תופעות ששיחותן טרם נקבעה): רעד, יציבה נוקשה, פנים דמויי מסיכה (הבעות תפוח מועטות או חסרות), תנועות אינטויות ודשדוש, הליכה לא מאוזנת.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ידווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "ידווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לידווח על תופעות לוואי, או על ידי הכיסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הידעה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לילדים ייתכן וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C, באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate anhydrous, sodium starch glycolate, magnesium stearate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אמלודיפין טבע 5 מ"ג: טבליה עגולה בצבע לבן, בצידיה האחד מוטבע A5 וקו חציה וצידיה השני חלק.
אמלודיפין טבע 10 מ"ג: טבליה עגולה בצבע לבן, בצידיה האחד מוטבע A10 וקו חציה וצידיה השני חלק.
האריזה מכילה 20 או 30 טבליות. ייתכן כי לא כל גודלי האריזה משוקיים.

שמר היצרן ובעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ, רחוב בוכרה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך בחודש אוגוסט 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אמלודיפין טבע 5 מ"ג: 138.64.31498
אמלודיפין טבע 10 מ"ג: 138.65.31499

לשם הפסטות ולהקלת הקריאה, עלון זה תוכן בלשון זכר. על אף עצת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.