

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ياسمين
أقراص مطلية

يحتوي كل قرص مطلي على:

دروسبيرينون 3 ملг (Drospirenone 3 mg)

إثينيل إستراديول 0.03 ملг (Ethinylestradiol 0.03 mg)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية: أنظر إلى الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرئي النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجعي الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
ياسمين غير مخصص للنساء أو المراهقات اللواتي لم تظهر الدورة الشهرية لديهن بعد.

معلومات هامة عن وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة وعن الدواء

- بالاستعمال الصحيح، تعتبر وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة لإحدى الطرق القابلة للانعكاس، والأكثر أمانة لمنع الحمل.
- إنها تزيد قليلاً من خطورة حدوث تخثر دموي في الأوردة وفي الشرايين، خاصة في السنة الأولى أو عند تجديد العلاج بوسيلة منع حمل هرمونية مركبة بعد فترة توقف تبلغ 4 أسابيع أو أكثر.
- يتوجب عليك أن تكوني منتبهة ومراجعة الطبيب إذا كنت تعتقدين بأن لديك أعراض تخثر دموي (أنظري الفقرة 2 "تخثرات دموية").

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

ياسمين مخصوص لمنع الحمل.

الفصيلة العلاجية: ينتمي ياسمين إلى فصيلة الأدوية المسماة أقراص منع الحمل المركبة التي تحتوي على نوعين من الهرمونات الأنثوية: إستروجين (إثينيل إستراديول) وبروجستوجين (دروسيبيرون).

(2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسة (الديك اليرجية) لـ دروسبيرينون أو لـ إثينيل إستراديول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. من شأن رد الفعل التحسسي أن يسبب حكة، طفح أو انتفاخ. لقائمة المواد غير الفعالة، انظر في الفقرة 6 "معلومات إضافية".
- كنت حاملاً أو عند وجود شوك بأنك حامل.
- كنت تعانيين أو عانيت في الماضي من تخثر دموي في الأوعية الدموية في رجلك (جلطة [thrombosis] الأوردة العميقة، DVT)، في الرئتين (انصمام رئوي، PE) أو في أعضاء أخرى من الجسم.

- كنت تعانين بأنك تعانين من اضطراب في تخثر الدم (مثلاً، من نقص في البروتين من نوع C، من نقص في البروتين من نوع S، خلل وراثي في مضاد الترومبين III، عامل 5 لايدن أو أجسام مضادة ضد فوسفوليبيدات).
- كنت بحاجة لإجراء عملية جراحية أو إذا كنت عديمة القدرة على الحركة لفترة طويلة (أنظري الفقرة 2 "تخثرات دموية").
- عانيت في الماضي من نوبة قلبية أو من سكتة دماغية.
- كنت تعانين أو عانيت في الماضي من ذبحة صدرية (angina pectoris)، وهي حالة تسبب المَاء شدِيداً في الصدر ويمكن أن تشكل علامة أولية لنوبة قلبية) أو من نوبة إقفارية عابرة (TIA – أعراض مؤقتة لسكتة دماغية).
- كنت تعانين من إحدى الأمراض التالية التي قد تزيد من خطورة حدوث تخثر دموي في الشرايين لديك:
 - سكري شديد مع تضرر الأوعية الدموية

- ضغط دم مرتفع جداً
- نسب مرتفعة جداً للدهون في الدم (كوليسترول أو تريغليسيريدات)
- حالة طبية تتميز بارتفاع نسب الهوموسىستين في الدم (**hyperhomocysteinemia**)
 - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من نوع الصداع النصفي (الشقيقة) الذي يدعى "صداع نصفي مع هالة (أورة)".
 - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد، ووظائف الكبد غير سليمة حتى الآن.
 - كنت تعانين من خلل في وظيفة الكلى (فشل كلوي).
 - كنت تعانين أو عانيت في الماضي من ورم في الكبد.
 - كنت تعانين أو عانيت في الماضي أو إذا كان هناك شك لوجود سرطان الثدي أو سرطان في الأعضاء التناسلية.

- كنت تعانين من نزف مهبلي مجهول السبب.
- كنت تعانين من التهاب في الكبد من النوع C (Hepatitis C) وتتناولين مستحضرات طبية التي تحتوي على أومبيتاسفير/پاريتاپريفير/ريتونافير وداسابوفير (أنظر في أيضًا الفقرة "ردود فعل بين الأدوية")

إذا كنت تعانين من إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً، يمنع عليك استعمال ياسمين. إذا كان لديك إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً، أنت ملزمة بإبلاغ طبيبك بذلك. سوف يتناقش الطبيب معك بالنسبة لوسائل منع الحمل الأخرى التي تناسبك بشكل أكثر.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- قبل أن تبدئي بتناول ياسمين، اقرئي المعلومات عن التخثرات الدموية في سياق هذه الفقرة. من المهم بشكل خاص فراءة ما هي أعراض التخثر الدموي المفصلة لاحقًا في الفقرة 2 "تخثرات دموية".
- في هذه النشرة تم وصف عدة حالات يتوجب عليك فيها التوقف عن تناول ياسمين، أو حالات قد تضعف فيها موثوقية ياسمين. في هذه الحالات عليك الامتناع عن ممارسة العلاقات الجنسية أو اتخاذ وسائل منع حمل إضافية، غير هورمونية، مثل كوندوم أو وسيلة منع حمل عازلة أخرى. لا تعتمدي على طرق "الأيام الآمنة" أو قياس حرارة الجسم. هذه الطرق قد تكون غير موثوقة لأن ياسمين يؤثر على التغيرات الدورية في حرارة الجسم والإفراز من عنق الرحم.

- يasmine، بالمشابه لوسائل منع حمل هورمونية أخرى، لا يحمي من العدوى بمرض الإيدز أو أي مرض آخر ينتقل بالاتصال الجنسي.
- إذا كنت بحاجة لإجراء فحوصات الدم، بلغي الطبيب أو طاقم المختبر بأنك تتناولين أقراص لمنع الحمل، وذلك لأن وسائل منع الحمل الهرمونية قد تؤثر على نتائج فحوصات معينة.

**متى يتوجب عليك التوجه إلى الطبيب؟
توجهي بسرعة لاتفاق مساعدة طبية**

- إذا كنت تلاحظين علامات ممكنة لحدوث تخثر دموي التي قد تدل على أنه قد تشكل بجسمك تخثر دموي في الرجل (أي جلطة الأوردة العميق)، تخثر دموي في الرئتين (أي انصمام رئوي)، نوبة قلبية أو سكتة دماغية (أنظر الفقرة 2 "تخثرات دموية").
لوصف أعراض تلك الأعراض الجانبية الخطيرة، الرجاء أنظر الفقرة 2 "كيفية تشخيص تخثر دموي".

تحثني مع طبيبك قبل تناول ياسمين. يجب عليك في حالات معينة اتخاذ وسائل حذر خاصة أثناء استعمال ياسمين أو أي فرصة مركب آخر لمنع الحمل، وقد يحتاج طبيبك إلى فحشك بشكل دائم.

قبل استعمال ياسمين، **بلغ الطبيب إذا كانت إحدى الحالات التالية تخصك، تتطور أو تتفاقم أثناء تناول ياسمين.**

◦ إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربة يعاني أو عانى في الماضي من سرطان الثدي

◦ إذا كنت تعانين من مرض في الكبد أو المرارة

◦ إذا كنت تعانين من داء السكري

◦ إذا كنت تعانين من الاكتئاب

◦ إذا كنت تعانين من داء كرون أو من التهاب القولون التقرحي (مرض معوي إلتهابي مزمن)

- إذا كنت تعانين من متلازمة انحلال الدم اليوريمي HUS - اضطراب في تخثر الدم الذي يسبب فشلاً كلوياً
- إذا كنت تعانين من فقر الدم المنجلي (مرض وراثي لخلايا الدم الحمراء)
- إذا كنت تعانين من ارتفاع نسب الدهون في الدم Hypertriglyceridemia - فرط ثلاثي غليسيريد الدم أو إذا كانت لديك سابقة عائلية لهذه الحالة. لقد وجد أن لفرط ثلاثي غليسيريد الدم علاقة بزيادة الخطورة لتطوير التهاب البنكرياس (pancreatitis)
- إذا كنت بحاجة لإجراء عملية جراحية أو إذا كنت عديمة الحركة لفترة طويلة (أنظري الفقرة 2 "تخثرات دموية")
- إذا أنجبت مؤخراً، فأنت معرضة لخطورة زائدة لتطوير تخثرات دموية. استشيري طبيبك خلال كم من الوقت بعد الولادة يسمح لك ببدء تناول ياسمين

- إذا كنت تعاني من التهاب الأوردة تحت الجلد (التهاب الأوردة الخثاري السطحي)
- إذا كنت تعاني من دوالي في الأوردة
- إذا كنت تعاني من الصرع (epilepsy) (أنظري "ردود فعل بين الأدوية" في الفقرة 2)
- إذا كنت تعاني من الذبحة الحمامية الجهازية (لوبيوس - مرض يؤثر على الجهاز المناعي)
- إذا كنت تعاني من مرض الذي ظهر للمرة الأولى خلال حمل أو خلال استعمال سابق للهormونات الجنسية (مثلاً فقدان السمع، مرض دموي المسمى پورفيريَا، طفح جلدي متراافق بحويصلات خلال الحمل [عقبولة الحمل]، مرض عصبي الذي يسبب حرّكات جسم مفاجئة [Sydenham's Chorea])
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الكلف (chloasma) - تغير بلون الجلد خاصة على الوجه أو العنق الذي يعرف باسم "كلف الحمل"). في حال حصل ذلك، تجنّبي التعرّض المباشر لضوء الشمس أو الضوء فوق البنفسجي

- إذا كنت تعاني من وذمة وعائية وراثية، فإن المستحضرات التي تحتوي على إستروجين قد تسبب ظهور أعراض المرض أو تفاقمها. عليك التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تشعرين بأعراض الوذمة الوعائية مثل انتفاخ في الوجه، اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبات في البلع أو شرى (Urticaria) المصحوبة بصعوبات في التنفس.

التخثرات الدموية

إن استعمال وسيلة منع حمل هورمونية مركبة، مثل ياسمين، يزيد من خطورة تطور تخثر دموي لديك بالمقارنة لعدم استعمالها في حالات نادرة، قد يسد التخثر الدموي وعاءً دموياً ويؤدي إلى مشاكل خطيرة.

مستوى الخطورة لحدوث جلطة (thrombosis) قد يتغير حسب نوع الحمل المتناول. إستشيري الطبيب بالنسبة للإمكانيات المختلفة.

التخثرات الدموية قد تتشكل:

- في الأوردة (حالة تسمى "جلطة وريدية"، "Thromboembolism" - خثار وريدي" أو (VTE)
- في الشرايين (حالة تسمى "جلطة شريانية"، "Thromboembolism" - خثار شرياني" أو (ATE)

إن الشفاء من التخثرات الدموية هو غير تام دائمًا. في أحيان نادرة، من الجائز أن تحدث أعراض خطيرة مطولة أو، في أحيان نادرة جدًا، قد تكون مميتة.

من المهم التذكر بأن الخطورة الإجمالية لحدوث تخثر دموي ضار نتيجة تناول ياسمين، هي قليلة.

كيفية تشخيص تخثر دموي

توجهي بسرعة للتلقى مساعدة طبية إذا كنت تلاحظين إحدى العلامات أو الأعراض التالية:

من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟	هل أنت تشعرين بإحدى العلامات التالية؟
جلطة الأوردة العميقية	<ul style="list-style-type: none"> ● انتفاخ بإحدى الرجلين أو على طول وريد في الرجل أو في القدم، خاصةً إذا كان مصحوب بـ: <ul style="list-style-type: none"> ○ ألم أو حساسية في الرجل التي من الجائز أن يتم الشعور بهما فقط أثناء الوقوف أو المشي ○ ارتفاع حرارة الرجل المتأثرة ○ تغير لون جلد الرجل مثل شحوب، احمرار أو إزرقاق

هل أنت تشعرين بإحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟
<ul style="list-style-type: none"> ● ضيق تنفس مفاجئ مجهول السبب أو تنفس سريع ● سعال مفاجئ بدون سبب واضح، الذي قد يكون مصحوباً بدم ● ألم حاد في الصدر الذي يمكن أن يشتد أثناء التنفس العميق ● الشعور بدواران شديد أو دوار ● نبض سريع أو غير منتظم ● ألم شديد في البطن 	انصمام رئوي

هل أنت تشعرين بإحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟
إذا لم تكوني متأكدة، تحدي مع الطبيب لأنه بالإمكان ارتكاب خطأ والاعتقاد بأن بعض الأعراض مثل السعال أو ضيق التنفس، تنسب لمشاكل أبسط مثل دعوى في مجاري التنفس (الرشح مثلاً).	انصمام رئوي
<p>أعراض التي تظهر على الأغلب في عين واحدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • فقدان رؤية مفاجئ أو • تشوش رؤية الغير مصحوب بألم، الذي قد يتفاقم لدرجة فقدان الرؤية 	جلطة في أوردة شبكيّة العين (تخثر دموي في العين)

هل أنت تشعرين بإحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟
<p>نوبة قلبية</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ألم، انزعاج، ضغط، أو ثقل في الصدر • شعور ضاغط أو امتلاء في الصدر، في الذراع أو من تحت عظم الصدر الامتلاء، صعوبات في الهضم أو شعور بالاختناق • شعور بانزعاج في القسم العلوي من الجسم الذي يمتد إلى الظهر، الفك، الحنجرة، الذراع وإلى البطن • تعرق، غثيان، تقيؤ أو دوار • ضعف شديد، قلق أو ضيق تنفس • نبض سريع أو غير منتظم

هل أنت تشعرين بإحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟
<ul style="list-style-type: none"> ● ضعف مفاجئ أو تمل في الوجه، الذراع أو الرجل، خاصة في جانب واحد من الجسم ● ارتباك، صعوبات مفاجئة في النطق أو الفهم ● صعوبات مفاجئة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين ● صعوبات في المشي، دوار، فقدان مفاجئ للتوازن أو للتناسق ● صداع مفاجئ، شديد أو متواصل مجهول السبب ● فقدان الوعي أو الإغماء مع أو بدون اختلاجات 	<p>● سكتة دماغية</p>

هل أنت تشعر بـأحدى العلامات التالية؟	من أي شيء من الجائز أنك تعانين؟
<p>سكتة دماغية</p>	<p>أحياناً يمكن أن تكون أعراض السكتة الدماغية قصيرة، ذات شفاء فوري وكمال تقريباً، ولكن لا يزال عليك التوجه لتلقي علاج طبي طارئ، نظراً لأنك قد تكوني معرضة لخطورة حدوث سكتة دماغية إضافية.</p>
<p>تخترات دموية تسد أو عية دموية أخرى</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● انتفاخ وتغير بسيط في لون الأطراف إلى الأزرق ● ألم شديد في البطن (بطن حادة) [acute abdomen]

تَخْثُرَاتٌ دَمَوِيَّةٌ فِي الْوَرِيدِ

ما الذي قد يحدث إذا تشكل تخثر دموي في الوريد؟

- لقد تبيّن أن استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة له علاقة بزيادة الخطورة لتشكل تخثرات دموية في الوريد (جلطة وريدية). مع ذلك، فإن تلك الأعراض الجانبية هي نادرة وتحدث بالأخص في السنة الأولى لاستعمال وسيلة منع حمل هرمونية مركبة.
- إذا تكون تخثر دموي في وريد الرجل أو في القدم، فإنه قد يسبب جلطة الأوردة العميقه (DVT).
- إذا تحرك تخثر دموي من الرجل ووصل إلى الرئة من الممكن أن يتكون انصمام رئوي.
- في أحيان نادرة جداً قد يتكون تخثر دموي في وريد عضو آخر مثل العين (جلطة وريدية في شبكة العين).

متى تكون الخطورة قصوى لتطور تخثر دموي في الوريد؟

الخطورة القصوى لتطور تخثر دموي في الوريد هو خلال السنة الأولى لتناول وسيلة منع حمل هormونية مركبة للمرة الأولى. إضافة لذلك، قد تزداد الخطورة إذا بدأت من جديد بتناول وسيلة منع حمل هormونية مركبة (نفس الدواء أو دواء آخر). بعد فترة توقف تبلغ 4 أسابيع أو أكثر.

بعد السنة الأولى، تتحفظ الخطورة ولكنها تبقى دائمة أعلى بقليل مما هو عليه في حال عدم استعمالك لوسيلة منع حمل هormونية مركبة.

عندما تتوقفين عن استعمال ياسمين، فإن الخطورة لتطور تخثر دموي لديك تعود إلى مستواها الطبيعي خلال عدة أسابيع.

ما هي الخطورة لتطور تخثر دموي؟

تتعلق الخطورة بمستوى الخطورة الطبيعي لديك لتطور جلطة وريدية (VTE) وبنوع وسيلة منع الحمل الهرمونية المركبة التي تتناولينها.

إن الخطورة الإجمالية لتطور تخثر دموي في الرجل أو في الرئتين (DVT أو PE) باستعمال ياسمين، هي قليلة.

- من بين 10,000 امرأة لا تستعملن أي وسيلة منع حمل هرمونية مركبة ولسن حوامل، فإن حوالي 2 سينطور لديهن تخثر دموي في السنة.
- من بين 10,000 امرأة تستعملن وسيلة منع حمل هرمونية مركبة التي تحتوي على ليقونورجسترينيل، نوراتيسيرون أو نورجستيمات، فإن حوالي 5-7 سينطور لديهن تخثر دموي في السنة.

- من بين 10,000 امرأة تستعملن وسيلةً منع حمل هورمونية مركبة التي تحتوي على دروسبيرينون مثل ياسمين، فإن حوالي 9 إلى 12 امرأة سينتطور لديهن تخثر دموي في السنة.
- إن الخطورة لتطور تخثر دموي تختلف كأمر متعلق بالسباق الطبية الخاصة بك (انظر الفقرة 2 "العوامل التي تزيد من خطورة تطور تخثر دموي لديك في الوريد" وـ "العوامل التي تزيد من خطورة تطور تخثر دموي في الشريان لديك").

الخطورة لتطور تخثر دموي في السنة	
حوالي 2 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي لا تستعملن قرص هورموني مركب لمنع الحمل ولسن حوامل
حوالي 7-5 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي تستعملن قرص هورموني مركب لمنع الحمل الذي يحتوي على ليقونورجستيريل، نوراتيستيرون أو نورجستيمات
حوالي 12-9 من بين 10,000 امرأة	النساء اللواتي تستعملن ياسمين

العوامل التي تزيد من خطورة تختز دموي في الوريد لديك
إن الخطورة لتطوير تختز دموي أثناء استعمال ياسمين هي قليلة، ولكن بعض الحالات قد تزيد من هذه الخطورة. تكون الخطورة لديك أكبر:

- إذا كنت تعانيين من وزن زائد بشكل ملحوظ (BMI أكثر من 30 كغم/متر²).
- إذا كان لأحد أفراد عائلتك المقربين حالة لظهور تختز دموي بالرجل في سن مبكرة (مثلاً دون عمر 50 سنة)، في الرئة أو بعضو آخر. في مثل هذه الحالة من الجائز أن لديك اضطراب وراثي في تختز الدم.
- إذا توجب عليك إجراء عملية جراحية أو إذا كنت عديمة الحركة لفترة طويلة بسبب إصابة أو مرض، أو إذا تم وضع رجلك بالجبس. من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن استعمال ياسمين قبل عدة أسابيع من العملية الجراحية أو خلال فترة كونك قليلة الحركة. إذا توجب عليك التوقف عن استعمال ياسمين، استشيري طبيبك متى يمكنك معاودة استعمال الدواء ثانية.

- مع التقدم في السن (خاصة إذا تجاوزت عمر 35 سنة تقريباً).
- إذا أنجبَت قبل عدة أسابيع.

ترداد الخطورة لتطور تخثر دموي كلما وجد لديك أكثر من تلك الحالات.

إن الطيران (لأكثر من 4 ساعات) قد يزيد بشكل موقت من خطورة حدوث تخثر دموي لديك، خاصة إذا وجد لديك قسم من قائمة العوامل الأخرى.

من المهم أن تبلغ الطبيب إذا كانت إحدى تلك الحالات تخصك، حتى ولو لم تكوني واثقة. من الجائز أن يقرر الطبيب بأنه يتوجب عليك التوقف عن تناول ياسمين.

إذا تغيرت إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً خلال فترة استعمال ياسمين، مثلاً إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربين يعاني من جلطة لسبب غير معروف أو إذا طرأ ارتفاع ملحوظ في وزن جسمك، بلغى الطبيب عن ذلك.

تَخْثُرَاتٌ دَمَوِيَّةٌ فِي الشَّرِيَانِ

ما الذي قد يحدث إذا تكون تَخْثُر دَمَوِيٌّ فِي الشَّرِيَانِ؟

بشكل مشابه لـتَخْثُر دَمَوِيٌّ فِي الْوَرِيدِ، فإن التَّخْثُر الدَّمَوِي فِي الشَّرِيَانِ قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة. مثلاً، تَخْثُر دَمَوِيٌّ شَرِيَانِي قد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

العوامل التي تزيد من خطورة تطور تخرّر دموي شريانی لديك
من المهم التذكير بأن خطورة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية نتيجة استعمال ياسمين هي قليلة جداً، ولكنها قد تزداد:

- مع التقدم في السن (إذا تجاوزت عمر 35 سنة تقريباً).
- إذا كنت مدخنة. يوصي بالتوقف عن التدخين أثناء استعمال وسيلة هورمونية مركبة لمنع الحمل مثل ياسمين. إذا كنت غير قادرة على التوقف عن التدخين وتتجاوزت عمر 35 سنة، فمن الجائز أن يوصي طبيبك باستعمال وسيلة منع حمل من نوع آخر.
- إذا كنت تعانيين من وزن زائد.
- إذا كنت تعانيين من ارتفاع ضغط الدم.

- إذا حدث ضمن عائلتك المقربة حالة نوبة قلبية أو سكتة دماغية في سن مبكرة (دون عمر 50 سنة تقريباً). في مثل هذه الحالة من الجائز أن تكوني معرضة أيضاً لخطورة أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
- إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك المقربين تعانون من ارتفاع نسب الدهون في الدم (كولسترول أو تريغليسيريدات).
- إذا كنت تعانين من الصداع النصفي (الشقيقة)، خاصةً "صداع نصفي مع هالة (أورة)".
- إذا كنت تعانين من مشكلة في القلب (اضطراب في صمامات القلب، اضطراب في نظم القلب المعروف بالرجفان الأذيني).
- إذا كنت تعانين من داء السكري.

إذا وجد لديك أكثر من حالة واحدة من تلك الحالات أو إذا كان أحدها شديداً لديك بشكل خاص، فإن الخطورة لتطور تخثر دموي قد تزداد حتى بشكل أكبر.

إذا تغيرت إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً خلال استعمال ياسمين، مثلاً إذا بدأت بالتدخين، إذا كان أحد أفراد عائلتك المقربين يعاني من جلطة لسبب غير معروف أو إذا طرأ ارتفاع ملحوظ في وزن جسمك، بلغي طبيبك بذلك.

ياسمين والسرطان

لقد لوحظ حدوث سرطان الثدي بشكل أكبر بقليل لدى النساء اللواتي تناولن أقراص منع الحمل مركبة، ولكن ليس معروفاً فيما إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن العلاج بأقراص منع الحمل. مثلاً، من الجائز أن يتم اكتشاف أورام بشكل أكثر لدى النساء اللواتي تناولن أقراص مركبة لمنع الحمل نظراً لأنهن يجتزن فحوصات لدى طبيههن بوتيرة أكبر. إن حدوث أورام في الثدي ينخفض بالتدريج بعد إيقاف وسيلة منع الحمل الهرمونية المركبة.

من المهم أن تفحصي ثدييك بشكل روتيني، ويجب عليك الاتصال بطبيبك في كل حالة تشعرين فيها بكتلة. في حالات نادرة تم التبليغ عن أورام كبدية حميدة، وفي حالات حتى أقل، تم التبليغ عن أورام كبدية خبيثة لدى متعالجات تناولن أقراص لمنع الحمل. اتصلي بالطبيب إذا كنت تعانين من ألم شديد بصورة غير اعتيادية في البطن.

اضطرابات نفسية

عدد من النساء اللواتي استعملن وسائل منع حمل هرمونية، بما في ذلك "ياسمين"، بلغو عن حالات اكتئاب أو عن مزاج كئيب. قد يكون الاكتئاب شديداً ومن الممكن أن يؤدي أحياناً إلى أفكار انتحارية. إذا شعرت بتغيرات في المزاج وأعراض اكتئاب، توجهي إلى طبيبك للحصول على استشارة طبية بأسرع وقت ممكن.

نزف بين طمثين

خلال الأشهر العلاجية الأولى لاستعمال ياسمين، من الجائز أن تعانين من أنزفة غير متوقعة (أنزفة خارج 7 أيام التوقف). إذا حدث هذا النزيف خلال أكثر من عدة أشهر، أو إذا بدأ نزيف كهذا بعد عدة أشهر من العلاج، يجب على طبيبك استيضاح وفحص السبب لذلك.

كيفية التصرف إذا لم يظهر نزيف خلال أسبوع التوقف

إذا تناولت كافة الأقراص على الشكل الصحيح، لم يحدث تقيؤ أو لم تعاني من إسهالات شديدة ولم تتناولي أدوية أخرى، فمن غير المحتمل أن تكوني حامل.

إذا لم يظهر النزيف المتوقع بدورتين متتاليتين، فمن الجائز أنك حامل. اتصلي حالاً بالطبيب. لا تبدئي العلاج بعلبة جديدة إلى أن تكوني متأكدة من عدم كونك حامل.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناولين أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكممات غذائية، فأخبري الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. أخبري أيضًا طبيب الأسنان أو كل طبيب آخر يسجل لك وصفة لدواء آخر، بأنك تتناولين ياسمين. فهم يمكنهم أن يخبرونك فيما إذا توجب عليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل (مثل الكوندوم)، وفي حال الاستعمال، فلا يفترة من الزمن، أو هل يجب إجراء تغيير في استعمال الدواء الآخر، الذي يتوجب عليك تناوله. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناولين أدوية معنية التي يمكنها

- أن تكون ذات تأثير على نسب ياسمين في الدم
- أن تؤدي لأن يكون ياسمين أقل نجاعة في منع الحمل
- أن تسبب أنزفة غير متوقعة

ذلك يشمل أدوية تستعمل في علاج -

- الصرع (epilepsy) (مثل بريميدون، فينيتوئين، باربيتورات، كاربامازيبين أو أوكسكاربازيبين)
- السل (مثـل ريفامبيسين)
- حالات عدوى مرض الإيدز (HIV) والتهاب الكبد من نوع C (تسمـى مثبطـات بـروـتـياـز وـ transcriptase inhibitors مثل رـيـتوـنـافـير ، نـيـفـيرـاـپـين ، إـيـفـابـيرـنـز)
- حالات عدوـى فـطـرـية (چـريـسيـوـفـولـفـينـ، كـيـتوـكـونـازـولـ)
- التهـابـ المـفاـصـلـ (Arthritis)، مـرضـ مـفاـصـلـ نـاجـمـ عنـ تـأـكـلـ المـفاـصـلـ (Arthrosis) (إـتـورـيكـوكـسـيبـ)
- ارتفاع ضغـطـ الدـمـ الرـئـويـ (بوـسـيـنـتـانـ)
- المستحضر النباتـيـ هـيـبـيرـيـكـومـ (St. John's Wort)

إن استعمال ياسمين قد يؤثر على أدوية أخرى مثل:

- الأدوية التي تحتوي على سيكلوسيبورين
- لاموتريجين لعلاج الصرع (epilepsy) (قد يؤدي لزيادة وتيرة نوبات المرض)
- تيوفيلين لعلاج المشاكل التنفسية
- تيزانيدين لعلاج الآلام العضلية وأو التقلصات العضلية

يُمنع عليك استعمال ياسمين إذا كنت تعاني من التهاب في الكبد من نوع C (Hepatitis C) وكانت تتناولين مستحضرات طبية التي تحتوي على أومبيتاسفير/باريتاپریفير/ريتونافير وداسابوفير لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع في نتائج فحوصات الدم لفحص أداء وظائف الكبد (ارتفاع في إنزيم الكبد من نوع ALT). سيسجل لك طبيبك نوع آخر من وسائل منع الحمل قبل بدء العلاج بهذه المستحضرات الطبية. يمكن تجديد استعمال ياسمين بعد تقريرًا أسبوعين من انتهاء العلاج بهذه المستحضرات. أنظري الفقرة 2 "يُمنع استعمال هذا الدواء إذا".

الفتيات والمرأهقات

ياسمين غير مخصص للنساء أو المراهقات اللواتي لم تظهر الدورة الشهرية لديهن بعد.

النساء البالغات

ياسمين ليس معداً للاستعمال بعد سن انقطاع الطمث (سن اليأس).

النساء اللواتي يعانين من ضرر في الكبد

لا يجوز تناول ياسمين إذا كنت تعاني من مرض في الكبد. يرجى أن تراجعى البنتين "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".

النساء اللواتي يعانين من ضرر في الكلى

لا يجوز تناول ياسمين إذا كنت تعاني من خلل في أداء الكلى أو من فشل كلوي. يرجى أن تراجعى البنتين "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".

استعمال الدواء والطعام

بإمكان بلع الدواء على معدة خاوية أو مع طعام، مع قليل من الماء، إذا دعت الحاجة.

الحمل والإرضاع

الحمل

ممنوع عليك تناول ياسمين إذا كنت في فترة الحمل. إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة استعمال ياسمين فأنت ملزمة بالتوقف فوراً عن

تناول ياسمين والاتصال بطبيبك. إذا كنت ترغبين في الحمل، فيمكنك التوقف عن تناول ياسمين في أي وقت (أنظر إلى أيضًا الفقرة 3 "في حال توقفك عن تناول الدواء").

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الإرضاع

إن تناول ياسمين عادة غير موصى به حين تكون المرأة مريضة. إذا كنت ترغبين بتناول فرص لمنع الحمل وكنت مريضة فعليك الاتصال بطبيبك.

إن استعمال ياسمين أثناء الإرضاع قد يؤدي إلى تقليل حجم الحليب المنتج وتغيير تركيبه. يتم إفراز كميات ضئيلة من المواد الفعالة في حليب الأم. قد يكون لهذه الكميات تأثير على الطفل.

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

السيادة واستعمال الماكينات

ليست هناك معلومات تدل على أن استعمال ياسمين يؤثر على القدرة على السيادة أو استعمال الماكينات.

التدخين

يوصى بالتوقف عن التدخين خلال فترة استعمال وسيلة منع حمل هورمونية مركبة مثل ياسمين. إذا كنت غير قادرة على التوقف عن التدخين وتجاوزت عمر 35 سنة، فمن الجائز أن يوصيك طبيبك باستعمال وسيلة منع حمل من نوع آخر.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء يحتوي ياسمين على اللاكتوز.

إذا كنت تعانين من عدم قدرة تحمل لسكريات معينة، راجعي الطبيب قبل بدء تناول الدواء.

(3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة.

- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي المُتبع عادة هو قرص واحد في اليوم بساعة محددة لمدة 21 يوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به

يجب بلع الدواء بأكمله. مع الماء، إذا دعت الحاجة.

ممنوع سحق/شطر/مضغ القرص لعدم التسبب بضرر لطلاء القرص وخشية عدم الدقة بالمقدار الدوائي.

- تحتوي علبة ياسمين على 21 قرصاً مطلياً، كل واحد منها مشار إليه بيوم من الأسبوع، على ظهر العلبة.

- ابدئي بتناول القرص المعلم في اليوم الملائم من الأسبوع.
- استمرري بتناول الأقراص حسب اتجاه الأسهم حتى إنتهاء العلبة.
- بعد 21 يوماً من تناول الأقراص، توقفي عن تناولها لمدة 7 أيام، بحيث إذا تناولت القرص الأخير في يوم الجمعة، تناولي القرص الأول من العلبة التالية في يوم السبت من الأسبوع التالي.
سيظهر التزيف الطمثي خلال عدة أيام من تناول القرص الأخير. من الجائز لا يتوقف التزيف عندما تبدئي بتناول الأقراص من العلبة التالية. خلال الأيام الـ 7 هذه أنت محمية من الحمل ولا حاجة باستعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل طالما تناولت الأقراص على الشكل الصحيح وبدأت بتناول العلبة التالية في الوقت.
- بعد مرور 7 أيام التوقف ابدئي بتناول الأقراص من العلبة التالية، حتى ولو استمر التزيف الطمثي. احرصي على بدء تناول الأقراص من العلبة الجديدة في الوقت.

من المفترض أن يظهر التزيف الطمئني خلال أيام التوقف الـ 7، التي لم تتناولها فيها أقراص. يبدأ هذا التزيف عادة في اليوم الـ 2 أو الـ 3 بعد تناول القرص الأخير من ياسمين. ابتدئ العلبة التالية بعد اليوم السابع من أيام التوقف، في حال توقف التزيف أو لم يتوقف.

متى يمكنك البدء باستعمال العلبة الأولى؟

- إذا لم تتناول أي وسيلة منع حمل هورمونية خلال الشهر السابق ابتدئ بتناول أقراص ياسمين في اليوم الأول من الدورة (الذي هو اليوم الأول من التزف الطمئني). في هذه الحالة أنت محمية من الحمل بشكل فوري. يمكنك البدء أيضًا بين الأيام 2-5 من التزيف الطمئني، ولكن في هذه الحالة عليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل (مثل الكوندوم) خلال الأيام الـ 7 الأولى من تناول ياسمين.

- الانتقال من استعمال قرص مركب آخر لمنع الحمل، من حلقة (مهبلية) مركبة أو من لصقة يمكن البدء بتناول ياسمين في اليوم الذي يلي تناولك القرص الفعال الأخير (القرص الأخير الذي يحتوي على مواد فعالة) من أقراص منع الحمل السابقة، وعلى الأكثر في اليوم الذي يلي انتهاء تناول الأقراص غير الفعالة من أقراص منع الحمل السابقة (أو بعد تناول القرص غير الفعال الأخير من أقراص منع الحمل السابقة). عند الانتقال من استعمال حلقة (مهبلية) مركبة أو من لصقة، عليك استشارة الطبيب.
- الانتقال من استعمال وسيلة منع حمل التي تحتوي على بروجستوجين لوحده (أقراص، حقن لمنع الحمل أو لولب رحمي) يمكن الانتقال من تناول قرص بروجستوجين إلى ياسمين في أي يوم ترغبين به (البدء بتناول ياسمين في موعد الحفنة التالية أو في اليوم الذي أخرج فيه اللولب)، ولكن في جميع تلك الحالات، عليك استعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل (مثل الكوندوم) خلال الأيام الـ 7 الأولى من تناول ياسمين.

- بعد إجراء كشط أو إجهاض
إذا اجتررت عملية إجهاض طبيعية أو مخطط لها خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، فمن الجائز أن يوصيك طبيبك بالبدء بتناول ياسمين في الحال. في مثل هذه الحالة ستكونين محمية من الحمل بدءاً من تناول الفرص الأول.
- بعد الولادة
يمكنك البدء بتناول ياسمين بين اليوم الـ 21 واليوم الـ 28، بعد الولادة. إذا بدأت ما بعد اليوم الـ 28، فعليك استعمال وسيلة منع حمل عازلة (مثل الكوندوم) خلال الأيام الـ 7 الأولى من استعمال ياسمين.
إذا أقمت علاقات جنسية بعد الولادة وقبل البدء بتناول ياسمين، فعليك أن تكوني واثقة من عدم كونك حاملاً أو الانتظار حتى الدورة الشهرية التالية.

- إذا كنت مرضعة وترغبين في البدء بتناول ياسمين أقرئي الفقرة 2 "الحمل والإرضاع".

استشيري الطبيب إذا كنت غير واثقة متى يتوجب عليك البدء بتناول ياسمين.

الفحوصات والمتابعة

قبل البدء باستعمال ياسمين، سيطرح عليك طبيبك أسئلة حول تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك المقربة. سيقوم الطبيب بقياس ضغط دمك ومن الجائز أيضاً أن يجري فحوصات إضافية بحسب حالتك الصحية.

في حال خضوعك لفحوصات دم، أبلغي الطاقم الطبي بأنك تتناولين ياسمين، وذلك لأن أقراص منع الحمل يمكنها أن تؤثر على نتائج بعض تلك الفحوصات.

إذا تناولت عن طريق الخطأ مقدار دوائي أكبر

لا توجد تقارير عن حصول نتائج ضارة خطيرة بعد تناول أكثر من اللازام من أقراص ياسمين.

إذا تناولت عن طريق الخطأ عدة أقراص من ياسمين دفعه واحدة فمن الجائز أن تعانين من غثيان، تقيؤات أو من نزيف مهبلي. من الجائز أن يظهر نزيف كهذا أيضاً لدى فتيات صغيرات التي لم تظهر لديهن الدورة الشهرية بعد وتتناولن الدواء عن طريق الخطأ.

إذا تناولت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفل عن طريق الخطأ من الدواء، توجهي حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضرني معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول قرص واحد أو أكثر من ياسمين

- إذا كان التأخير بتناول قرص يقل عن 12 ساعة، فالحماءة من الحمل لم تتضرر. تناولي القرص بأسرع ما يمكن واستمري بتناول باقي الأقراص كالمعتاد في ساعتك المحددة.
- إذا كان التأخير بتناول قرص يزيد عن 12 ساعة، فالحماءة من الحمل قد تنقل. كلما كان عدد الأقراص المنسيّة أكبر فإن الخطورة لحدوث الحمل تزداد.

إذا نسيت تناول قرص من بداية العلبة أو من نهايتها، فإن الخطورة لحماءة غير تامة من الحمل تكون أكبر. لذلك عليك التصرف حسب الإرشادات التالية (أنظري المخطط في سياق النشرة):

- نسيت تناول أكثر من قرص واحد من العلبة
استشيري الطبيب.

◦ نسيت تناول قرص واحد في الأيام 7-1

تناول القرص المنسي بأسرع ما يمكن، حتى ولو كان ذلك يعني أن عليك تناول قرصين بنفس الوقت. استمرى في تناول باقى الأقراص كالمعتاد واستعملى وسائل إضافية لمنع الحمل (مثل: الكوندوم) خلال الأيام الـ 7 القادمة. إذا أقمت علاقات جنسية في الأسبوع الذى سبق اليوم الذى نسيت فيه تناول القرص، فحينها هناك احتمال أن تكوني حامل. في هذه الحالة استشيري الطبيب.


◦ نسيت تناول قرص واحد في الأيام 14-8


تناول القرص المنسي بأسرع ما يمكن، حتى ولو كان ذلك يعني أن عليك تناول قرصين بنفس الوقت. استمرى في تناول باقى الأقراص المعتاد. إن الحماية من الحمل لم تقل ولا داعي لاستعمال وسائل إضافية لمنع الحمل. إذا نسيت أكثر من قرص واحد، استعملى وسيلة منع حمل عازلة مثل الكوندوم لمدة 7 أيام.

◦ نسيت تناول قرص واحد في الأيام 21-15

يمكنك اختيار إحدى الامكانيتين:

1. تناولي القرص المنسي بأسرع ما يمكن. حتى ولو كان ذلك يعني أن عليك تناول قرصين بنفس الوقت. استمر في تناول باقي الأقراص كالمعتاد. وعوضاً عن إجراء توقف لمدة 7 أيام، ابتدئ حالاً بالعلبة التالية وذلك بعد تناول القرص الأخير من العلبة السابقة (سيتغير يوم البدء). من شبه المؤكد أن يظهر لديك طمث في نهاية تناول العلبة الثانية، ولكن من الجائز أن تحدث أنزفة أو بقع خلال استعمال العلبة الثانية.
 2. يمكنك أيضاً التوقف حالاً عن تناول الأقراص والبدء بعد 7 أيام التوقف (دوني أمامك اليوم الذي نسيت فيه تناول القرص). إذا كنت ترغبين البدء بعلبة جديدة في اليوم الذي تبدئين فيه عادة، بالإمكان تقصير فترة التوقف لأقل من 7 أيام.
في حال تصرفت وفق إحدى هاتين الإمكانيتين فأنت ستبقين محمية من الحمل.
- إذا نسيت تناول أي قرص من العلبة ولم يظهر لديك نزيف خلال الأيام الأولى من 7 أيام التوقف، فمن الجائز أنك حامل. عليك التوجه إلى الطبيب قبل أن تبدئي العلبة التالية.





كيف تتصارف في حال التقيؤ أو الإسهال الشديد

في حال التقيؤ خلال 3-4 ساعات منذ تناول القرص أو إذا كنت تعاني من إسهالات شديدة، فهناك خطورة لعدم امتصاص المواد الفعالة الموجودة بالقرص بشكل تام من قبل جسمك. هذه الحالة تشبه حالة نسيانك تناول قرص. بعد التقيؤ أو الإسهال، يتوجب عليك تناول قرص إضافي من علبة أخرى بأسرع ما يمكن. وإذا أمكن خلال 12 ساعة من الموعود الذي تتناولين فيه القرص عادة. إذا كان هذا الأمر غير ممكן، أو إذا مرّت أكثر من 12 ساعة، فعليك التصرف وفق التعليمات المذكورة في فقرة "إذا نسيت تناول قرص واحد أو أكثر من ياسمين".

تأجيل الطمث: ماذا يتوجب عليك أن تعرفي

على الرغم من أن هذا الأمر غير موصى به، بإمكانك تأجيل الطمث بواسطة التغاضي عن 7 أيام التوقف وتناول علبة جديدة من ياسمين بشكل متواصل حتى نهايتها. من الجائز أن تواجهي خلال استعمال العلبة الثانية من نزيف بسيط أو نزيف يشبه الطمث.

بعد 7 أيام التوقف العادية أبدئي بتناول العلبة التالية.
استشيري الطبيب قبل أن تقرري تأجيل الطمث لديك.

**تغبير اليوم الأول من الطمث: ماذا يتوجب عليك أن تعرفي
في حال تناولك للأقراص بحسب التعليمات، فسيبدأ الطمث لديك خلال 7 أيام التوقف.**

إذا كنت بحاجة لتغيير هذا اليوم، قللي عدد أيام التوقف (ولكن لا يجوز أبداً زиادتها عن ذلك - 7 أيام هي الحد الأقصى!).

مثلاً: إذا بدأت 7 أيام التوقف في يوم الجمعة، و كنت ترغبين بتغيير ذلك إلى يوم الثلاثاء (3 أيام أكبر)، فابدئي العلبة التالية أبكر من المعتاد بـ 3 أيام. إذا تم تقصير فترة أيام التوقف إلى 3 أيام أو أقل فمن الجائز ألا يظهر لديك نزيف خلال هذه الأيام. من الجائز أن يظهر نزيف خفيف أو نزيف يشبه الطمث.

إذا كنت غير واثقة من كيفية التصرف، استشيري الطبيب.

في حال توقف عن تناول الدواء

يمكنك التوقف عن تناول ياسمين في أي وقت ترغبين به. إذا كنت لا ترغبين في الحمل، استشيري الطبيب بالنسبة لوسائل أخرى موثوق بها لمنع الحمل. في حال كنت تخططين للحمل، توقفي عن تناول ياسمين وانتظري حتى ظهور الدورة الشهرية بشكل طبيعي قبل أن تحاولي الحمل. يمكنك حساب تاريخ الولادة المتوقع بسهولة أكبر.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! تحقق من الملصق على علبة الدواء ومن المقدار الدوائي في كل مرة تتناولين فيها دواء.
ضعى النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، استعمال ياسمين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملات. لا تندهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيا منها.

إذا ظهر لديك عارض جانبي معين، خاصة إذا كان شديداً أو متواصلاً، أو إذا طرأ أي تغير على حالتك الصحية الذي تعتقدين بأنه قد يكون له صلة بـ ياسمين، اتصللي رجاءً بطبيبك.

هناك خطورة زائدة لحدوث تخثرات دموية في الأوردة (جلطة وريدية [VTE]) أو تخثرات دموية في الشرايين (جلطة شريانية [ATE]) لدى كافة النساء اللواتي تتناولن وسائل منع حمل هormونية مركبة. لمعلومات أكثر تفصيلاً حول المخاطر المختلفة الناتجة عن تناول وسائل منع حمل هormونية مركبة، انظري رجاءً الفقرة 2 "قبل استعمال الدواء".

الأعراض الجانبية التالية لها صلة باستعمال ياسمين:

توقف عن الاستعمال وتوجهي فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعانين من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية -

علامات تثير الظن بحدوث رد فعل تحسسي لـ ياسمين:

- انتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان و/أو الحنجرة.

علامات تثير الظن بحدوث سرطان الثدي تشمل:

- تشكل حفرة في الجلد.

- تغيرات في الحلمة.

- كتلة يمكن رؤيتها أو جسها.

علامات تشير لظن بحدوث سرطان عنق الرحم تشمل:

- إفراز مهبلي يحوي دم أو له رائحة دم.
- نزف مهبلي شاذ.
- ألم في الحوض.
- آلام أثناء إقامة علاقات جنسية.

علامات تشير لظن بحدوث مشاكل خطيرة في الكبد تشمل:

- ألم شديد في القسم العلوي من البطن.
- اصفرار الجلد أو العينين (يرقان).
- التهاب الكبد (hepatitis).
- حكة بكامل الجسم.

إذا كنت تعتقدين بأنك تعانين من إحدى تلك الأعراض الجانبية، توجهي حالاً إلى الطبيب. من الجائز أن يطلب منك التوقف عن تناول الدواء.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة – أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملات من بين 100

- ألم في الثديين، حساسية في الثديين، اضطرابات في الدورة الشهرية، أنزفة بين طمثين.
- صداع، مزاج اكتئابي.
- صداع نصفي (شقيقة).
- غثيان.
- إفراز مهبلي أبيض لزج، عدوى فطرية في المهبل.

أعراض جانبية غير شائعة – أعراض تظهر لدى 10-1 من مستعملات بين 1,000

- تضخم الثديين.
- تغيرات في الرغبة الجنسية.
- ضغط الدم مرتفع، ضغط الدم منخفض.
- تقيؤات، إسهالات.
- حب الشباب، حكة حادة، طفح جلدي شديد، تساقط شعر (Alopecia).
- عدوى مهبلية.
- احتباس المسوائل.
- تغييرات بوزن الجسم.

- أعراض جانبية نادرة – أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملات من بين 10,000
- رد فعل حسسي (فرط حساسية)، ربو.
 - إفرازات من الثديين.
 - خلل في السمع.
 - حمامي عقدي (ظاهره جلدية تتميز بانتفاخ أحمر ومؤلم للجلد)، حمامي متعددة الأشكال (ظاهره جلدية تتميز بطفح جلدي يشمل آفات حمراء ذات شكل "يشبه الهدف" أو جروح).
 - تخثرات دموية ضارة في الوريد أو في الشريان مثل:
 - في الرجل أو في القدم (جلطة الأوردة العميقة)
 - في الرئة (انصمام رئوي)

- نوبة قلبية
 - سكتة دماغية
 - سكتة دماغية بسيطة (mini-stroke) أو أعراض مؤقتة تشبه السكتة الدماغية وتعرف على أنها نوبة إقفارية عابرة (TIA)
 - تخثرات دموية في الكبد، في المعدة أو الأمعاء، في الكلى أو العينين
- قد تكون الخطورة لتطور تخثر دموي أكبر إذا وجد لديك أي عامل آخر يزيد من هذه الخطورة (المعلومات إضافية عن الحالات التي تزيد الخطورة لتخثرات دموية وأعراض التخثر الدموي، أنظري الفقرة 2).
- إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنبي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسببي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات. استشري الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست بحاجتها. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:
Lactose monohydrate, maize starch, pregelatinized starch (from maize starch), povidone, magnesium stearate, hypromellose, macrogol 6000, talc, titanium dioxide (E171), ferric oxide pigment – yellow (E172)
- يحتوي كل قرص على: 48,17 ملг لاكتوز مونوهيدرات
كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟
أقراص ياسمين مطلية، مستديرة، ذات لون أصفر فاتح، محدبة الجانبين، من جانب واحد تبرز العلامة "DO" داخل مسدس.

تتوفر الأقراص ضمن لويحات (بلیستر) بعبوات 21 قرصاً. تحتوي كل علبة على عبوة واحدة أو 3 عبوات.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات

- صاحب الامتياز وعنوانه: بايير إسرائيل م.ض.، شارع هاحاراش 36، هود هشارون 4527702.
- اسم المنتج وعنوانه: بايير فارما آي.جي.، برلين، ألمانيا.
- تم تحريرها في آذار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00 30220 02 122