

**٤ استعمال الدواء واستهلاك الكحول**  
لا يجوز شرب المشروبات الكحوليةثناء العلاج بترانكسال. قد يفاقم الكحول عرضي الميل إلى النوم والدوار.

**٥ العمل وأسخدام الأدوية**  
قد تسبب الأدوية مثل ترانكسال أعراض الاعتماد الخلقية. يجب استشارة الطبيب إذا كنت حمالة أو تحفظين للحمل. يجب إعلام الطبيب فوراً إذا حملت خلال فترة العلاج بترانكسال. سفترر الطبيب ما إذا كان عليك مواصلة استعمال الدواء خلال فترة الحمل.  
تفرز المادة المغالة الموجودة في الدواء في حليب الأم لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بالدواء.

**٦ السياقة وأسخدام الماكينات**  
استعمل هذا الدواء قد يقلل القيمة و لذلك يتوجب الحذر عندقيادة السيارة، تشغيل الماكينات الخطيرة و عند القيام بأى نشاط يتطلب القيادة.

**٧ كيف تستحصل الدواء؟**  
يجب استعمال المستحضر دواماً وفق تعليمات الطبيب.  
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكداً من الجرعة الراوحة ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

**الجرعة الدوائية**: تتفاوت حسب طبيعة المرض وعمر المريض وفق الجرعة الراوحة المذكورة آعلاه [١-٢]:

٩٥-٥٠ مل في الماء (الإمكان تناولها جرعة إضافية إذا كانت لا تتعدي ١٥ مل، أما إذا كانت الجرعة الدوائية أكبر من ذلك فيجب تناولها إلى ما بين جرعة إضافية إلى ثلث جرعات).  
بالنسبة للمرات المقصورة (التي فيها أقل من ١٥ مل في الجرعة)  
يجب استعمال كبسولات من ٥ مل فقط.

**الجرعة الدوائية للأولاد:**  
للأعمار ١٢-٦ سنة: ١٥-١٣ مل في الماء بجرعات مقتضنة.  
يُمنع تجاوز الجرعة المقصورة بها.

يجب أن تكون هذه العلاج قصيرة في المستطاع. يجب إيقاف العلاج بشكل تدريجي - انظر مقدمة الشارة.

لا يجوز المصنه! يجب إيقاف الدواء مع القليل من الماء.  
لا تتوارد معلومات بخصوص فتح الكبسولة وثير محتواها.  
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا مدد بيلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة فور تذكرك واستشر الطبيب.  
يجب المحافظة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على هناك الصحبة، فلا يجوز إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب، وأيضاً عندما يجب إجراء الإيقاف بشكل تدريجي للارتفاع عن أعراض الانسحاب.

إذا نسيت تناول الدواء فقد تشتراك لديك أعراض الانسحاب - انظر مقدمة الشارة.

قبل إيقاف العلاج يجب مناقشة تناوح ذلك مع الطبيب.  
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع المقصص وتأكد من الجرعة التي من مرتبة تناول فيها دواعه. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

- أحياناً، قد يؤدي الاستعمال المتواصل للدواء إلى حدوث تغيرات في أسلوب السلوك وإلى شعور الآفات الروسية.
- يوصي بتخفيض доза عند الشعور خائفاً لدى المرضى، لأن الدواء يقلل البصرة ويخيل أحياناً بتناسق حركات الجسم، ولذلك هناك تخوف من التعرُّف أو السقوط.

استعمال هذا الدواء مع أنوبيات من فصيلة الأفيونيات، مع أنوبيات أخرى مثل طبقة الجهاز الهضمي المركزي (ما في ذلك المختبرات) أو مع الكحول قد يسبب شعوراً بالميل الشديد إلى النوم، صعوبات في التنفس (تشبيه تقني)، غيبوبة وموت.

## ١. لأى غرض مخصص هذا الدواء؟

علاج وتحفيض هاتن التوتر والقلق.  
تحفيض أعراض الانسحاب من الكحول.  
علاج مزيف لمنع نوع معين من المرض.  
**الفصيلة العلاجية**: تنتهي المادة الفعالة إلى فصيلة البيزنز وديازيبينات.

## ٢. قبل استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (ارتجاع) للمادة الفعالة أو لأى واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (اظهر البند ٦)
- كنت مرضعاً
- كنت تعاني من جلازوكوما ضيقية الزاوية

## ٣. تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- قبل العلاج بترانكسال، اخبر الطبيب إذا:
  - كان لديك اثنان أو في رطوبة الكبد أو الكلية
  - كان لديك افتقار أو تصرفات انتشارية
  - وجد لديك أعراض من السلس أو التفكير غير الاعتياديين (ردود فعل هذانية)
- قد يسبب استعمال المذاق اعتماداً
- بالنسبة للمرضى الذين استعملوا هذا المستحضر لفترة متواصلة، فلا يجوز التوقف عن تناول الدواء مع القليل من الماء.
- لا تتوارد معلومات بخصوص فتح الكبسولة وثير محتواها.
- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا مدد بيلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة فور تذكرك واستشر الطبيب.

**٤. الأدواء والمرافق**  
هذا الدواء غير مخصص كعلاج مزيف لمنع نوع معين من المرض لدى الأولاد الذين سنهن دون ٦-٩.

هذا الدواء غير مخصص كعلاج وتحفيض حالات التوتر والقلق وتحفيض أعراض الانسحاب من الكحول لدى الأولاد الذين سنهن دون ٦.

**٥. الفوائد والآثار الجانبية**  
إذا كنت تستعمل الدواء، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

**٦. استعمال الدواء والطعام**  
يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه لأنه ليس للطعم تأثير على الدواء إطلاقاً.

## نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة مستحضرات ١٩٨٦

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

## ترانكسال ٥ ملغم كبسولات ترانكسال ١٥ ملغم كبسولات

المادة الفعالة وبنتها:

ترانكسال ٥ ملغم: تحتوى كل كبسولة على كلورازيبات البوتاسيوم Potassium Clorazept 5 mg

ترانكسال ١٥ ملغم: تحتوى كل كبسولة على كلورازيبات البوتاسيوم Potassium Clorazept 15 mg

للالطام على المواد غير الفلفل ومسبيبات الأرجحية في المستحضر - انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوى هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

تشاتك فكار لاضراره بالنفس أو فكار انتقامارية لدى عدد من الاشخاص الذين تناولوا الدواء بالفعل أو لأدوية المضادة للصرع مثل ترانكسال. إذا كانت لديك افتقار كهين في وقت ما خلال فترة العلاج بالدواء فتحوه فوراً إلى الطبيب!

**٧. المقدمة**: مخصصة فقط لمن كان التوتر والقلق داعي استعماله للدواء.

يُنتهي هذا الدواء إلى فصيلة البيزنز وديازيبينات، التي تتصف بصفات خاصة تستوجب المخدر الشديد عند استعمالها.

• **٨. هناك أهمية كبيرة لل關注ة المتابعة المتباعدة عن كتب عند استعمال هذا الدواء.**

عند استعمالك لهذا الدواء، احرص على مراعاة الطبيب بعد ٤-٤ أيام، لأن العلاج يخص فترات قصيرة فحسب.

قد يؤدي الاستعمال المتواصل للدواء إلى تقليل تأثير الدواء.

قد يسبب الاستعمال المتواصل عرض الاعتماد الشديد، الذي يجعل إيقاف استعمال المرض الداء صعباً.

قد يكون إيقاف العلاج بشكل غير مرافق صعباً باعراض الالام البطن، التقيؤات، العثيان، التعرق، الشاشجات، التقلصات والالام في العضلات.



إذا توقفت لديك أسللة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### ٤. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ترانكسل إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا ظهر أحد الأعراض التالية:

- أفكار انتحارية
- حالات انتحارية
- اكتتاب حديث أو أكثر خطورة
- فراق حديث أو أكثر خطورة
- احساس بالعصبية أو تملل
- نوبات فرق
- اضطرابات في النوم
- تهيجية حديثة أو أكثر خطورة
- عدائية، غضب أو عنف
- الاستسلام للدواهي في النشاط أو الكلام (هوس)
- زيادة مترافقه في النشاط أو الكلام العاديه
- تغير في أنماط السلوك العاديه

#### اعراض جانبية شائعة (common) - اعراض تظهر عند 10-100% من المستعملين

ناعس

دوار

مشاكل في الجهاز الهضمي

تشوش الرؤية

جفاف الفم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية تقبع العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المئصلة للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

#### ٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

امض النسمة! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأو الأطفال الرضع و المجال رؤيتهم، وبذلك ستمتنع النسمة. لا تتسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الضوء والرطوبة، في مكان جاف، في درجة حرارة أقل من 25°C. يمكن الاستعمال لمدة شهرين كحد أقصى منذ يوم فتحه.

