

**עלון לזרזן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986**

התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

## טובי פודהרל 28 מ"ג

**כמוסות קשות של אבקה לשאיפה**

לכל מגש מכילה: טוברמיצין (Tobramycin) 28 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים בתרופה – ראה טעף 6 "מידע נוסף".

**קיא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

- למה מיועדת התרופה?** **טובי פודהרל** 28 מ"ג מיועד לטיפול בחולי ציסטיק פיברוזיס מגיל 6 שנים ומעלה עם זיהום ריאתי כרוני בחיידק הספואדומונס אירוגניזוס.

**קבוצה תרופית:** אנטיביוטיקה מקבוצת האמינוגליקוזידים.
**טובי פודהרל** מכיל אנטיביוטיקה בשם טוברמיצין.
**כמוסות טובי פודהרל** מכילות אבקה המיועדת לשאיפה. בכמוסות **טובי פודהרל** המיועדות לשאיפה דרך הפה יש להשתמש רק עם המשאף המצורף לאריזה.
כאשר שאפים את תכולת הכמוסות של **טובי פודהרל**, האנטיביוטיקה יכולה להגיע ישירות לריאות כדי לפעול נגד החיידק הגורם לזיהום ולשפר את נשימתך.
ספואדומנס אירוגניזוס הוא חיידק שכיח מאוד המזהם את הריאות של כמעט כל מי שיש לו ציסטיק פיברוזיס בזמן כלשונו במהלך חייו. אנשים מסוימים לא מקבלים את הזיהום הזה אלא בשלב מאוחר בחייהם, בעוד אחרים מקבלים אותו בגיל צעיר מאוד. זהו אחד מהחיידקים הכי מסתירים לאנשים עם ציסטיק פיברוזיס. אם לא פועלים נגד הזיהום באופן הולם, הוא ממשיך להזיק לריאות ולגרום לבעיות נשימה נוספות.

### 2. לפני השימוש בתרופה

<p>• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (טוברמיצין). אנטיביוטיקה אחרת מסוג אמינוגליקוזיד או לכל אחד מהמרכיבים הנספחים אשר מכילה התרופה (ראה טעף 6). • אם זה נכון לגביך, <b>ספר לרופא מבלי ליטול טובי פודהרל.</b> <b>אם אתה חושב שאתה עשוי להיות אלרגי,</b> היוועץ ברופא.</p>
--

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

**לפני הטיפול בטובי פודהרל, ספר לרופא אם יש לך או אי פעם היו לך:**

- בעיות שמיעה (כולל רעשים באוזניים וסחרחורת)
- בעיות בכליות
- קושי לא רגיל לנושם עם צפצפוסים בזמן הנשימה או שיעול, לחץ בחזה
- דם בכיח (נפלט בזמן שיעול)
- חולשה בשרירים שנמשכת או שמתמרה עם הזמן, תסמין שלרוב קשור למצבים כגון מיאסתניה או מחלת פרקינסון.
- אם אתה בן 65 ומעלה, הרופא שלך עשוי לערוך בדיקות נוספות כדי להחליט אם **טובי פודהרל** מתאים לך.

שאיפת תרופות יכולה לגרום ללחץ בחזה ולצפצפוסים בזמן הנשימה, זה יכול לקרות מייד לאחר שאיפה של **טובי פודהרל**. הרופא יפקח על נטילת המנה הראשונה שלך של **טובי פודהרל** ויבדוק את תפקוד הריאות שלך לפני ואחרי נטילת התרופה. הרופא שלך עשוי לבקש ממך ליטול תרופות מתאימות אחרות לפני נטילת **טובי פודהרל**. תרופות לשאיפה שפיות גם לגרום לשיעול, זה יכול לקרות עם **טובי פודהרל**. היוועץ ברופא אם השיעול ממושך ומזווה נטל עבורך.

זנים של החיידק ספואדומנס עלולים לפתח עמידות לטיפול אנטיביוטי עם הזמן. המשמעות היא שיתכן שעם הזמן, הטיפול **בטובי פודהרל** לא יהיה יעיל כפי שאמור להיות. היוועץ ברופא אם אתה מודאג לגבי זה.

אם אתה לוקח טוברמיצין או אנטיביוטיקה אחרת מסוג אמינוגליקוזיד בהרדקה, זה יכול לפעמים לגרום לאובדן שמיעה, סחרחורת ונזק כליליה.

#### ילדים

**טובי פודהרל** אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

#### תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

מזמלך לא ליטול את התרופות הבאות כאשר אתה לוקח **טובי פודהרל**:

- פורוסמיד או חומצה אתקרנית, משתנים
- תרופות אחרות בעלות תכונה משתנה כגון אוריאיה או מניטול הניתן דרך הוריד
- תרופות אחרות שששויות לפגוע בכליות או בשמיעה שלך.

התרופות הבאות עלולות העלות את הסיכוי להופעת תופעות מזיקות אם הן ניתנות לך כאשר אתה מקבל **בהרדקה** טוברמיצין או אנטיביוטיקה אחרת מסוג אמינוגליקוזיד:

- אמנוטיצין B, צפלוטין, פולימיקטינס (לטיפול בזיהומים חידיקים), ציקלופורין, טודקלימוס (לדיכוי פעולות המערכת החיסונית), תרופות אלה עלולות להזיק לכליות.
- תרכובות פלטינים כגון קרפופלטין וציספלטין (לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן). תרופות אלה עלולות להזיק לכלית או לשמיעה שלך.
- אנטי-כולינאטראזות כגון נאוסטיגמין ופירדוסטיגמין (לטיפול בחולשת שרירים), או בוטוליםם טוקסין. תרופות אלה עלולות לגרום להופעת או החמרת חולשת שרירים.

אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות לעיל, יש לדון עם הרופא לפני נטילת **טובי פודהרל**.

#### היריון והנקה

אם את היריון או מניקה, אם את תשובת שיתכן שאת בהיריון או מתנכנת היריון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

לא ידוע אם שאיפת תרופה זו בזמן היריון גורמת לתופעות לואי. כאשר טוברמיצין ואנטיביוטיקות אחרות מסוג אמינוגליקוזיד ניתנות בהרדקה, הן יכולות לגרום נזק לעובר כגון חירשות.

אם את מניקה, עליך לדבר עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

**נהיגה ושימוש במכוונת**
**טובי פודהרל** לא אמור להשפיע (או שהשפעתו זניחה) על היכולת לנהוג ולהשתמש במכוונת.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

על הטפלים לתת עזרה לילדים המתחילים טיפול ב**טובי פודהרל**, בעיקר אלו שבהם יש 10 שנים ומטה, ולהמשיך לפקח עליהם עד שהם מסוגלים להשתמש ב**טובי פודהרל** כיואת בלי עזרה.

#### המינון המוקבל בדרך כלל הוא:

תזן של 4 כמוסות צריך להילקח בשאיפה פעמיים ביום (4 כמוסות בבוקר ו-4 כמוסות בערב), תוך שימוש במשאף הפודהרל.

המינון זהה עבור כל המטופלים מגיל 6 ומעלה. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

לקיחת **טובי פודהרל** באותו הזמן בכל יום תעזור לך לזכור מתי ליטול את התרופה.

• תזן של 4 כמוסות צריך להילקח בשאיפה בבוקר תוך שימוש במשאף המצורף לאריזה.
• תזן של 4 כמוסות צריך להילקח בשאיפה בערב תוך שימוש במשאף המצורף לאריזה.
יש להשאיר מרווח הקרוב לכל האפשר ל-12 שעות בין המנה של הבוקר (תזן של 4 כמוסות בשאיפה) לבין המנה של הערב (תזן של 4 כמוסות בשאיפה), ולא פחות מ-6 שעות בין המנות.

אם אתה נוטל מספר טיפולים שונים בשאיפה ומטופל בתרפיות אחרות לציסטיק פיברוזיס, יש ליטול **טובי פודהרל** בסוף, לאחר סיום כל הטיפולים האחרים. יש לבדוק עם הרופא את סדר התרופות.

#### צורת הנטילה

- לישמוש בשאיפה בלבד.
- אין לבלוע את הכמוסות.
- יש להשתמש בכמוסות עם המשאף המצורף לאריזה זו בלבד. יש להשאיר את הכמוסות במגש הכמוסות עד שתטטרך להשתמש בהן.
- כאשר אתה מתחיל אריזה שבועית חדשה של כמוסות, השתמש במשאף החדש שנמצא באריזה. יש להשתמש בכל משאף למשך 7 ימים בלבד.
- יאה טעף "הוראות שימוש בטובי פודהרל" בסוף העלון, למידע נוסף על אופן השימוש במשאף.

#### משך השימוש

לאחר נטילת **טובי פודהרל** במשך 28 יום, עליך לתקופת הספקה של 28 יום בהם לא תשאף **טובי פודהרל** בכלל, לפני שמתחילים מחזור נוסף. חשוב שתמשיך להשתמש בתרופה פעמיים בכל יום במהלך 28 הימים בהם אתה מקבל טיפול וששתמור על המחזוריות של 28 יום עם תרופה ו-28 יום בלי תרופה.

יש להמשיך לקחת **טובי פודהרל** בהתאם להוראות הרופא. אם יש לך שאלות לגבי כמה זמן יש לקחת **טובי פודהרל**, פנה לרופא או לרוקח. יש לעקוב בקפידה אחר הוראות הרופא.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם שאפת מנת יתר של **טובי פודהרל**, פנה לרופא בהקדם האפשרי. אם כמוסות **טובי פודהרל** נלקחו בבליעה, אל תדאג, אך פנה לרופא בהקדם האפשרי.

#### אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת לקחת **טובי פודהרל** ויש לפחות 6 שעות עד ללקיחת המנה הבאה, קח את המנה בהקדם האפשרי. אחרת, יש להמתין למנה הבאה. בשום אופן אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

**אין ליטול תרופות בחושיך בדיוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**טובי פודהרל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

לאנשים עם ציסטיק פיברוזיס יש תסמינים רבים של המחלה. תסמינים אלו עדיין יכולים להתרחש כאשר לוקחים **טובי פודהרל**, אך לא חמורים להיות תכופים יותר או חמורים יותר מאשר לפני הטיפול. אם אתה מרגיש כי מחלת הריאות שלך חממרה כאשר אתה לוקח **טובי פודהרל**, יש לפנות מייד לרופא.

#### תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות

**יש להפסיק את הטיפול בטובי פודהרל ולפנות מייד לרופא אם יש לך:**

- קושי לא רגיל לנושם עם צפצפוסים בזמן הנשימה או שיעול ולחץ בחזה (שכיח).

#### יש לפנות לרופא מייד אם יש לך:

- שיעול דמי (שיח מואד).
- ירידה בשמיעה (צלצולים באוזניים הם סימן אזהרה אפשרי לאובדן שמיעה), רעשים (כגון שריקות) באוזניים (שכיח).

### תופעות לוואי נוספות:

**תופעות לוואי שכוחות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- קוצר נשימה
- שיעול, שיעול עם ליחה, שינוי בקול (צרידות)
- נאב גרון
- חום

**תופעות לוואי שכוחות** (תופעות שמופיעות ב-1 ל-10 משתמשים מתוך 100):

- צפצפוסים בזמן הנשימה, חרחורים בחזה (שרחשים)
- אי-נוחות בחזה
- גודש באף
- דמקום מהאף
- הימנים בחילה
- ששלוש
- פריחה
- הפרעה בחוש הטעם
- אובדן הקול

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה** (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- הרגשה כללית לא טובה
- שינוי בצבע הכיח הנפלט בשיעול

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חממרה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה עליון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כינוסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו\או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

**•תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-30°C. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מלחות. יש לאחסן את המשאף כשהוא סגור היטב בקופסה שלו כשהוא אינו בשימוש. **כאשר מוציאים כמוסה מהמגש, יש להשתמש בה מייד.**

•אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יטיעו להגן על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Hypromellose, sulfuric acid, DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine), purified water, carrageenan (E407), calcium chloride, potassium chloride, carnauba wax, blue ink (shellac, indigo carmine aluminium lake (E132), N-butyl alcohol, titanium dioxide (E171), propylene glycol (E1520), isopropyl alcohol).

**כיצד נראית התרופה ומה תזן האריזה**

**טובי פודהרל** 28 מ"ג כמוסות קשות לשאיפה מכילות אבקה לבנה או כמעט לבנה בתוך כמוסות שקופות ללא צבע, עליון מודפסים בבבע כחול "MYL TPH" על חלק אחד ולוגו מיילן על החלק השני.

כל אריזה חודשית מכילה 224 כמוסות ו-5 שאספים (4 אריזות שבועיות המכילות 56 כמוסות קשות ומשאף + משאף רזרבי אחד).

כל אריזה שבועית מכילה 7 בליסטרים (מגש כמוסות), כשכל בליסטר יש 8 כמוסות, ומשאף פודהרל בקופסת האחסון שלו.

**שם היצרן ונתובתו:** מיילן פארמסטוקילס אינק., שטיינהאוזן, שוויץ

נערכ בדצמבר 2021 בהתאם להחיות משרד הבריאות.

**מספר ירשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 00-33412-05-147

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, על זון נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**נעל ירשום: דקסכ"בנים**  
רח' זקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

## הוראות שימוש בטובי פודהרל

יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון. על מנת ללמוד כיצד להשתמש ולטפל במשאף הפודהרל.

**תכולת אריזה חודשית של טובי פודהרל:**

כל אריזה חודשית מכילה:

- 4 אריזות שבועיות (ראו תכולה בהמשך).
- 1 משאף רזרבי (משאף הפודהרל) עם קופסת האחסון שלו.

**תכולת אריזה שבועית של טובי פודהרל:**

כל אריזה שבועית מכילה:

- 1 משאף (משאף הפודהרל) עם קופסת האחסון שלו.
- 7 מגשי כמוסות (מגש אחד לכל יום בשבוע).
- 1 כל מגש כמוסות מכיל 8 כמוסות (בהתאמה למינון היומי: תזן של 4 כמוסות לשיאפה בבוקר ותזן של 4 כמוסות לשאיפה בערב).

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<b>מגש כמוסות</b>	<b>משאף</b>	<b>קופסת אחסון</b>

### אין לשאוף את התרופה עם משאף הפודהרל

- יש להשתמש רק במשאף הפודהרל המצורף לאריזה.** אין להשתמש בכמוסות **טובי פודהרל** עם כל אביזר אחר, ואין להשתמש במשאף הפודהרל כדי לקחת כל תרופה אחרת.
- כשמתחילים אריזה שבועית חדשה של כמוסות, יש להשתמש במשאף הפודהרל החדש המצורף לאריזה. יש להשתמש בכל משאף פודהרל למשך 7 ימים בלבד. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות ומשאפים שאינם בשימוש עוד.
- אין לבלוע את הכמוסות.** האבקה בתוך הכמוסות מיועדת לשאיפה.
- יש לשמור תמיד את הכמוסות בתוך אריזת המגש עד שעליך להשתמש בהן. אין להוציא מראש את הכמוסות מאריזת המגש.
- יש לאחסן את משאף הפודהרל בקופסת האחסון שלו, הסגורה היטב, כשהוא אינו בשימוש.

1. יש לרחוץ את הידיים <b>ולייבש אותן לגמרי.</b>	<span></span>
2. <b>ממש לפני השימוש,</b> יש להוציא את המשאף מתוך קופסת האחסון שלו על ידי הרחזת הבסיס וסיבוב החלק העליון של הקופסה נגד כיוון השעון. <ul style="list-style-type: none"><li>יש לשים את מסכה הקופסה בצד.</li> <li>יש להתבונן במשאף כדי לוודא שהוא לא ניזוק או התלכך.</li> <li>יש להעמיד את המשאף בבסיס הקופסה.</li></ul>	<span></span>
3. <b>יש להחזיק</b> בגוף המשאף ולהבריג החוצה את הפייה נגד כיוון השעון. <ul style="list-style-type: none"><li>יש להניח את הפייה בצד, על משטח נקי ויבש.</li></ul>	<span></span>
4. יש לקרוע לאורך ואחר כך לרוחב הניקובים במגש הכמוסות, כמתאר בתמונות (1) ו-(2).	<span></span>
5. <b>יש לקלף את רידי האלמיניום</b> ממגש הכמוסות, כך שתיושף כמוסה אחת בלבד. <ul style="list-style-type: none"><li>יש להוציא את הכמוסה מהמגש.</li></ul>	<span></span>
6. <b>יש להכניס מייד את הכמוסה לתוך התא במשאף (1).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>יש להחזיר את הפייה למקום.</li> <li>יש להבריג את הפייה בחוזקה עד שהיא נעצרת. אין להדק חזק מדי (2).</li></ul>	<span></span>
7. <b>יש להחזיק את המשאף עם הפייה כלפי מטה.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>יש לנקב את הכמוסה על ידי לחיצה על הכפתור החלול בחוזקה עם האגודל עד כמה שניתן, לאחר מכן לשחרר את הכפתור.</li> <li>כעת ניתן לשאוף את התרופה בשתי שאיפות נפרדות (שולבים 8 ו-9).</li></ul>	<span></span>
8. <b>שאיפת תזן כמוסה – נשימה ראשונה:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>לפני ששמים את הפייה בתוך הפה, יש לנשוף ("להוציא" אוויר) נשיפה מלאה הרחק מן המשאף.</li> <li>יש למקם את הפה מסביב לפייה - ליצירת אטימה הדוקה.</li> <li>יש לשאוף ("להכניס" אוויר לריאות) עמוק את האבקה בנשימה אחת.</li> <li>יש להוציא את המשאף מהפה, ולהחזיק (לעצור) את הנשימה למשך 5-7 שניות.</li> <li>לאחר מכן יש לנשוף באופן רגיל, הרחק מהמשאף.</li></ul>	<span></span>

9. **שאיפת תזן כמוסה – נשימה שנייה:**

- יש לקחת מספר נשימות רגילות הרחק מהמשאף.
- כשאתה מוכן, יש לקחת את הנשימה השנייה, תוך חזרה על שלב 8, תוך שימוש באותה כמוסה.

10. יש להבריג החוצה את הפייה (1) ולהוציא את הכמוסה מהתא (2).	<span></span>
11. <b>יש להתבונן בכמוסה המשושפת.</b> עליה <b>להיראות מנוקבת וריקה.</b> אם היא ריקה, יש להשליך את הכמוסה.	<span></span>
אם הכמוסה מנוקבת אך עדיין מכילה אבקה: <ul style="list-style-type: none"><li>יש להכניס את הכמוסה חזרה לתוך תא המשאף (שלב 6), על הצד המנוקב של הכמוסה להיכנס ראשון.</li> <li>יש להחזיר את הפייה ולחזור על שלבים 9, 8, 7, 6.</li></ul>	<span></span>
אם הכמוסה אינה נראית מנוקבת: <ul style="list-style-type: none"><li>יש לשים את הכמוסה חזרה בתוך תא המשאף (שלב 6).</li> <li>יש להחזיר את הפייה ולחזור על שלבים 8, 7, 8, 9.</li> <li><b>אם</b> לאחר מכן הכמוסה עדיין מלאה ונראית לא מנוקבת, יש להחליף את המשאף עם המשאף הרזרבי (נמצא באריזה החדושת) ולחזור על שלבים 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.</li></ul>	<span></span>
12. יש לקחת את 3 הכמוסות האחרות באותו אופן. <ul style="list-style-type: none"><li>כך שעבור כל כמוסה נותרת, יש לחזור על שלבים 6, 7, 8, 9, 10, 11.</li> <li>יש להשליך את כל הכמוסות הריקות.</li></ul>	<span></span>
13. <b>יש להחזיר את הפייה ולהבריג אותה בחוזקה</b> עד שהיא נעצרת. לאחר שמל המנה (4 כמוסות) נשאפה, יש לנגב את הפייה עם בד נקי ויבש. <ul style="list-style-type: none"><li><b>אין לשלוק את המשאף עם מים.</b></li></ul>	<span></span>
14. <b>יש לשים את המשאף חזרה בקופסת האחסון.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>יש לטובב את החלק העליון של קופסת האחסון עם כיוון השעון עד לסגירה מלאה.</li></ul>	<span></span>

**יש לזכור:**

- לשימוש בשאיפה (אינהלציה) בלבד.
- אין לבלוע את הכמוסות של טובי פודהרל.**

**יש להשתמש רק במשאף המצורף לאריזה זו.**

- תמיד יש לשמור את הכמוסות של **טובי פודהרל** במגש הכמוסות. יש להוציא את הכמוסה רק ממש לפני שעוברים להשתמש בה. אין לאחסן את הכמוסות בתוך המשאף.
- תמיד יש לשמור את הכמוסות של **טובי פודהרל** והמשאף במקום יבש.
- לעולם אין לשים את הכמוסה של **טובי פודהרל** ישירות בתוך הפייה של המשאף.
- תמיד יש להחזיק את המשאף עם הפייה כלפי מטה כאשר מנקבים את הכמוסה.
- אין ללחוץ על כפתור הניקוב יותר מפעם אחת בכל שימוש.
- לעולם אין לנשוף לתוך הפייה של המשאף.
- לעולם אין לטסוף את משאף הפודהרל במים. יש לשמור אותו יבש ולאחסנו בקופסת האחסון שלו.

**מידע נוסף:**

לעיתים, חתיכות קטנות מאוד של הכמוסה יכולות לעבור את המסך ולהיכנס לתוך הפה.

- אם זה קורה, ייתכן שתוכל להרגיש את החתיכות האלה על הלשון.

- בלעיה או שאיפה של חתיכות אלה אינה מזיקה.

- הסיכיים של הכמוסה להישבר לחתיכות עולים אם הכמוסה מנוקבת בטעות יותר מפעם אחת או אם המשאף לא מוחזק עם הפייה כלפי מטה במהלך שלב 7.