



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בנליסטה 200 מ"ג

תמיסה להזרקה בעט מזרק מוכן לשימוש

כל עט מזרק מוכן לשימוש של 1 מ"ל מכיל 200 מ"ג בלימומאב (Belimumab).
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגנים ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בנליסטה 200 מ"ג מיועדת כתוספת טיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) אדמנטית מערכתית (SLE) פעילה, חיובית לנוגדנים אוטואימוניים, עם רמת פעילות גבוהה של המחלה (למשל נוכחות נוגדנים נגד דנ"א דו גדילי (dsDNA) ורמת משלים נמוכה (low complement)) למרות הטיפול הרגיל.

בנליסטה מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים עם זאבת (לופוס) נפריטיס פעילה בשילוב עם טיפולים מדכאי מערכת חיסון.

קבוצה תרפויטית: מדכא חיסון סלקטיבי.

זאבת היא מחלה שבה מערכת החיסון (המערכת שנלחמת בזיהום) תוקפת את התאים והרקמות שלך, וגורמת לדלקת ולפגיעה באיברים. המחלה יכולה לפגוע כמעט בכל איבר בגוף וחושבים שהיא קשורה לסוג של תאי דם לבנים, הנקראים תאי B.

בנליסטה 200 מ"ג מכילה **בלימומאב** (נוגדן מונוקלונאלי אנושי). היא מפחיתה את מספר תאי B בדמך באמצעות חסימת הפעילות של BlyS, חלבון העוזר לתאי B לחיות זמן רב יותר ונמצא ברמות גבוהות באנשים עם זאבת.
אתה תקבל בנליסטה 200 מ"ג בנוסף לטיפול הרגיל שלך לזאבת.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לבלימומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).
- ← **בדוק עם הרופא שלך** אם ייתכן שזה חל עליך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בבנליסטה 200 מ"ג, ספר לרופא אם:

- יש לך כרגע זיהום או אם יש לך זיהום מתמשך או אם אתה סובל מזיהומים לעיתים קרובות. הרופא שלך יחליט אם ניתן לתת לך בבנליסטה 200 מ"ג.
- אתה מתכנן להתחסן או שהתחסנת ב-30 הימים האחרונים. ישנם חיסונים שאין לתת אותם בסמוך או במהלך טיפול בבנליסטה 200 מ"ג.
- הזאת שלך משפיעה על מערכת העצבים שלך.
- הינך נשא של HIV (נגיף הכשל החיסוני האנושי) או אם יש לך רמות נמוכות של אימונוגלובולינים.
- יש לך או הייתה לך דלקת כבד נגיפית מסוג B או C.
- עברת השתלת איברים או מח עצם או תאי גזע.
- היה לך סרטן.
- ← ספר לרופא שלך אם ייתכן שאחד מאלה חל עליך.

דיכאון והתאבדות

קיימים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדניות, וניסיונות התאבדות לרבות התאבדות במהלך הטיפול עם בבנליסטה. ספר לרופא שלך אם יש לך היסטוריה של מצבים אלה. אם הינך חש בתסמינים חדשים או החמרה בתסמינים בכל זמן שהוא:

← פנה לרופא שלך או גש מייד לבית החולים.

אם אתה מדוכא או שיש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להתאבד, ייתכן ותמצא שזה מועיל לספר לקרוב משפחה או חבר קרוב ולבקש מהם לקרוא עלון זה. תוכל לבקש מהם לומר לך אם הם מודאגים לגבי שינויים במצב הרוח או ההתנהגות שלך.

שים לב לתסמינים חשובים

מטופלים הנוטלים תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלהם עלולים להיות בסיכון מוגבר להדבק בזיהומים, כולל בזיהום מוחי נדיר אך חמור הקרוי לויקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת.

(PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy).

← למידע נוסף קרא על "סיכון מוגבר לזיהום מוחי" בסעיף 4 בעלון זה.

ילדים ומתבגרים:

אל תיתן בבנליסטה 200 מ"ג לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד אם אתה לוקח תרופות המשפיעות על מערכת החיסון, כולל כל תרופה המשפיעה על תאי B שלך (משמשת לטיפול בסרטן או במחלות דלקתיות).

← השימוש בתרופות כאלו בשילוב עם בבנליסטה 200 מ"ג עלול לגרום למערכת החיסון שלך להיות פחות יעילה. הדבר עלול להעלות את הסיכון שלך להדבק בזיהום חמור.

היריון והנקה

אמצעי מניעה בגיל הפוריות

השתמשי באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול בבנליסטה 200 מ"ג ובמהלך 4 חודשים לפחות לאחר המנה האחרונה.

היריון

בדרך כלל, בנליסטה 200 מ"ג אינה מומלצת אם את בהיריון.

- ספרי לרופא שלך אם את בהיריון, אם את חושבת שאת בהיריון או אם את מתכננת להרות. הרופא שלך יחליט אם את יכולה להשתמש בבנליסטה 200 מ"ג.
- אם נכנסת להיריון בזמן שאת מטופלת בבנליסטה 200 מ"ג, ספרי על כך לרופא שלך.

הנקה

ספרי לרופא שלך אם את מניקה. סביר להניח שבנליסטה 200 מ"ג יכולה לעבור לחלב האם. הרופא שלך ישוחח איתך האם עלייך להפסיק את הטיפול בבנליסטה 200 מ"ג בזמן שאת מניקה או האם עלייך להפסיק להניק.

נהיגה ושימוש במכונות

בנליסטה 200 מ"ג יכולה לגרום לתופעות לוואי העלולות לפגוע ביכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, לכן התרופה נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. בנליסטה 200 מ"ג ניתנת בזריקה מתחת לעור שלך באותו היום בכל שבוע. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

זאבת (לופוס) אדמנתית מערכתית (SLE)

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 200 מ"ג (תכולה מלאה של עט אחד) פעם בשבוע.

זאבת (לופוס) נפריטיס

המינון המקובל עשוי להשתנות. הרופא שלך יקבע את המינון הנכון בשבילך, שהוא:

- מנה של 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.
- או
- מנה של 400 מ"ג (תוכן מלא של שני עטים באותו היום) פעם בשבוע למשך 4 שבועות. בהמשך, המינון המומלץ הוא 200 מ"ג (תוכן מלא של עט אחד) פעם בשבוע.

אם אתה מעוניין לשנות את יום ההזרקה:

הזרק מנה ביום החדש (אפילו אם עבר פחות משבוע מהמנה האחרונה שלך). מאותו יום המשך עם לוח הזמנים השבועי החדש.

הזרקת בנליסטה 200 מ"ג:

האחות או הרופא שלך יראו לך או למי שמטפל בך כיצד להזריק בנליסטה 200 מ"ג. הזריקה הראשונה שלך עם עט המזרק המוכן לשימוש של בנליסטה 200 מ"ג תהיה תחת השגחה של האחות או הרופא שלך. לאחר שידריכו אותך כיצד להשתמש בעט, האחות או הרופא שלך יכולים להחליט שאתה יכול להזריק לעצמך או שהמטפל שלך יכול להזריק לך. האחות או הרופא שלך גם ינחו אותך לאילו סימנים ותסמינים יש לשים לב כאשר משתמשים בבנליסטה 200 מ"ג, מכיוון שיכולות להופיע תגובות אלרגיות חמורות (ראה בסעיף 4

"תגובות אלרגיות").

יש להזריק בנליסטה 200 מ"ג מתחת לעור באזור הבטן או באזור הירך.
בנליסטה 200 מ"ג היא זריקה תת עורית ואסור להזריק אותה לתוך הוריד (I.V.).
הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש נמצאות בסוף העלון הזה.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר של בנליסטה 200 מ"ג
עליך לפנות מייד לרופא או לאחות שישגיחו עליך למקרה שתפתח סימנים או תסמינים של תופעות לוואי, ושיטפלו בתסמינים אלו במידת הצורך. במידת האפשר הראה להם את האריזה או את העלון הזה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בבנליסטה 200 מ"ג
הזרק את המנה ששכחת ברגע שזוכרת. לאחר מכן המשך עם לוח הזמנים השבועי הרגיל שלך או התחל לוח זמנים שבועי חדש שתחילתו מהיום שהזרקת את המנה שנשכחה.
אם לא הבחנת שהחמצת מנה עד לרגע בו הגיע הזמן למנה הבאה, הזרק רק את המנה הבאה כמתוכנן.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

הפסקת הטיפול בבנליסטה 200 מ"ג
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא. הרופא שלך יחליט אם עליך להפסיק להשתמש בבנליסטה 200 מ"ג.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבנליסטה 200 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תגובות אלרגיות - פנה מייד לקבלת סיוע רפואי
בנליסטה 200 מ"ג עלולה לגרום לתגובה לזריקה, או לתגובה אלרגית (רגישות יתר). אלו תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע ב- עד משתמש אחד מתוך 10). לעיתים תופעות אלו עלולות להיות חמורות (תופעות לוואי שאינן שכיחות, מופיעות ב- עד משתמש אחד מתוך 100), והן עלולות להיות מסכנות-חיים. סביר יותר שתופעות חמורות אלו תתרחשנה ביום של הטיפול הראשון או השני עם בנליסטה 200 מ"ג, אולם הן יכולות להתעכב ולהתרחש מספר ימים אחר כך.

ספר מייד לאחות או לרופא שלך, או פנה לחדר מיון בבית-החולים הקרוב, אם הינך חש באחד מהתסמינים הבאים של תגובה אלרגית או תגובה לזריקה:

- נפיחות של הפנים, השפתיים, הפה או הלשון
- צפצופים בנשימה, קשיים בנשימה או קוצר נשימה
- פריחה

- גבשושיות מגרדות בעור או חרלת

לעיתים נדירות, תגובות מאוחרות פחות חמורות לבנליסטה 200 מ"ג עלולות להתרחש גם כן, בדרך כלל חמישה עד עשרה ימים לאחר הזריקה. הן כוללות תסמינים כגון פריחה, בחילה, עייפות, כאבי שרירים, כאבי ראש, או נפיחות של הפנים.

אם הינך חווה תסמינים אלו, במיוחד אם אתה חווה יחד שני תסמינים או יותר:

← **ספר לאחות או לרופא שלך.**

זיהומים

בנליסטה 200 מ"ג עלולה לגרום לך להדבק בזיהומים בסבירות גבוהה יותר כולל זיהומים בדרכי השתן והנשימה. אלה תופעות לוואי שכיחות מאוד ומופיעות ביותר ממשמש אחד מתוך 10. חלק מהזיהומים עלולים להיות חמורים ולגרום למוות בשכיחות נמוכה.

אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים של זיהום:

- חום ו/או צמרמורת
- שיעול, בעיות נשימה
- שלשול, הקאה
- תחושת צריבה בזמן מתן שתן; מתן שתן לעיתים תכופות
- עור חם, אדום או כואב או פצעים בגופך.

← **ספר מייד לאחות או לרופא שלך.**

דיכאון והתאבדות

קיימים דיווחים על דיכאון, מחשבות אובדניות, וניסיונות התאבדות במהלך הטיפול עם בנליסטה. דיכאון יכול להופיע ב- עד 1 מתוך 10 משתמשים, מחשבות אובדניות וניסיונות התאבדות יכולים להופיע ב- עד 1 מתוך 100 משתמשים. אם אתה מדוכא, יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או מחשבות מטרידות אחרות, או אם אתה מדוכא ומבחין שהרגשתך מחמירה או מפתח תסמינים חדשים:

← **פנה לרופא שלך או גש מייד לבית החולים.**

סיכון מוגבר לזיהום מוחי:

תרופות המחלישות את מערכת החיסון שלך, כגון בנליסטה 200 מ"ג, עלולות לשים אותך בסיכון מוגבר להדבק בזיהום מוחי נדיר אך חמור ומסכן חיים הקרוי לויקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת.

(PML – Progressive Multifocal Leukoencephalopathy).

תסמינים של לויקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת:

- אובדן זיכרון
 - קושי לחשוב
 - קושי לדבר או ללכת
 - אובדן ראייה
- ← **ספר לרופא שלך מייד אם הינך חווה אחד מתסמינים אלו, או בעיות דומות שנמשכו מעל למספר ימים.**

במידה וכבר חווית תסמינים אלו לפני תחילת הטיפול עם בנליסטה 200 מ"ג:

← **ספר מייד לרופא שלך אם הינך מבחין בשינויים כלשהם בתסמינים אלה.**

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד מופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10:

- זיהומים חיידקיים (ראה פסקה "זיהומים" לעיל)
- בחילה, שלשול

תופעות לוואי שכיחות מופיעות ב- עד משתמש אחד מתוך 10:

- חום גבוה או קדחת
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (ניתן להבחין בבדיקת דם)
- זיהום באף, בגרון או בקיבה
- כאב בידיים או בכפות הרגליים
- מיגרנה
- תגובות באזור ההזרקה, לדוגמא: פריחה, אדמומיות, גרד או נפיחות של העור במקום בו הזרקה בנליסטה 200 מ"ג.

תופעות לוואי שאינן שכיחות מופיעות ב- עד משתמש אחד מתוך 100:

- פריחה בולטת ומגרדת (חרלת), פריחה בעור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל 8°C).

אין להקפיא.

יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מפני אור.

יש להוציא מהמקרר 30 דקות לפני השימוש.

ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מאור במשך 12 שעות לכל היותר. לאחר הוצאתו מהמקרר יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשליכו.

אל תשליך תרופות לאסלה או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות בהן אתה כבר לא משתמש. כך תסייע לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Sodium Chloride, L-Arginine Hydrochloride, L-Histidine Monohydrochloride,
L-Histidine, Polysorbate 80, Water for Injection

ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בנליסטה 200 מ"ג משווקת בעט מזרק מוכן לשימוש המכיל 1 מ"ל תמיסה נטולת צבע עד
צהבהבה בצבעה לשימוש חד-פעמי.
כל אריזה מכילה 1 עט מזרק מוכן לשימוש או 4 עטי מזרק מוכנים לשימוש.
ייתכן ולא כל גדלי האריזות ישווקו.
בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
שם היצרן: גלקסו אופריישנס אנגליה בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
נערך בנובמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
בנליסטה 200 מ"ג: 161-25-35439
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת
לבני שני המינים.
סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.
©2021 קבוצת החברות של GSK או הזכייין שלה.

הוראות שלב אחר שלב להזרקה בעט המזרק המוכן לשימוש

פעם בשבוע

מלא אחר ההוראות שלהלן כיצד להשתמש בצורה נכונה בעט מזרק מוכן לשימוש.
אי-מילוי אחר ההוראות עלול להשפיע על תפקוד תקין של עט המזרק המוכן לשימוש.
עליך גם לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט מזרק מוכן לשימוש.
בנליסטה 200 מ"ג מיועדת לשימוש **תת עורי בלבד**.



אחסון

- יש לאחסן במקרר (בין 2°C ל 8°C).
- אין להקפיא.
- שמור באריזת הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להוציא מהמקרר 30 דקות לפני השימוש.
- ניתן לאחסן את העט מזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר (עד 25°C) כשהוא מוגן מאור במשך 12 שעות לכל היותר. לאחר הוצאתו מהמקרר יש להשתמש בו תוך 12 שעות או להשליכו.
- יש להרחיק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.


אזהרות

- עט המזרק המוכן לשימוש מיועד לשימוש חד-פעמי ויש להשליכו לאחר מכן.
- אין לחלוק את בנליסטה 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש עם אדם אחר.

- אין לנער.
 - אין להשתמש במידה והופל על משטח קשה.
 - אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני ההזרקה.
- חלקי בנליסטה 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש**



אביזרים הדרושים להזרקה



בנליסטה 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש



מטלית אלכוהול
(לא כלולה באריזה)



פד גאזה או צמר גפן
(לא כלול באריזה)


1. אסוף ובדוק את האביזרים
אסוף אביזרים

- הוצא מהמקרר מגש אחד סגור של עט מזרק מוכן לשימוש.
- מצא משטח נוח, מואר היטב ונקי והנח עליו את האביזרים הבאים בהישג יד:
 - בנליסטה 200 מ"ג עט מזרק מוכן לשימוש.
 - מטלית אלכוהול (לא כלולה באריזה).
 - פד גאזה או צמר גפן (לא כלול באריזה).
 - מיכל ריק עם מכסה צמוד להשלכת העט המשומש (לא כלול באריזה).
- אל תבצע את ההזרקה אם אין לך את כל האביזרים הרשומים מעלה.

בדוק את תאריך התפוגה

- קלף את הכיסוי שעל המגש והוצא את עט המזרק המוכן לשימוש.
- בדוק את תאריך התפוגה שעל עט המזרק המוכן לשימוש (ציור 1).

ציור 1



אל תשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר

2. הכן ובדוק את עט המזרק המוכן לשימוש

יש לאפשר לעט המזרק להגיע לטמפרטורת החדר

- הנח את העט בטמפרטורת החדר למשך 30 דקות (ציור 2). הזרקה של בנליסטה 200 מ"ג קרה עלולה לקחת זמן ממושך יותר ועלולה להיות לא נוחה.


ציור 2



- אל תחמם את העט בכל דרך אחרת. לדוגמא, אל תחמם במיקרוגל, במים חמים או באור שמש ישיר.
- אל תסיר את המכסה הטבעתי במהלך שלב זה.
- **בדוק את התמיסה של בנליסטה 200 מ"ג**
- הסתכל בחלון הבדיקה כדי לבחון שתמיסת בנליסטה 200 מ"ג היא נטולת צבע עד צהבהבה בצבעה (ציור 3).
- זה תקין לראות בועת אוויר אחת או יותר בתמיסה.


ציור 3

תמיסת בנליסטה 200 מ"ג



- אל תשתמש אם התמיסה נראית עכורה, בצבע שונה או אם יש בה חלקיקים.
- 3. **בחר ונקה את אזור ההזרקה**
- בחר את אזור ההזרקה**
- בחר את אזור ההזרקה (בטן או ירך) כפי שניתן לראות בציור 4.

ציור 4




- אם אתה זקוק לשתי זריקות להשלמת המינון, השאר לפחות 5 ס"מ בין כל מקום הזרקה אם אתה מזריק באותו אזור.
- אל תזריק בכל פעם בדיוק לאותו האזור. זאת על-מנת למנוע מהעור להתקשות.
- אל תזריק באזורים בהם העור רגיש, פצוע, אדום או קשה.
- אל תזריק במרחק קטן מ- 5 ס"מ מהטבור.

נקה את אזור ההזרקה

- רחץ את ידיך.
- נקה את אזור ההזרקה על-ידי ניגובו במטלית אלכוהול (ציור 5). הנח לעור להתייבש באוויר.

ציור 5




אל תיגע באזור זה שוב לפני מתן הזריקה.

4. התכונן להזרקה

הסר את המכסה הטבעתי

- אל תסיר את המכסה הטבעתי עד ממש לפני ההזרקה.
- הסר את המכסה הטבעתי על-ידי משיכה או סיבוב שלו. ניתן לסובב את המכסה הטבעתי עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון (ציור 6).

ציור 6




- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.

מקם את העט

- אחוז בעט בנוחות כך שתוכל לצפות בחלון הבדיקה. זה חשוב כדי שתוכל לוודא מתן מינון מלא (ציור 7).

ציור 7



- במידת הצורך, משוך או מתח את העור באזור ההזרקה כדי להפוך אותו למוצק יותר.
- מקם את העט ישר מעל אזור ההזרקה (בזווית של 90 מעלות). ודא שמגן המחט המוזהב שטוח על-פני העור.


5. הזרקת בנליסטה 200 מ"ג

התחל את ההזרקה

- לחץ את העט באופן יציב וחזק כל הדרך מטה לתוך אזור ההזרקה והחזק אותו במקום (ציור 8).

פעולה זו תחדיר את המחט ותתחיל את ההזרקה.

ציור 8



ייתכן ותשמע "קליק" ראשון בתחילת ההזרקה. אתה תראה את המחווון (אינדיקטור) הסגול מתחיל לנוע דרך חלון הבדיקה (ציור 9).


ציור 9



השלם את ההזרקה

המשך להחזיק את העט בכיוון מטה עד שהמחווון (אינדיקטור) הסגול יפסיק לנוע. ייתכן ותשמע "קליק" שני כמה שניות לפני שהמחווון (אינדיקטור) הסגול מפסיק לנוע (ציור 10).

ציור 10



ייתכן שההזרקה תימשך 15 שניות עד להשלמתה.

- כאשר ההזרקה הושלמה, הרם את העט מאזור ההזרקה.

6. השלך ובדוק

השלך את העט המשומש

- אל תכסה בחזרה את העט עם המכסה הטבעתי.
- השלך את העט המשומש והמכסה הטבעתי לתוך מיכל ריק עם מכסה צמוד.
- בקש מהרופא שלך או מהרוקח הסבר כיצד להשליך כראוי עט משומש או מיכל שבתוכו עטים משומשים.
- אל תמחזר או תשליך עט משומש, או מיכל שבתוכו עטים משומשים, בפסולת ביתית.

בדוק את אזור ההזרקה

- ייתכן ותהיה כמות קטנה של דם באזור ההזרקה.
- במידת הצורך, לחץ צמר גפן או פד גאזה על אזור ההזרקה.
- אל תשפשף את אזור ההזרקה.

Ben 200mg PT v4A