

קיטרודה (פמברוליזומאב) כרטיס מידע בטיחותי למטופל

קיטרודה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות אשר לעיתים עלולות להפוך מסכנות חיים ועלולות להוביל למוות. תופעות לוואי אלו עלולות להתרחש בכל זמן במהלך הטיפול או אף לאחר שהטיפול שלך הסתיים. יתכן ותחווה יותר מתופעת לוואי אחת בו זמנית.

- | | |
|--|--|
| <p>כליות</p> <ul style="list-style-type: none"> • שינוי בכמות או בצבע השתן <p>בלוטות הורמונליות</p> <ul style="list-style-type: none"> • דופק מהיר • ירידה או עליה במשקל • הזעה מוגברת • נשירת שיער • תחושת קור • עצירות • התעבות הקול • כאבי שרירים • סחרחורת או התעלפות • כאבי ראש שאינם חולפים או כאב ראש לא רגיל • תחושת רעב או צמא מוגברת • הטלת שתן לעיתים קרובות יותר מהרגיל | <p>ריאות</p> <ul style="list-style-type: none"> • קוצר נשימה • כאב בחזה • שיעול <p>מעיים</p> <ul style="list-style-type: none"> • שלשול או יותר פעילות מעיים מהרגיל • צואה בצבע שחור, דמויית זפת, דביקה, או דמית או רירית • כאב חמור או רגישות חמורה באיזור הבטן <p>כבד</p> <ul style="list-style-type: none"> • בחילה או הקאה • תחושת רעב פחותה מהרגיל • כאב בצד הימני של איזור הבטן • הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים • שתן כהה • דימום או הופעת חבורות בקלות רבה יותר מהרגיל |
|--|--|

צור קשר עם הרופא שלך מיד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים כלשהם כולל תסמינים שלא מצויינים בכרטיס זה. ייתכן והרופא שלך יטפל בך עם תרופות אחרות על מנת למנוע סיבוכים חמורים נוספים ולהפחית את התסמינים. ייתכן והרופא שלך ישהה את המנה הבאה של קיטרודה או יפסיק לחלוטין את הטיפול בקיטרודה.

למידע נוסף, אנא עיין בעלון לצרכן של קיטרודה המכיל מידע למטופל, באתר האינטרנט של משרד הבריאות: www.gov.il/he/service/israeli-drug-index

חשוב

- אל תנסה לאבחן או לטפל בתופעות הלוואי בעצמך.
- **קח איתך כרטיס זה כל הזמן**, ביחוד במהלך נסיעות, בכל פניה לחדר מיון, או בפניה לכל רופא אחר.
- הקפד לעדכן כל איש צוות רפואי שאתה פוגש כי אתה מטופל בקיטרודה, והצג להם כרטיס זה.

פרטי קשר חשובים

שם המטופל	טלפון המטופל	פרטי קשר למקרים דחופים (שם וטלפון)
	טלפון במרפאה	טלפון במקרים דחופים

מידע חשוב לצוות הרפואי

נושא כרטיס זה מטופל בקיטרודה, (פמברוליזומאב), אשר יכולה לגרום לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, ועלולות להתרחש בכל זמן במהלך הטיפול או אף לאחר שהטיפול הסתיים. יש לבצע הערכה של המטופלים לסימנים ותסמינים של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון. אבחנה מוקדמת וניהול מתאים חיוניים להקטנת ההשלכות של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון.

כאשר קיים חשד לתופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון, יש לבצע הערכה מתאימה לצורך אישור הגורם או שלילת גורמים אחרים. בהתאם לחומרת תופעת הלוואי, יש להשהות את הטיפול בקיטרודה ולטפל בקורטיקוסטרואידים. הנחיות מיוחדות לניהול תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון זמינות בעלון לרופא של קיטרודה.

התייעצות עם רופא אונקולוג או מומחה רפואי אחר יכולה לסייע בניהול תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון באיבר מסויים.

למידע נוסף, אנא עיין בעלון לרופא של קיטרודה באתר האינטרנט של משרד הבריאות: www.gov.il/he/service/israeli-drug-index
ניתן לדווח למשרד הבריאות על תופעות לוואי הנגרמות מתרופות מרשם בקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>
ניתן לפנות לקבלת מידע רפואי כתובת: DPOC.israel@merck.com או התקשר 099533333.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, כרטיס זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.