

كيترودا  
(بيمبروليزوماب)  
بطاقة معلومات سلامة للمعالج

يمكن أن يسبب كيترودا أعراضًا جانبية وخيمة التي يمكن أن تصبح في بعض الأحيان مهددة للحياة ويمكن أن تؤدي إلى الموت. قد تحدث هذه الأعراض الجانبية في أي وقت أثناء العلاج أو حتى بعد انتهاء علاجك. من المحتمل بأن تواجه أكثر من عرض جانبي واحد في ذات الوقت.

- الكلى**
- تغير في كمية أو في لون البول
- الغدد الهرمونية**
- نبض سريع
  - انخفاض أو ارتفاع بالوزن
  - تعرق مفرط
  - تساقط الشعر
  - شعور بالبرد
  - إمساك
  - تغلُّط الصوت
  - الأم عضلات
  - دوخة أو إغماء
  - الأم رأس التي لا تنقضي أو ألم رأس غير اعتيادي
  - شعور مفرط بالجوع أو بالعطش
  - تبول في أوقات متقاربة أكثر من المعتاد

- الرنيتين**
- ضيق تنفس
  - ألم في الصدر
  - سعال
- الأمعاء**
- إسهال أو نشاط معوي أكثر من المعتاد
  - براز بلون أسود، شبيه بالقطران، دَبِق، أو دموي أو مخاطي
  - ألم وخيم أو تحسس وخيم في منطقة البطن
- الكبد**
- غثيان أو تقيؤ
  - شعور بالجوع أقل من المعتاد
  - ألم في الجانب الأيمن من منطقة البطن
  - اصفرار الجلد أو الجزء الأبيض في العينين
  - بول داكن
  - نزيف أو ظهور كدمات بسهولة أكبر من المعتاد

اتصل بطبيبك فورًا إذا كنت تطوّر أي علامات أو أعراض بما في ذلك أعراض التي لم تذكر في هذه البطاقة. من المحتمل أن يعالجك طبيبك بأدوية أخرى لتجنب المزيد من المضاعفات الوخيمة وتقليل الأعراض. من المحتمل بأن يقوم طبيبك بتأجيل الجرعة التالية من كيترودا أو إيقاف العلاج بكيترودا تمامًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة نشرة المستهلك لكيترودا التي تحتوي على معلومات للمعالج، في موقع الإنترنت الخاص بوزارة الصحة:  
[www.gov.il/he/service/israeli-drug-index](http://www.gov.il/he/service/israeli-drug-index)

**مهم**

- لا تحاول تشخيص أو علاج الأعراض الجانبية بنفسك.
- خذ هذه البطاقة معك طوال الوقت، خاصة أثناء السفر، في كل توجه إلى غرفة الطوارئ، أو عند التوجه لأي طبيب آخر.
- احرص على حملتها كل فرد من الطاقم الطبي الذي تقابله بأنك تتعالج بكيترودا، واعرض لهم هذه البطاقة.

**تفاصيل اتصال مهمة**

اسم الطبيب	هاتف العيادة	الهاتف في الحالات الطارئة
اسم المتعالج	هاتف المتعالج	تفاصيل اتصال للحالات الطارئة (اسم وهاتف)

**معلومات مهمة للطبيب**

حامل هذه البطاقة متعالج بكيترودا، (بيمبروليزوماب)، الذي يمكن أن يتسبب بأعراض جانبية ذات صلة بجهاز المناعة، والتي قد تحدث في أي وقت خلال العلاج أو حتى بعد انتهاء العلاج. يجب إجراء تقييم للمتعالجين بخصوص علامات وعوارض لأعراض جانبية ذات صلة بجهاز المناعة. التشخيص المبكر والإدارة الملائمة ضروريان للحد من عواقب الأعراض الجانبية المتعلقة بجهاز المناعة.

عندما يكون هنالك شك لأعراض جانبية ذات صلة بجهاز المناعة، ينبغي إجراء تقييم ملائم لضرورة تأكيد المسبب أو نفي مسببات أخرى. وفقًا لوخامة العرض الجانبي، ينبغي تأجيل العلاج بكيترودا والمعالجة بالكورتيكوستيروئيدات. إرشادات خاصة لإدارة الأعراض الجانبية المتعلقة بجهاز المناعة متوفرة في نشرة الطبيب الخاصة بكيترودا.

يمكن أن تساعد استشارة طبيب الأورام أو أخصائي طبي آخر في إدارة الأعراض الجانبية المتعلقة بالجهاز المناعي في عضو معين.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة نشرة الطبيب لكيترودا في موقع الإنترنت الخاص بوزارة الصحة:  
[www.gov.il/he/service/israeli-drug-index](http://www.gov.il/he/service/israeli-drug-index)  
يمكن الإبلاغ لوزارة الصحة عن أعراض جانبية ناجمة عن أدوية المزمرة بوصفة طبية في الرابط التالي:  
<https://sideeffects.health.gov.il>  
يمكن التوجه للحصول على معلومات طبية في العنوان: [DPOC.israel@merck.com](mailto:DPOC.israel@merck.com) أو اتصل 099533333

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه البطاقة بصيغة الذكر. ومع ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.