

ديرمومستامين جل

المادة الفعالة ومكمّلاتها بوجة جرعة:

ديميتيدين ماليات 0.1% w/w

dimetindene maleate 0.1% w/w

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء" و"البند 6" [معلومات إضافية].
اقرأ النشرة بتمعن حتى تنهيها وتلقي قليل البدع باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر بحسب تعليمات بند الجرعة في هذه النشرة.
 طبيب في حال تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7 أيام.

1. لم أعد أخذ هذا الدواء؟

للطفح الجلدي، الحكة، أمراض جلد غير التهابية، حروق، لدغات الحشرات، التهاب جلد على خلفية حساسية وأكزيما.

المجموعة العلاجية: مضاد - الهيستامين

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء:

- إذاً وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة ديميتدين ماليات أو لأحد المرکبات الأخرى التي يحتويها الدواء.
- في حالات معروفة من الحساسية للدغات الحشرات.
- على جروح متفرقة أو متهيّنة، على اضطرابات في الجلد كالإفرازات، على أنسجة مخاطية أو بحابت العينين (خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الصغار).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

تجنب الاستخدام على مساحات واسعة من الجلد، خاصة لدى الأطفال والأولاد الصغار. تجنب من تعرّض المناطق التي تم علاجها لأشعة الشمس لفترة طويلة. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حكة خطيرة جداً أو آفات جلدية توثر على مساحات كبيرة.

يحتوي ديرموستامين جل على بروبيلين چليکول ولذلك ممكن أن يؤدي إلى حالات تبيج جلدية موضعية.

أخبر الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من سبعة أيام.

و خاصة من أدوية أخرى، إذا كنت قد بدأت في تناول أو استعمال أدوية أخرى عن طريق الفم أو دون.

ردد فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أدوية لاستعمال الخارجي، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
يجب عليك اتخاذ الحذر عند استعمال ديرموستامين جل خلال الحمل والإرضاع، وعدم دهنها على مساحات جلدية واسعة، وعلى جلد مصايب أو متهب.

لا تستعمل الجل على الحطام أثناء فترة الإرضاع.

السيارة واستعمال الماكينات

يوجد للدواء تأثير ضئيل أو لا يوجد تأثير إطلاقاً على قدرة السيارة أو استعمال

الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء

يحتوي ديرموستامين جل على بروبيلين چليکول ولذلك ممكن أن يُسبِّب تهيجاً

موضعيًا في الجلد.

يحتوي ديرموستامين جل أيضًا على بنزوكربونوم كلوريد الذي يمكن أن يُسبِّب

هو أيضًا تهيجاً موضعيًا. يُمنع دهن هذا الدواء على الثديين في فترة الإرضاع

لأنه يمكن للطفل أن يلمسه مع الطليب الذي يرضعه.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك النصوح مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المتبعة عادة هي:

بالغون وأطفال:

يُجَب دهن 2 - 4 مرات في اليوم، على المنطقة المصابة أو بحسب الحاجة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء معد لاستعمال الخارجي فقط

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

احرص على تناول الجرعة المذكورة في النشرة لل المستهلك أو قولي جداً أو قوي جداً، توجه إلى

الطبيب أو إلى الصيدلي.

يُمنع تناول الأدوية في الطعام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن

الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت

بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو

الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يُسبِّب استعمال ديرموستامين جل أعراضًا جانبية لدى قسم

من المستخدمين. لا تتصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل الأ

تعانى من أي منها.

أوقف العلاج ديرموستامين جل واستشر الطبيب أو الصيدلي إذا لاحظت أحد

الأعراض التالية:

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - تظهر لدى 10-1 مستعملين من

بين 1,000: جفاف في الجلد أو شعور بالحرقة.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - تظهر لدى أقل من مستعمل واحد

من بين 10,000: ردود فعل جلدية تحسسية، بما في ذلك طفح جلدي وحكة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من

أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة فعليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن الاعراض الجانبية

من الممكن تبلیغ وزارة الصحة عن اعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبلیغ عن اعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الانترنت للتبلیغ عن الاعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن أيضاً التبلیغ عن الاعراض الجانبية بواسطة البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il

5. كيف تخزن الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تسبِّب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- مدة الصلاحية بعد الفتح لأول مرة: 6 أشهر.
- شروط التخزين: يجب تخزن الدواء في مكان بارد بدرجة حرارة أقل من 25°C.
- يجب تخزن الدواء في مكان بارد بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضًا:

Propylene glycol, carbomer homopolymer type B, disodium edetate, benzalkonium chloride, sodium hydroxide, purified water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

جل متGANس عديم اللون، صاف ولا يعطي قليلاً.
تحتوي كل زمرة على 30 غرام أو 100 غرام.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

تريمما، منتجات طبية إسرائيلية معبأة معبأة م.ض.، مubarot 4023000، إسرائيل

اسم المنتج وعنوانه:

تريمما، منتجات طبية إسرائيلية معبأة معبأة م.ض.، مubarot 4023000، إسرائيل

تم تحريرها في تشرين الأول 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

162-15-35946-00

لتبيّن قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معذ لكلا الجنسين.

PIL-1021-05

معبأة 4023000

منتجات طبية إسرائيلية

معبأة م.ض.

P00001433