

موكسين فورته 250 ملخ مسحوق للتعليق

التركيب:

كل 5 مل تحتوي على:

أموكسيسيلين (كتريبيهارات) 250 ملخ

معلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسلة هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، تحظى إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة التلوثات التي تسببها الجراثيم الحساسة لأموكسيسيلين. كما أنه، مخصص لمنع تلوث جرثومي لدى مرضى معرضين لخطورة تطوير إلتهاب بطانة القلب على خلفية جرثومية.

الفصيلة العلاجية

مضاد حيوي من فصيلة الپينيسيلينات.

هناك تلوثات تسببها فيروسات، مثل الرشح، موكسين فورته 250 ملخ مسحوق للتعليق لا يلحق الضرر بالفيروسات.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- كنت حساساً لمركبات عبوة الدواء.
- وُجدت لديك حساسية لأدوية أخرى من فصيلة الپينيسيلينات أو السيفالوسپورينات أو مضادات حيوية مشابهة مثل أموكسيسيلين، أمپيسيلين، سيفالوكسرين وأخرى.
- كنت تعاني من مرض القبلة (سواء فقط الشك بوجود المرض أو تأكيد وجود المرض).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ موكسين فورته 250 ملخ مسحوق للتعليق

إحك للطبيب إذا:

- عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي لمضاد حيوي من فصيلة البيتا - لاكتام (مثل أمپيسيلين، پپيراسيلين). أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية".
- كنت تتناول أدوية لتثبيع الدم (مثل وارفارين، وما شابه).
- عانيت في الماضي من إسهالات أو من إلتهاب القولون (colitis) نتيجة إستعمال مضاد حيوي.
- كنت تعاني من مشاكل كلوية.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

أدوية لعلاج السرطان (مثل ميتوتريلكستات)

أدوية للحرقان أو للنقرس (پروبونيسييد أو سيميتيدين)

أدوية لتثبيع الدم (مثل وارفارين) - قد تؤدي إلى حدوث انتفاف

أعراض من الحمل - أموكسيسيلين قد يضعف من نجاعة أقراص

منع الحمل

مضادات حيوية (مثل تتراسيكلينات) - قد تضعف من نجاعة

أموكسيسيلين

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بين وجبات الطعام مع كأس من الماء.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين لحصول حمل، يجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، إستشيري الطبيب بخصوص كيفية الإرضاع خلال فترة إستعمال الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

• يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملخ صوديوم في الملعقة الصغيرة (5 مل) وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

• يحتوي هذا الدواء على سكروز (حوالي 3 غرام في 5 مل معلق). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول الدواء.

• يحتوي الدواء على مادة ملونة حمراء #40 FD&C red #129 (E129) التي قد تسبب ردود فعل تحسسية.

• يحتوي هذا الدواء على بنزوات الصوديوم (E211) (2.79 ملخ في 5 مل معلق). قد يزيد بنزواتات الصوديوم من شدة البرقان (اصفرار الجلد والعينين) لدى حديثي الولادة (حتى عمر 4 أسابيع).

• يحتوي هذا الدواء على كحول بنزيلي (حوالي 1.5 ملخ في 5 مل معلق)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية. يشتبه بالكحول البنزيلي كعامل خطورة لحدوث أمراض جانبيّة خطيرة بما في ذلك مشاكل في التنفس لدى الأطفال الصغار.

لا يجوز الإستعمال لدى حديثي الولادة (حتى عمر 4 أسابيع) إلا بتوصية من الطبيب. لا يجوز الإستعمال لأكثر من أسبوع لدى الأطفال الصغار (بعمر أقل من 3 سنوات)، إلا بتوصية من الطبيب، جراء تزايد الخطورة لتراتم المادة في جسمهم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يحدد الطبيب المعالج المقدار الدوائي للدواء اللازم والمدة الزمنية لتناول الدواء وفقاً لنوع وشدة التلوث الذي تعاني منه أو يعني طفلك منه. إحك للطبيب إذا لم يحدث تحسن في الحالة.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

تلوث في الطرق التنفسية العلوية، في الرئتين، في الحلق أو في الأنفحة الرخوة:

الكبار والأطفال فوق عمر 10 سنوات: 250-500 ملخ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات.

أطفال بأعمار 2-10 سنوات: 125 ملخ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات. في التلوثات الخطيرة بالإمكان رفع المقدار الدوائي إلى 250 ملخ، 3 مرات في اليوم.

الرضع دون عمر السنين: 62.5 ملخ، 3 مرات في اليوم، كل 8 ساعات.

المقدار الدوائي الموصى به وفقاً لوزن الجسم هو 20 ملخ/ كلغ للبيوم، مُقسم لمقدار دوائي كل 8 ساعات. في التلوثات الخطيرة بالإمكان رفع المقدار الدوائي إلى 40 ملخ/ كلغ للبيوم، مُقسم لمقدار دوائي كل 8 ساعات.

إلتهاب بسيط في المسالك البولية أو داء السيلان:

الكبار: 3 غرام بإعطاء وحيد.

الأطفال: 100 ملخ/ كلغ بإعطاء وحيد.

علاج وقائي لإلتهاب بطانة القلب على خلفية جرثومية (في علاج الأسنان):

كبار وأطفال فوق عمر 10 سنوات: 3 غرام بإعطاء وحيد، ساعة قبل بدء العلاج.

أطفال دون عمر 10 سنوات: 1.5 غرام بإعطاء وحيد، ساعة قبل بدء العلاج.

يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي من المعلق بواسطة ملعقة قياس صغيرة. يجب تناول الدواء بين وجبات الطعام مع كأس من الماء.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تحضير الدواء

يجب تحضير المعلق بموجب تعليمات التحضير الظاهرة على ملصق القنينة: يجب الطرق على القنينة لتحرير المسحوق.

لقنينة التي تحتوي على مسحوق لتحضير 60 مل: يجب إضافة 36 مل ماء مُقطر.

لقنية تحتوي على مسحوق لتحضير 100 مل: يجب إضافة 60 مل ماء مُغطّر.

يجب خفض القنية جيداً قبل كل إستعمال.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك، حتى ولو لم تشعر بأعراض. أعراض فرط المقدار الدوائي قد تشمل:

دوار شديد.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، يجب تناول مقداراً دوائياً حال تذكر ذلك. إذا تذكرت قريباً لموعد تناول المقدار الدوائي التالي، فوت المقدار الدوائي المنسى واصل العلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول مقدارين دوائين سوية من أجل التهويض عن المقدار الدوائي المنسى.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

حتى ولو زالت الأعراض، فمن المهم إنهاء العلاج حسب توصية الطبيب. إن التوقف عن العلاج قبل الأوان، واستعمال غير صحيح أو فرط الإستعمال قد يؤدي إلى تطور مقاومة من قبل الجراثيم للدواء وإلى عودة التلوث. معنى ذلك بأن الدواء قد لا ينفعك في المستقبل.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء،

استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال موكسيپن فورته 250 ملг مسحوق للتعليق قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب في الحالات التالية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

طفح؛ تشقق الجلد أو تأثيرات أخرى على الجلد والعينين؛ غثيان؛ تقيؤ؛ إسهال؛ براز دموي.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

تآق (رد فعل تحسسي حاد مثل إنتفاخ في الأنف، العينين، الحنجرة، صعوبات في التنفس، حويصلات جلدية، طفح وتقشر الجلد)؛ أعراض لمشاكل في الكلى (مثل بول عكر)؛ أعراض لمشاكل في الكبد (مثل غثيان وتقierات مرارة وتكراراً، آلام في البطن، إرهاق شاذ، إصفرار العينين أو الجلد، بول داكن).

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

رد فعل جلدي حاد (أعراض شبيهة بالإنفلونزا، حويصلات وتقشر في الجلد)؛ أعراض جانبية جلدية خطيرة (SCAR – Severe Cutaneous Adverse Reactions)، ردود فعل جلدية خطيرة التي قد تؤثر أيضاً على أعضاء أخرى:

• تقشر، قشرة أو حويصلات في الجلد (مع أو بدون قبح) التي قد تؤثر أيضاً على العينين، الفم، الأنف أو الأعضاء التناسلية، حكة، طفح حاد، نتوءات تحت الجلد، ألم في الجلد، تغير لون الجلد (إحمرار، إصفرار أو لون قرمزي).

• إنتفاخ وإحمرار العينين أو الوجه

• شعور شبيه بالإنفلونزا، سخونة، قشعريرة، آلام في الجسم، إنتفاخ الغدد الليمفاوية، سعال

• ضيق في التنفس، ألم أو إنزعاج في الصدر

يجب إستشارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

لسان أسود يبدو مشعراً (التهاب اللسان)؛ تغير لون الأسنان لدى الأطفال (بقع بنية، صفراء أو رمادية)؛ دوار؛ قلق

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

حساسية جلدية (شرى)، حكة؛ طفح في الوجه؛ إنتفاخ حساسية جلدية (شرى)، حكة؛ طفح في الوجه؛ إنتفاخ

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

صعوبة الخلود للنوم (أرق)؛ إرباك أو تغيرات في السلوك؛ تغيرات في نتائج فحوص الدم في إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بإمكانك التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• **مسحوق جاف:** يجب تخزين المسحوق في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• **معلق جاهز:** يجب حفظه في البراد أو بدرجة حرارة الغرفة وإستعماله خلال 14 يوماً.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Sucrose, spray dried artificial flavor (cherry raspberry type), silicon dioxide, sodium citrate anhydrous, xanthan gum, sodium benzoate, FD&C red # 40.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

قنية تحتوي على مسحوق بلون كريمي - وردي فاتح. بعد إضافة الماء، يتم الحصول على سائل بلون وردي.

يتوفر حجمان من العبوة: عبوة تحتوي على مسحوق لتحضير 60 مل معلق، عبوة تحتوي على مسحوق لتحضير 100 مل مل معلق. من الجائز لا تسوق كافة أحجام العبوات.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه

تيقع إسرائيل م.ض.، شارع دفوره هنفيه 124، تل أبيب 6944020

إسم المنتج وعنوانه

تيقع كندا م.ض.، تورونتو، أونتاريو، كندا.

تم إعداد هذه النشرة في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 132.01.31050

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.