

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## מוקסיפן® פורטה 250 מ"ג אבקה להרחפה

**הרכב:**

כל 5 מ"ל מכילים:

אמוקסיצילין (כטריהידראט) 250 מ"ג

Amoxicillin (as trihydrate) 250 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בזיהומים הנגרמים על ידי חיידקים הרגישים לאמוקסיצילין. כמו כן, מיועדת למניעת זיהום חיידקי בחולים הנמצאים בסיכון לפתח דלקת פנים הלב על רקע חיידקי.

**קבוצה תרפויטית**

אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

ישנם זיהומים הנגרמים על ידי וירוסים, כגון הצטננות. מוקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרחפה אינו פוגע בוירוסים.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אתה רגיש למרכיבי האריזה של התרופה.
- יש לך רגישות לתרופות אחרות מקבוצת הפניצילינים או הצפלוספורינים או אנטיביוטיקה דומה כגון אמוקסיצילין, אמפיצילין, צפלקסין ואחרים.
- אתה סובל ממחלת הנשיקה (בין אם קיים רק חשד או אישור למחלה).

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול במוקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרחפה ספר לרופא אם:**

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לאנטיביוטיקה מקבוצת הבטא-לקטמים (כגון אמפיצילין, פיפרצילין). ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי".
- אתה נוטל תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין, וכדומה).
- סבלת בעבר משלשולים או מדלקת של המעי הגס (קוליטיס) כתוצאה משימוש באנטיביוטיקה.
- אתה סובל מבעיות בכליות.

**תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח**. במיוחד אם אתה לוקח:
תרופות לטיפול בסרטן (כגון מתوترקסאט)

- תרופות לצרבת או לשיגדון (פרובנציד או סימטידין)
- תרופות לדילול הדם (כגון וורפרין) – עלולות לגרום לדימומים
- גלולות למניעת היריון – אמוקסיצילין עלול להפחית את יעילות הגלולות
- אנטיביוטיקות (כגון טטרציקלינים) – עלולות להוריד את יעילות אמוקסיצילין

**שימוש בתרופה ומזון**

יש ליטול את התרופה בין הארוחות עם כוס מים.

**היריון והנקה**

אם את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

אם את מניקה או מתכננת להניק, היוועצי ברופא בנוגע לאופן ההנקה בזמן השימוש בתרופה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

- תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בכפית (5 מ"ל) ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.
- תרופה זו מכילה סוכרוז (כ-3 גרם ב-5 מ"ל תרחיף). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
- התרופה מכילה חומר צבע אדום FD&C red #40 (E129) שעלול לגרום לתגובות אלרגיות.
- תרופה זו מכילה סודיום בנזואט (E211) (2.79 מ"ג ב-5 מ"ל תרחיף). סודיום בנזואט עלול להגביר צהבת (צהבהב של העור והעיניים) אצל יילודים (עד גיל 4 שבועות).
- תרופה זו מכילה בנזיל אלכוהול (כ-1.5 מ"ג ב-5 מ"ל תרחיף), העלול לגרום לתגובות אלרגיות. בנזיל אלכוהול נחשד כגורם סיכון לתופעות לוואי חמורות לרבות בעיות נשימה בילדים צעירים. אין להשתמש ביילודים (עד לגיל 4 שבועות) אלא בהמלצת הרופא. אין להשתמש למשך יותר משבוע בילדים צעירים (בני פחות מ-3 שנים), אלא בהמלצת הרופא, עקב עלייה בסיכון להצטברות החומר בגופם.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הרופא המטפל יקבע את מינון התרופה הנדרש ואת משך הזמן שיש ליטול את התרופה בהתאם לסוג וחומרת הזיהום ממנו אתה או ילדך סובל. ספר לרופא אם אין שיפור במצב.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

**זיהום בדרכי הנשימה העליונות, בריאות, בעור או ברקמות רכות:**

*מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 250-500 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.*

*ילדים בגילאי 2-10 שנים: 125 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.*
זיהומים חמורים ניתן להגדיל את המנה ל-250 מ"ג, 3 פעמים ביום.

*תינוקות מתחת לגיל שנתיים: 62.5 מ"ג, 3 פעמים ביום, כל 8 שעות.*

המינון המומלץ בהתאם למשקל גוף הינו 20 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנה כל 8 שעות. בזיהומים חמורים ניתן להגדיל את המינון ל-40 מ"ג/ק"ג ליום, מחולק למנה כל 8 שעות.

**דלקת פשוטה של דרכי השתן או זיבה:**

*מבוגרים: 3 גרם במתן יחיד.*

*ילדים: 100 מ"ג/ק"ג במתן יחיד.*

**טיפול מניעתי לדלקת פנים הלב על רקע חיידקי (בטיפולי שיניים):**

*מבוגרים וילדים מעל גיל 10 שנים: 3 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.*

*ילדים מתחת לגיל 10 שנים: 1.5 גרם במתן יחיד, שעה לפני תחילת הטיפול.*

יש להקפיד על מדידת מנת התרחיף בכפית המדידה. יש ליטול את התרופה בין הארוחות עם כוס מים.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן הכנת התרופה**

יש להכין את התרחיף בהתאם להוראות ההכנה המופיעות על גבי תווית הבקבוק: יש להקיש על הבקבוק כדי לשחרר את האבקה.

לבקבוק המכיל אבקה להכנת 60 מ"ל: יש להוסיף 36 מ"ל מים מזוקקים.

לבקבוק המכיל אבקה להכנת 100 מ"ל: יש להוסיף 60 מ"ל מים מזוקקים.

יש לנער את הבקבוק היטב לפני כל שימוש.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה**, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך, גם אם אתה לא חש בתסמינים. תסמינים של מנת יתר עלולים לכלול: סחרחורת חמורה.

**אם שכחת ליטול תרופה זו** בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אם נזכרת בסמוך לזמן הנטילה של המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגיל. אין ליטול שתי מנות יחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**

גם אם הסימפטומים חלפו, חשוב לסיים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן, שימוש לא נכון או שימוש יתר עלולים לגרום להתפתחות של עמידות החיידקים לתרופה ולחזרת הזיהום.

משמעות הדבר היא כי התרופה עלולה לא להועיל לך בעתיד.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במוקסיפן פורטה 250 מ"ג אבקה להרחפה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את הטיפול ולפנות מייד לרופא במקרים הבאים:**

**תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):**

פריחה; היסדקות העור או השפעות אחרות על העור והעיניים; בחילה; הקאה; שלשול; צואה דמית

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

אנפילקסיס (תגובה אלרגית חריפה כגון נפיחות באף, בעיניים, בגרון, קשיי נשימה, שלפוחיות בעור, פריחה וקילופי עור); תסמינים של בעיות בכליות (כגון שתן עכור); תסמינים של בעיות בכבד (כגון בחילות והקאות חוזרות ונשנות, כאבי בטן, עייפות יוצאת דופן, צהבהב של העיניים או העור, שתן כהה)

**תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):**

תגובה עורית חריפה (סימפטומים דמויי שפעת, שלפוחיות וקילופים בעור); תופעות לוואי עוריות חמורות (SCAR – Severe Cutaneous Adverse Reactions), תגובות עוריות חמורות שעלולות להשפיע גם על איברים אחרים:

- קילופים, קשקשים או שלפוחיות בעור (עם או בלי מוגלה) אשר עלולים להשפיע גם על העיניים, הפה, האף או איברי המין, גרד, פריחה חריפה, בליטות מתחת לעור, כאב בעור, שינוי בצבע העור (אודם, צהבהב או צבע ארגמני)
- נפיחות ואודם של העיניים או הפנים
- הרגשה דמוית שפעת, חום, צמרמורות, כאבים בגוף, בלוטות לימפה נפוחות, שיעול
- קוצר נשימה, כאב או אי נוחות בחזה

**יש להיוועץ ברופא אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:**

**תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):**

לשון שחורה הנראית שעירה (דלקת בלשון); שינוי בצבע השיניים בילדים (כתמים חומים, צהובים או אפורים); סחרחורת; חרדה

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

אלרגיה עורית (סרפדת), גרד; פריחה בפנים; נפיחות

**תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):**

קושי להירדם (אינסומניה); בלבול או שינויים בהתנהגות; שינויים בתוצאות של בדיקות דם

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אבקה יבשה: יש לאחסן את האבקה במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- תרחיף מוכן: יש לשמור במקרר או בטמפרטורת החדר ולהשתמש בו תוך 14 ימים.**

- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Sucrose, spray dried artificial flavor (cherry raspberry type), silicon dioxide, sodium citrate anhydrous, xanthan gum, sodium benzoate, FD&C red # 40.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**

בקבוק המכיל אבקה בצבע שמנת-ורוד בהיר. לאחר הוספת המים, יתקבל נוזל בצבע ורוד.

קיימים 2 גדלי אריזה: אריזה המכילה אבקה להכנת 60 מ"ל תרחיף, אריזה המכילה אבקה להכנת 100 מ"ל תרחיף.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

**שם בעל הרישום וכתובתו**

טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

**שם היצרן וכתובתו**

טבע קנדה בע"מ, טורונטו, אונטריו, קנדה.

עלון זה נערך בנובמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 132.01.31050**

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.