

بيسوبرولول فومارات إينو قامد 2.5 ملغ، بيسوبرولول فومارات إينو قامد 5 ملغ، بيسوبرولول فومارات إينو قامد 10 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من بيسوبرولول فومارات إينو قامد 2.5 ملغ على:
بيسوبرولول فومارات 2.5 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من بيسوبرولول فومارات إينو قامد 5 ملغ على:
بيسوبرولول فومارات 5 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من بيسوبرولول فومارات إينو قامد 10 ملغ على:
بيسوبرولول فومارات 10 ملغ

لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر أنظر
الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي
هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسطلة
إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

• إحفظ النشرة، من الجائز أن تحتاجها ثانية.
• وُصف هذا الدواء من أجلك، لا تعطيه لآخرين، فهو قد يضرهم
حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

بيسوبرولول فومارات إينو قامد 2.5 ملغ مخصص لعلاج حالات
مزمومة من قصور القلب المستقر بدرجة متوسطة حتى خطيرة،
بالمشاركة مع أدوية إضافية.

بيسوبرولول فومارات إينو قامد 5 ملغ وبيسوبرولول فومارات
إينو قامد 10 ملغ مخصوصان لعلاج فربط ضغط الدم والذبحة
الصدرية (angina pectoris)، كما أن الدواء مخصص لعلاج
حالات مزمومة من قصور القلب المستقر بدرجة متوسطة حتى

خطيرة، بالمشاركة مع أدوية إضافية.

الفصيلة العلاجية:

من حجاجات بيتا إنتقائية.

2) قبل إستعمال الدواء

- لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
 - كنت حساساً (الergic) لـ بيسوبرولول أو لكل واحد من مركيبات الدواء الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية")
 - كنت تعاني من ربو خطير
 - كنت تعاني من مشكلة خطيرة في جريان الدم في الأطراف (مثل: متلازمة رينو Raynaud's syndrome)، متلازمة من شأنها أن تؤدي إلى وخز، شحوب أو إزرقان أصابع اليدين أو القدمين
 - كنت تعاني من ورم القواط (pheochromocytoma) غير المعالج، ورم نادر في الغدة الكظرية
 - كنت تعاني من الحماض الإستقلابي - حالة يوجد فيها حمض أكثر مما ينبغي في الدم
 - كنت تعاني من قصور حاد في القلب (acute)
 - كنت تعاني من تفاقم قصور القلب الذي يتطلب حقن أدوية داخل الوريد، التي تزيد من قوة إنقباض القلب
 - كنت تعاني من نظم قلب بطيء
 - كنت تعاني من إنخفاض في ضغط الدم
 - كنت تعاني من حالات مختلفة للقلب التي تؤدي إلى نظم قلب بطيء جداً أو إلى عدم سلامته الناضج
 - كنت تعاني من صدمة قلبية المنشأ (مصدرها القلب). هذه حالة قلبية خطيرة تؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم وإلى فشل في الدورة الدموية

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ بيسوبرولول فومارات إينو قامد، إحدى
للطبيب إذ:

- كنت تعاني من السكري
- كنت صائمًا بشكل تام
- كنت تعاني من أمراض قلبية معينة مثل إضطرابات في نظم القلب أو الام شديدة في الصدر أثناء الراحة Prinzmetal's (angina)

كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو في الكبد
وُجدت لديك مشكلة أقل خطورة في جريان الدم في الأطراف
كنت تعاني من مرض رئوي مُزمن أو ربو أقل خطورة
وُجدت لديك سابقة لطفح جلدي حرشفى (الصدفية)
كنت تعاني من أورام في الغدة الكظرية (ورم القواط
(pheochromocytoma)

كنت تعاني من إضطرابات في الغدة الدرقية
من الجائز أن يرغب الطبيب في إتخاذ الحذر الزائد (مثلاً إعطاء علاج إضافي أو إجراء فحوص بتواء أكبر).

بالإضافة لذلك إحكام الطبيب إذا كنت مقبلًا على إجتياز:

- علاج تقليل الحساسية (مثلاً لمنع حمى القش)، لأن بيسوبرولول فومارات إينو قامد 10 ملغ مخصوصان لعلاج فربط ضغط الدم والذبحة الصدرية (angina pectoris)، كما أن الدواء مخصوص لعلاج حالات مزمومة من قصور القلب المستقر بدرجة متوسطة حتى خطيرة، بالمشاركة مع أدوية إضافية.
- تدبير (مثلاً من أجل عملية جراحية)، لأن بيسوبرولول فومارات إينو قامد قد يؤثر على إستجابة جسمك لعملية التخدير

إذا كنت تعاني من مرض رئوي مُزمن أو من ربو أقل خطورة،
بلغ طيبك فوراً إذا بدأت الشعور بصعوبات جديدة في التنفس،
سعال، صفير بعد ممارسة نشاط بدني أو أعراض مشابهة عند
إستعمال بيسوبرولول فومارات إينو قامد.

الأطفال والمرأهقون

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمرأهقين.

الفحوص والمتابعة

إن العلاج بـ بيسوبرولول فومارات إينو قامد يتطلب مراقبة دائمة من قبل طيبك. هذه المراقبة ضرورية خاصة عند بداية العلاج، خلال فترة رفع المقدار الدوائي وعند التوقف عن العلاج.

التداعيات / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام طيبك أو للصيدلي عن ذلك.
لا يجوز تناول الأدوية التالية مع بيسوبرولول فومارات إينو قامد بدون إستشارة طيبك:

• أدوية معينة لعلاج عدم انتظام أو شذوذ في نظم القلب (مضادات اللا نظرية من المثنة)، مثل كينيدين، ديزوبراميل، ليدوكاين، فينيتين، فليكاينيد، بروفاكتون.

• أدوية معينة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية (angina pectoris) أو عدم انتظام نظم القلب (جاجيات قنوات الكالسيوم من نوع ثيرابايميل وديلتازام).

• أدوية معينة لعلاج ارتفاع ضغط الدم مثل كلونيدين، ميتيل دوپا، موكسونيدين وريليمينيدين. مع ذلك، لا توقف عن تناول هذه الأدوية بدون إستشارة طيبك.

إس拓وضح من الطبيب قبل تناول الأدوية التالية مع بيسوبرولول فومارات إينو قامد، من الجائز أن يحتاج طيبك إلى فحص حاليك في أوقات متقاربة أكثر:

• أدوية معينة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية (جاجيات قنوات الكالسيوم من مجموعة ديهيدروبيبردينين مثل فيلوديبين وأملوديبين).

• أدوية معينة لعلاج عدم انتظام أو شذوذ في نظم القلب (مضادات اللا نظرية من المثنة III مثل أميدورون).

• حاجيات بيتا لاستعمال الموضعى (مثل قطرات العينين تيمولول لعلاج الجلوكوما).

• أدوية معينة لعلاج مرض آرثرزيمير أو الجلوكونوما (أدوية مقلدة للجملة العصبية الالدوائية مثل: تاكرين أو كارباكونول) أو أدوية التي تستعمل لعلاج مشاكل تلبية خطيرة (أدوية مقلدة للجملة العصبية الوريدية مثل دوبوتامين، إيزوبرينيلين).

• أدوية لعلاج السكري بما في ذلك الإنسولين.

• مواد التخدير (مثلاً خلال عملية جراحية).

• ديجيتايليس، لعلاج قصور القلب.

• مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية (NSAIDs) لعلاج التهاب المفاصل، الألم أو الالتهاب (مثل إيبوبروفن أو ديكوفيناك).

• أي دواء يمكن أن يؤدي إلى خفض ضغط الدم سواء كان ذلك

متعمداً أو لم يكن متعمداً، مثل أدوية لخفض ضغط الدم، أدوية معينة للإكتئاب (مضادات إكتئاب ثلاثية الحلقة مثل إيميبرامين أو أميريتريتين)، أدوية معينة لعلاج الصرع أو خلال التخدير (باربيتورات مثل فينوباربิตال)، أو أدوية معينة لعلاج الأمراض

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول القرص في الصباح مع أو بدون طعام.

الحمل والرضاعة

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية وذلك إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

هناك خطورة بأن إستعمال بيسوبرولول فومارات إينو قامد خلال فترة الحمل من شأنه أن يلحق الضرر بالجنين. إذا كنت حاملاً أو مرضعة، يجب تناول العلاج بـ بيسوبرولول فومارات إينو قامد خلال فترة الحمل للحمل، لا يُعرف فيما إذا كان بيسوبرولول فومارات إينو قامد خلال فترة الحمل، لا يوصى بالإعراض خلال فترة العلاج بـ بيسوبرولول فومارات إينو قامد.

السياسة وإستعمال الماكنت

إن القدرة على السياسة أو إستعمال الماكنت قد تتأثر جراء إجراء العلاج على الدواء. يجب توخي المذكر خاصة في بداية العلاج، عند رفع المقدار الدوائي من الدواء، عندما يتم إجراء تغييرات في العلاج الدوائي، أو جراء إستهلاك الكحول.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل طيبك فقط.

يجب بدء العلاج بـ بيسوبرولول فومارات إينو قامد بمقدار دوائي منخفض ومن ثم رفعه تدريجياً.

يقرر طيبك كيف يرفع المقدار الدوائي.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

علاج حالات مُزمنة لقصور القلب المستقر

غالباً، يتم رفع المقدار الدوائي على النحو التالي:
1.25 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة أسبوع
2.5 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة أسبوع
3.75 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة أسبوع

5 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة أسبوع
7.5 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة أسبوع

10 ملغ بيسوبرولول مرة في اليوم لمدة 4 أسابيع
دعام ثابت (مستمر).

المقدار الدوائي الأعلى الموصى به لل يوم هو 10 ملغ بيسوبرولول.
كمّر متعلّق بتحملك للدواء، من شأن طيبك أن يطيل الفترة حتى رفع المقدار الدوائي.

إذا تفاقمت حالتك أو إذا لم تكن قادرًا على تحمل الدواء، فمن الجائز أن يحتاج الأمر خفض المقدار الدوائي ثانية أو التوقف عن العلاج.
إن مقادير دوائية داشماً أقل من 10 ملغ بيسوبرولول يمكن أن يكون كافياً لدى بعض المتعالجين.

يرشدك طيبك كيف يتصرف.

إذا توجب عليك التوقف عن العلاج تماماً، سيسوبيك طبيبك عادة بخفض المقدار الدوائي بالتدريج، وإلا فإن حالتك قد تتفاقم.

علاج فرط ضغط الدم

نظام المقدار الدوائي الموصى به هو 5 ملخ، مرة في اليوم. في حالات فرط ضغط الدم الطفيف من الجائز أن يقرر طبيبك بأن نظام مقدار دوائي ذو 2.5 ملخ مرة في اليوم سيكون كافياً. إذا كان الأمر ضروريًا، فمن الجائز أن يصدر لك الطبيب تعليمات برفع المقدار الدوائي من الدواء إلى 10 ملخ، مرة في اليوم.

علاج الذبحة الصدرية (Angina pectoris)

نظام المقدار الدوائي الموصى به هو 5 ملخ، مرة في اليوم. إذا كانت إستجابتك غير كافية، فمن الجائز أن يصدر لك الطبيب تعليمات برفع المقدار الدوائي من الدواء إلى 10 ملخ، مرة في اليوم. المقدار الدوائي لدى متعالجين لديهم إضطرابات في وظائف الكبد والكلية

عادة لا تتطلب ملائمة للمقدار الدوائي، وذلك لدى متعالجين لديهم إضطرابات في وظائف الكبد أو الكلية بدرجة خطورة طفيفة حتى متوسطة. لا يجوز تجاوز مقدار دوائي يومي ذو 10 ملخ لدى متعالجين لديهم إضطرابات خطيرة في وظائف الكبد أو الكلية.

الاستعمال لدى المتعالجين المستنين
لا تتطلب ملائمة للمقدار الدوائي.

الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين
بيسوبيروول فومارات إينوفامد غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين لأنه لم يتم فحص النجاعة والسلامة لدى هذه الفئة من العمر.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
العلاج بـ بيسوبيروول فومارات إينوفامد هو عادة طويل الأمد.

السحق/الشطر/المضبة:

لا يجوز سحق أو ضغط القرص. بالإمكان شطر القرص وتناول نصف مقدار دوائي بحسب الحاجة.

إذا تناولت بالخطأ قدرًا دوائياً أكبر أو إذا بليغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علامات تناول مقدار دوائي مفرط من بيسوبيروول فومارات إينوفامد يمكن أن تشمل تباطؤ نظم القلب، صعوبات خطيرة في التنفس، دوار أو إرتخاف.

إذا نسبت تناول الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول في أي حال من الأحوال مقدارًا دوائياً مضاعفاً للتغيير عن المقدار الدوائي المتفق الذي نسبته. تناول المقدار الدوائي الإعتيادي في صباح اليوم التالي.
 يجب الموازلة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تغيير أو التوقف عن العلاج بـ بيسوبيروول فومارات إينوفامد بدون إستشارة طبيبك، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. وإلا، فإن حالتك قد تتفاقم.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء. والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال بيسوبيروول فومارات إينوفامد قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى أي منها.

من أجل تفاصي رود فعل حاد، توجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تقاسي من عرض جانبي خطير، عرض جانبي الذي ظهر بشكل مفاجئ أو يتفاقم بسرعة.

الأعراض الجانبية الأكثر خطورة تتعلق بالأداء الوظيفي للقلب:

- تباطؤ في نظم القلب (قد يؤثر على أكثر من 1 من بين 10 متعالجين)
- تفاقم قصور القلب (قد يؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين)
- نبض بطيء أو غير منتظم (قد يؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج)

إذا شعرت بدوار، ضعف أو صعوبات في التنفس - توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- إرهاق، ضعف، دوار، صداع
- ضغط دم منخفض

مشكلات في البطن أو في الأمعاء مثل غثيان، إسهال، تقيؤات، إمساك الشعور بالبرد وحدر في اليدين وفي القدمين

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 متعالجين من بين 1,000:

- مشاكل في التنفس لدى مرضى الربو أو أمراض رئوية مزمنة
- ضغط عضلي، تقلصات عضلية
- إضطرابات في النوم
- إكتئاب

دوار عند النهوض

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- نتائج فحوص دم مميزة لوظائف الكبد أو نسب شحوم ذات نسب مختلفة عن المعتاد

• إلتهاب في الكبد الذي يمكن أن يؤدي إلى إصفار الجلد أو إصفار بياض العينين

إغماء:

- إنخفاض في إفراز سائل الدموع

إضطرابات في السمع

• رشح على خلفية تحسسية

ردود فعل شديدة بالحساسية مثل حكة، إحمرار، طفح، عليك التوجه للطبيب فوراً إذا كنت تشعر بردود فعل تحسسية أكثر

خطورة، التي قد تشمل إنتفاخ في الوجه، الرقبة، اللسان أو الحنجرة، أو صعوبات في التنفس

- مشاكل في إنصباب العضو الذكري

• كوابيس، هذيان

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر

لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:
• تهيج وإنحراف العين (الإلتهاب المترافق)

• تساقط الشعر

• ظهور أو تفاقم طفح جلدي حرشي (الصدفية)، طفح جلدي شبيه بالصدفية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التموزج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الأرخص وذلك لنفاده إصابتهم بالتسمم. لا تنسى التقييم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• خزن بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

• يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

• بالنسبة لعبوة قنفية (وعاء بلاستيكي) - فإن فترة الصلاحية بعد الفتح للمرة الأولى لقنفية ذات 30 قرصاً:

بالإمكان الاستعمال لمدة 45 يوماً، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء صلاحية الدواء.

• لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العلبة.

• لا يجوز رمي هذا المنتج الدوائي في القمامه المنزليه، إسأل الصيدلي الخاص بك حول كيفية التخلص من المنتجات الطبية التي لم تعد بحاجتها بعد. بذلك يمكنك المساعدة في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:

Calcium Hydrogen Phosphate Anhydrous, Cellulose Microcrystalline (PH-112), Silica Colloidal Anhydrous, Crospovidone (type-A), Magnesium Stearate, Hypromellose 6cP, Titanium Dioxide (E171), Macrogol 400.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '2'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 5 ملخ: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '5'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 10 ملخ: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '10'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 2.5 ملخ: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '2'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 152.66.340999: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '152.66.340999'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 152.67.340988: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '152.67.340988'.
أعراض بيسوبيروول فومارات إينوفامد 152.68.340977: يبدو الدواء كقرص مطلي مستدير لونه أبيض ومحدب من كلا الجانبين، مطبوع في جانب واحد الحرف 'P' وخط للشطر، وفي الجانب الثاني مطبوع الرقم '152.68.340977'.
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.