

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلانية (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

كالوبيا® أقراص مغلفة

المادة الفعالة وكميتها بوحدة مقدار دولاني:

Each film-coated tablet contains:

Dried liquid extract of Pelargonium sidoides roots (1: 8- 10) (EPs® 7630) 20 mg

Extraction agent: ethanol 11 % (w/w)

كل قرص مغلف يحتوي على:

20ملم مستخلص سائل مجفف النبات اللقني السيداوي - بيلارجونيوم سيديويس (1:8-10) (EPs® 7630).

سائل المستخلص: 11% إيثانول في المحجم.

لقائمة كافة المواد الغير فعالة ومولدات الحساسية في الدواء – انظر البند 6.

لمعلومات هامة عن بعض مركبات الدواء – انظر البند 2.

اقرأ النشرة يامعانا حتى نهيئها قبل أن تستعمل الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الدواء كالوبيا أقراص مخصص للكبار، المراهقين والأطفال فوق عمر 6 سنوات.

عليك تناول الدواء بحسب التعليمات في بند المقدمار الدولاني في هذه النشرة.

استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك التوجه للطبيب في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو في حال تدهور حالتك بعد 7 أيام من استعمال الدواء.

1. لأي غرض يخصص الدواء؟

الدواء كالوبيا أقراص مخصص:

- للاستعمال عند الزكام.

- لعلاج أعراض التهاب القصبات الحاد (التهاب الشعب الهوائية في مجاري التنفس).

الفصلية العلاجية: دواء نباتي لعلاج السعال والزكام. يمكن أن يتميز الزكام بأعراض مثل: سعال، نزلة، ألم في الحنجرة أو سخونة.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للنبات اللقني السيداوي (Pelargonium sidoides) أو لكل واحد من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء.

- قلّمت المركبات الإضافية مفضلة في البند 6.

- كنت تعاني من مرض كبدى حاد. حيث ليست هناك تجربة كافية بما يتعلق استعمال الدواء في هذه الحالات.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

يجب التوجه للطبيب في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو في حال طرأ تدهور في حالتك بعد 7 أيام من استعمال الدواء.

يجب التوجه للطبيب فوراً في كل حالة سخونة والتي تستمر لمدة أيام. ضيق تنفس أو بغم دموي.

يجب التوقف عن استعمال الدواء كالوبيا أقراص والتوجه للطبيب في حال تطور أعراض التي من شأنها أن تشير إلى تضرر في وظائف الكبد (مثل: تغير في لون الجلد وبياض العين أو ملتحمة العين للأصفر، بول داكن، ألم حاد في أعلى البطن، فقدان الشهية).

إذا كنت تتناول، أو تناولت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيبة وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ليس معروفاً فيما إذا هناك تفاعلات بين كالوبيا أقراص وبين أدوية أخرى.

استعمال الطعام: يمكن تناول الدواء كالوبيا أقراص مع أو بدون طعام. يجب تناول الدواء مع كمية كافية من سوائل الشرب (بفضل كأس ماء).

الحمل والإرضاع: لا يجوز استعمال كالوبيا أقراص في فترة الحمل والإرضاع وذلك لعدم وجود معلومات كافية بما يتعلق بالاستعمال في فترة الحمل والإرضاع.

السباحة واستعمال الماكناك:

لا يوجد لكالوبيا أقراص تأثير أو لديه تأثير غير ملحوظ على قدرة السباحة وتشغيل الماكناك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء كالوبيا أقراص على الككوز. عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كان لديك عدم تحمل لسكريات معينة.

3. كيفية استعمال الدواء

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي في حال عدم تأكّد بشأن المقدار الدولاني وكيفية استعمال المستحضر.

المقدار الدولاني المعتاد عادة:

لدى الكبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة: قرص مغلف واحد 3 مرات في اليوم.

لدى الأطفال بين الأعمار 6-12 سنة: قرص مغلف واحد مرتين في اليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدولاني الموصى به.

فترة العلاج بالدواء كالوبيا أقراص: بعد تخفيف أعراض المرض، يوصى بمواصلة العلاج بالدواء كالوبيا أقراص لمدة إضافية، وذلك لمنع عودة المرض.

عليك التوجه للطبيب في حال لم يطرأ تحسن على حالتك أو في حال طرأ تدهور في حالتك بعد 7 أيام من استعمال الدواء.

لا يجوز تناول الدواء كالوبيا أقراص لفترة تتعدى 3 أسابيع.

كيفية استعمال الدواء كالوبيا أقراص: يجب تناول القرص المغلف بواسطة البلع في كل صباح، ظهر، مساء.

في حال تناول الدواء مرتين في اليوم يجب تناول القرص المغلف بواسطة البلع كل صباح ومساء.

يجب بلع القرص المغلف مع كمية كافية من سوائل الشرب (مثلاً كأس من الماء). لا يجوز تناول القرص موضعية استلقاء.

سحق/ شطر/ مضغ: لا تتوفر معلومات حول سحق. لا يمكن شطر القرص وذلك لعدم تواجد خط شطر.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دولانياً مفرطاً عليك إبلاغ طبيبك، هو يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة للتصرف على نحو ما.

ليس معلوماً حتى الآن عن أعراض معينة في حال تناول مقدار دولاني مفرط.

إذا ظل طين من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك. إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المعتاد، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الصيدلي أو الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! تحقق من المصق والمقدار الدولاني في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لم الأمل ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كالوبيا أقراص أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تصاب بأي واحدة منها.

قائمة الأعراض الجانبية المفصلة فيما يلي تشمل كل الأعراض الجانبية التي تم التبليغ عنها خلال فترة العلاج بجذر النبات اللقني السيداوي (بيلارجونيوم سيديويس)، بما في ذلك حالات تناول مقدار دولاني مرتفع وبلاستعمال طويل الأمد.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) والتي تستلزم عناية خاصة:

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً لتلقي المساعدة الطبية عند ظهور مؤشرات لحساسية زائدة (رد فعل تحسسي) مثل:

انتفاخ في الوجه، ضيق تنفس وانخفاض ضغط الدم.

أعراض جانبية ليست شائعة (uncommon) والتي تظهر لدى 10-10 مستعملين للدواء من بين 1000:

مضايقة في الجهاز الهضمي مثل: ألم في البطن، حرقة، غثيان أو إسهال، ارتفاع بوظائف الكبد.

أعراض جانبية نادرة (rare) (التي تظهر لدى 10-1 مستعملين للدواء من بين 10,000):

حساسية زائدة في الجلد (طفح، شرى، حكة في الجلد أو في الغشاء المخاطي)، تزيق خفيف في اللثة أو الأنف.

هذه الأعراض قد تظهر أيضاً عند تناول الدواء في المرة الأولى.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروف:

ضرب كبدى ويزرقان، ليست هنالك علاقة بين هذه الأعراض الجانبية وبين تناول الدواء كالوبيا.

تعداد منخفض لصفائح الدم المسبب لذلك قد يكون خلفية مرضية قائمة مثل: زكام أو التهاب القصبات الحاد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض عقب علاج دولاني" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على عبوة الكرتون و/أو اللوحة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على المواد غير الفعالة التالية: Maltodextrin, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, precipitated silica, magnesium stearate, hypromellose 5 mPas, macrogol 1500, iron oxide red E172, iron oxide red E171, titanium dioxide E171, talc, simethicone, methylcellulose, sorbic acid.

كفيا بيدو الدواء وما هو محتوى الطبية، الدواء كالوبيا أقراص بيدو كقرص مغلف دائري بلون بني-أحمر وبدون خط للشطر.

الأقراص المغلفة معبأة في لويحات بلاستيك (بليستز)، والمعبأة في علب كرتون.

حجم العبوة: يتم توريد الدواء كالوبيا أقراص بعبوات كرتون التي تحتوي على لويحات بلاستيك وفيها 15 أو 21 قرص مغلف. تتوفر عبوات التي تحتوي على 15، 15، أو 30 قرص مغلف. من الجائز ألا تسوق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل والمسئور: د. دسامونيلوف استيراد وتسويق م.رض، رمز الشركة 512260944، ص. ب 2486، رعناثا 436500، هاتف: 09-7483769.

المنتج: د. ويلهلم شوابي، كارلسروه ألمانيا.

تم تبليغها في حزيران 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 160-53-34993-00

من أجل سهولة وتبوين الفزارة، صيغت هذه النشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.