

ПОЛИДИН®

ЛОСЬОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача.

Активное вещество и его концентрация: Povidone Iodine 7.5%
Неактивные вещества и аллергены в составе препарата: См. раздел 6 "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Правильно примените препарат. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ?

- Препарат предназначен для дезинфекции ран, для дезинфекции кожи и профилактики кожных инфекций, вызываемых бактериями и грибами, для дезинфекции кожи при кожных заболеваниях и для дезинфекции рук и кожного покрова перед операций.
- **Фармакологическая группа:** антисептические вещества (дезинфицирующие средства).

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРЕПАРАТА:

Не применяйте препарат, если:

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности (аллергии) к одному из компонентов препарата или к йоду.

Если у Вас повышенная чувствительность к какому-либо продукту питания или препарату, сообщите об этом врачу перед началом применения данного препарата.

Особые предостережения относительно применения данного препарата:

- Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность в результате межлекарственных взаимодействий.
- Воздержитесь от нанесения препарата на обширные участки кожи. Проконсультируйтесь с врачом перед обработкой глубоких ран.
- Не применяйте препарат, не проконсультировавшись с врачом до начала лечения, если Вы страдаете или страдали в прошлом от дисфункции щитовидной железы.
- **Беременность и кормление грудью:** если Вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед применением данного препарата.

3. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИМЕНЯЮТ ПРЕПАРАТ?

Необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам, вызывающим у Вас сомнения.

Обратите внимание: не глотать! Данный препарат предназначен только для наружного применения.

Способ применения препарата – общие указания:

- Смочите кожу или волосы водой. Нанесите немного лосьона Полидин, вспенивайте его в течение двух минут, затем тщательно промойте водой.

- Для медицинского персонала: смочите водой руки до локтей. Нанесите около 3 куб. см лосьона Полидин и вспенивайте его в течение 2-3 минут. Промойте водой. Повторите процедуру и тщательно промойте водой. Вытрите стерильным полотенцем.
- Дезинфекция кожи и слизистых оболочек перед операцией: нанесите лосьон Полидин на влажную марлю и в течение 2-3 минут промывайте с помощью неё оперируемый участок кожи. Промойте водой. Повторите процедуру и снова промойте водой. Затем нанесите раствор или настойку полидина на чистый участок кожи и оставьте просыхать.

- **Не применяйте препарат в темноте!** Проверьте этикетку и дозировку **каждый раз** при применении препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

4. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- Как и при применении любого другого препарата, применение лосьона Полидин может вызвать побочные эффекты у некоторых пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.
- Во время применения препарата наряду с желаемым действием могут возникнуть побочные эффекты, например: продолжительные сыпь, раздражение или отеки.
- При усугублении какого-либо из побочных эффектов или при появлении побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, необходимо проконсультироваться с врачом.

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- **Избегайте отравления!** Данный препарат, как и любой другой, следует хранить в закрытом, недоступном для детей или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Если ребенок по ошибке проглотил данный препарат – немедленно обратитесь в приемное отделение больницы, захватив с собой упаковку препарата.

Не вызывайте рвоту, не получив на то однозначного указания от врача.

- Можно использовать препарат в течение 36 месяцев после первого вскрытия упаковки. Нельзя использовать препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

- Не храните препарат при температуре выше 25°C.
- Следует хранить препарат в оригинальной упаковке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Помимо активного вещества, данный препарат содержит также: Purified Water, Sodium Laureth Sulfate, Potassium Iodide, Trisodium Phosphate, Perfume FL20-02126.
- Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки
Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с характерным запахом йода. Емкость объемом 200 мл, 1000 мл.
- Владелец лицензии: фармацевтические лаборатории Фишер (1975) Лтд., ул. Бар Иохай, 9, Бней Брак, 5155309 или а/я 39071, Тель-Авив, 6139001.
- Производитель и адрес: Бен-Шимон Флорис Лтд., промышленный парк Мисгав, передвижное отделение почтовой связи Мисгав, 20174.
- Данная инструкция проверена и утверждена Министерством Здравоохранения в Ноябре 2014 г. и была обновлена в Декабре 2021 г., в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения.
- Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения: 131.90.23413.