

## بوليديين®

### غسول

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بدون وصفة طبيية.

**المادة الفعالة وتركيزها: Povidone Iodine 7.5%**

**المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر،** أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك استعمال الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

#### 1. لأي غرض مخصص للدواء؟

- هذا الدواء مخصص لتطهير الجروح، لتطهير ومنع تلوّثات الجلد الناجمة عن الجراثيم والفطريات، للتطهير عند الإصابة بأمراض الجلد ولتطهير اليدين والجلد قبل العمليات الجراحية.
- **الفصيلة العلاجية:** مواد مطهرة (مطهرات).

#### 2. قبل استعمال الدواء:

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

لا يجوز الاستعمال إذا كنت حساساً (البرجي) لأحد مركبات المستحضر أو لليود.

إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل استعمال الدواء.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**

- إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك، لتجنب المخاطر أو عدم فعالية الدواء الناجمة عن تفاعلات بين الأدوية.
- تجنب الاستعمال على مناطق واسعة من الجلد. يجب استشارة الطبيب قبل علاج الجروح العميقة.
- لا يجوز استعمال الدواء بدون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الغدة الدرقية.
- **الحمل والإرضاع:** إذا كنت حاملاً أو مرضعة، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

#### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

**انتبه: ليس للبلع!** هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

**طريقة استعمال المستحضر - تعليمات عامة:**

- رطب بالماء الجلد أو الشعر. ضع قليلاً من **غسول بوليديين**، قم بارتداء غطاء لمدّة دقيقتين ثم اشطف جيداً بالماء.
- **للطعام الطبي:** رطب اليدين والذراعين بالماء. ضع حوالي 3 سم مكعب من **بوليديين غسول** وارغعه لمدة 2-3 دقائق. اشطف بالماء. كرر العملية مرة ثانية واشطف جيداً. جفف بمنشفة معقمة.

- تطهير الجروح والأنسجة المخاطية قبل العملية الجراحية: ضع **بوليديين غسول** على شاش طبي رطب واسع منطقة العملية لمدة 2-3 دقائق. اشطف بالماء. كرر العملية ثم اشطف ثانية بالماء. ادهن بوليديين مطرول أو بوليديين كحولي على المنطقة النظيفة واتركها تجف.
- **لا يجوز استعمال الأدوية في العتمة!** يجب تشخيص طابع الدواء والمقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا احتجت لها.

#### 4. الأعراض الجانبية:

- كما بكل دواء، إن استعمال **بوليديين غسول** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
- إضافة إلى التأثير المرغوب للدواء، خلال استعماله قد تظهر أعراض جانبية مثل: طفح، تهيج، أو انتفاخ مستمر.
- إذا تعاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتفادى إصابتهم بالتسمم. إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.
- **لا تسبب التقيؤ** بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمكن استعمال الدواء حتى 36 شهراً بعد فتح القنينة لأول مرة. لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية.

#### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:  
Purified Water, Sodium Laureth Sulfate, Potassium Iodide, Trisodium Phosphate, Perfume FL20-02126.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟  
سائل رائق بلون بني غامق، ذو رائحة يود اعتيادية، المحتوى 200 مل، 1000 مل.
- صاحب الامتياز: فيشر مختبرات دوائية (1975) م.ض، شارع بار يوحاي 9، بني براك 5155309 أو ص.ب. 39071، تل أبيب 6139001.
- اسم المنتج وعنوانه: بن شمعون فلوريس م.ض، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد جوال مسغاف 20174.
- صيغة هذه النشرة أقرت من قبل وزارة الصحة ومحتواها فُحص ورُخص من قبله بتاريخ 2014 وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ كانون الأول 2021.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 131.90.23413
- من أجل السهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.