

٤ التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعملين أو إذا استعملت مثلك أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
- بلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناولين أي واحد من الأدوية التالية:
- أدوية مضادات الصرع مثل باربيتورات، هيانتونيز وكاربامازيبين.
- أدوية اللتواثات - مثل جريسيوفولفين وربافاميسين.
- أدوية اللتواثات الفروسوة - مثل نفيراين، إيفاقيرينز، ريتونافير أو دلفيناير.
- المستحضرات النباتية الحاوية على St. John Wort (سيكيميك بيرفوراتور) أو ريتونافير.
- أي واحد من الطبيب إذا كنت تناولين مثلك أدوية أخرى من الأدوية التالية: أوبيتابيفير (paritaprevir) أوبيتاباسفير (ombitasvir) أو داسابوغير (dasabuvir).
- غوص الدم (ارتفاع إنزيم الكبد ALT) إن خطورة حدوث ذلك مع أوقيستين كريم قد يؤدي لارتفاع نتائج وظائف الكبد في إذا كنت غير متأكدة من ذلك استعملين أحدى الأدوية التي ذكرت سابقاً تحدثي مع طبيبك قبل استعمال أوقيستين كريم.
- إذا كنت تعانين من ثلث في المهبل، فيجب مراجعته قبل استعمال أوقيستين كريم.

٥ العمليات الجراحية

- بلغ طبيبك بأنك تستعملين أوقيستين كريم، إذا كنت مقدمة على الخصوص لعملية جراحية، من الجائز أن تضرر الكبد عن استعمال HRT قبل حوالي 4 أسابيع من العملية الجراحية، وذلك للتقليل من خطورة حدوث دمومة.

٦ الحمل والرضاع

- لا تستعمل أوقيستين كريم إذا كنت في فترة الحمل أو من شأنك أن تكوني حاملاً وذلك لأنه قد يؤثر على الرضيع.

إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة، فيجب مراجعته قبل تناول أي دواء.

٧ السياقة وإستعمال الماكينات

- لا يوجد لأ OCIستين كريم على سينيكل الجلد وستيبريل الكحول. وهذه قد تسبب ردود فعل موضعية في الجلد (متلا، إلتهاب الجلد بالتماس (Contact dermatitis

٨ كيافية إستعمال الدواء؟

- يجب استعمال أوقيستين كريم دائماً بحسب تعليمات الطبيب، عليك الاستشارة على المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.
- إذا تم استعمال أوقيستين كريم بدلاً من الصيدلي، فيمكنك به استعمال أوقيستين كريم حالاً.

- إذا لم يستبدل علاج HRT من نوع آخر حيث كانت لديك دورة شهرية خالله، فيبدئي بإستعمال أوقيستين كريم بعد أسبوع من نهاية علاج HRT السابق.
- المقدار الدوائي وطريق العلاج محددة من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إنبيجي: هذا الدواء مخصص لإستعمال المهبلي (في المهبلي).

٩ للمشاكل الدوائية

- المقارن الدوائي الإعتمادي هو موصل (applicator) واحد مليء حتى الحلقة الدائرية (0.5 مل من الكريم) في اليوم، لفترة 2 حتى 3 الأسابيع الأولى.

- بعد ذلك، المقدار الدوائي هو موصل (applicator) واحد مليء حتى الحلقة الدائرية، مرتين في الأسبوع.
- يصف لك طبيبك المقدار الدوائي الأخفض الذي يخفف من الأعراض لديك. من الجائز أن يرغب الطبيب بأن تنتهي عن العلاج من حين لآخر (كل 2 حتى 3 أشهر لفترة 4 أسابيع)، وذلك للتأكد فيما إذا كنت بحاجة للعلاج حتى الآن.

١٠ تعليمات الإستعمال:

أوقيستين كريم متضمن عبوة تحتوي على موصل (applicator) من البلاستيك الشفاف.

استعمل الموصل (applicator) لوضع الكريم في المهبلي. توقف جيد لنقل ذلك هو قبل الخلوذ للنوم.

هناك حلقة دائرة على ظهر الموصل، قومي بملء الموصل - أوقيستين كريم حتى الحلقة الدائرية وذلك لتحصلي على المقدار الدوائي الصحيح.

١١ تابعي التعليمات التالية:

1. إنزع الغطاء عن الأنابيب وأقليبي الخطاء. بعد ذلك إستعمل نقطة الحادة الموجودة على الغطاء لفتح الأنابيب.

2. قومي بخلوة طرف الموصل على الأنابيب.

١٢ ٣. أصعر الأنابيب وذلك لملء الموصل بالكريم، حتى الحلقة الدائرية الحمراء (سيتوقف المكبس عند الحلقة الدائرية الحمراء).

٤. قومي بخلوة الموصى عن الأنابيب إلى الخارج وأغلقي الأنابيب بالخطاء.

5. من أجل إدخال الكريمه، قومي بالاستقاء على الظهر، أدخل طرف الموصل عميقاً داخل المهبلي، وإنفعي المكبس ببطء حتى النهاية.

٥. تنظيف الموصى

بعد الإستعمال، إسحبجي المكبس إلى خارج الماسورة.

٦. إغسلي المكبس والماسورة بماء الصابون الدافئ.

٧. لا تستعملمي مواد لتنظيف. إغسلني بيدياً بالماء النظيف بعد ذلك.

٨. بالإمكان تنظيف أوقيستين كريم سهلة بواسطة الماء.

٩. الشخص الواجب إجراءها قبل إستعمال الدواء، الرجال أنتظري الفقرة 2.

- إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا قمت ببعض شخص ما ببعض الدواء بالخطأ، فعليك التحدث مع طبيبك، وذلك لأنك قد تشعررين أنت/نفس الشخص، بغثنان أو بتعذر.

- يصف لك طبيبك المقدار الدوائي الأخفض الذي يخفف من الأعراض لديك. من الجائز أن يرغب الطبيب بأن تنتهي عن العلاج من حين لآخر (كل 2 حتى 3 أشهر لفترة 4 أسابيع)، وذلك للتأكد فيما إذا كنت بحاجة للعلاج حتى الآن.

١٠ إذا سببت إستعمال الدواء

- إذا نسبت إستعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز إستعمال مقدار دوائي مضاعف.

١١ ضعفي المقدار الدوائي المنسي حال تذكرك واستشيري الطبيب، إلا إذا كان التأخير أكثر من 12 ساعة عن الوقت المطلوب.

- إذا تأخرت أكثر من 12 ساعة عن الوقت المطلوب، فوتي المقدار الدوائي المنسي.

١٢ يجب الظاظة على الملاجء بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج الدوائي بدون استشارة طبيبك حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

١٣ في حال توقفك عن إستعمال الدواء

- وأصلني استعمال هذا الدواء كما يصف لك من قبل الطبيب حتى ولو بدا لك بأنك تشعررين بتحسن. في حال توقفك عن الإستعمال أبكر من اللازم أو بشكل مفاجئ، فمن شأن ذلك أن تعود.

- لا يجوز استعمال الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعملين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

١٤ ٤. الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن إستعمال أوقيستين كريم قد يسبب أعراض جانبية بدرجات بعض المستعملات.

- لا تتدهنسي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاشرين أي منها.

١٥ يجب توجيه حالاً إلى الطبيب إذا كنت لاحظين حدوث أي واحد من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - من الجائز أن يقر طبيبك على إيقاف إستعمال الكريم:

- ١٦ ارتفاع ضغط الدم لديك.

١٧ يصبح جلدك أو اللون الأبيض في العينين بلون أصفر (يرقات).

١٨ لديك صداع مفاجئ يشبه الشقيقة (أنظر الفقرة 2 سابقًا - أوقيستين كريم والقلب أو الدورة الدموية).

١٩ لديك لامات حادة خدورة دموية (أنظر الفقرة 2 سابقًا - أوقيستين كريم والقلب أو الدورة الدموية).

٢٠ لديك واحد أو أكثر من المشاكل التي ذكرت في الفقرة 2 (أنظر سابقًا - لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا): تلك الأعراض الجانبية هي نادرة.

٢١ أعراض جانبية إضافية:

- ٢٢ تهيج أو حكة في الجلد داخل أو من حول المهبلي عند بدء إستعمالك - أوقيستين كريم. يتحسن هذا العرض عادة بعد عدة أسابيع.

٢٣ زيادة الإفراز المهبلي، نزف أو بقع.

٢٤ مشاكل في كبس المدار.

٢٥ مشاكل في البطن مثل طفح أو حساسية للشمس.

٢٦ إنفاس، حساسية أو ألم في الثديين.

٢٧ صداع.

٢٨ غثيان أو تقيؤ.

٢٩ أعراض شبه الإفلونزا.

إذا كنت تعانين من إحدى تلك الأعراض الجانبية، بلغي طبيبك؛ فمن شأنه أن يقرر على إيقاف العلاج لفترة من الزمن.

٣٠ الخرف (اختلال العقل)

- HRT لا يمنع فقدان الذاكرة. في بحث واحد بدأت فيه النساء علاج بـ HRT مركب بعد سن 65 سنة، لوحظت زيادة طفيفة في خطورة حدوث خرف.

- إذا ظهر عرض جنبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانين من عرض جنبي لم يذكر في هذه التنشرة، عليك إستشارة طبيبك.

٣١ التبليغ عن أعراض جانبية:

- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التموزج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il> www.perrigo-pharma.co.il

٣٢ كيافية تخزين الدواء؟

- ٣٣ تجنبي النسمة! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبنية ومجارى الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالسم.

٣٤ التقى بدوره على طلاق العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- ٣٥ شروط التخزين: يجب تخزينه بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية، لا يجوز التخزين، إلا في المكان الاستعمال خلال 35 يوماً من الفتح الأولي، بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، الأقرب من بينهما.

- ٣٦ لا يجوز زراعة الأدوية إلى المجرى أو لوعاء القمامنة المنزلية، إسألني الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الاستعمال، تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

٣٧ معلومات إضافية حول الدواء

- ٣٨ يحتوى الدواء بالإضافة للملاء الفعالة أيضاً على مركبات غير فعالة:

Purified water, glycerol, stearyl alcohol, octyldodecanol, cetyl alcohol, polysorbate 60, cetyl palmitate, sorbitan stearate, lactic acid, chlorhexidine dihydrochloride, sodium hydroxide.

كيف يبدو الدواء بالإضافة للملاء الفعالة أيضاً على مركبات غير فعالة:

أوقيستين كريم هو عبارة عن كثلة متباينة، ملساء، بيضاء حتى يझوأها ذات قوام كريمي، ورائحة مميزة ضعيفة.

أوقيستين كريم موجود داخل الكرتون التي يحتوي عليه الألومنيوم ذات 15 غرام.

كل أنوية معبأة بمواد مختلفة التي يحتوي عليه الكرتون التي يحتوي عليه الألومنيوم ذات 15 غرام.

صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات بارايسين، م.ض، ديل، إيرلندا.

اسم المنتج ونوعاته: أنسين فارماز تريدينج م.ض، ديل، إيرلندا.

تم إعدادها في كانون الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 6560.21266.