

إنريبيك

100 ملغ، كبسولات

المادة الفعالة وكميتها:

تحتوي كل كبسولة إنريبيك على 100 ملг فيدراتينيب - fedratinib (على شكل دايدروكلوريد مونوهيدرات)

المواد غير الفعالة - انظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء".

ما هي أهم المعلومات التي على معرفتها عن إنريبيك؟

قد يسبب إنريبيك أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك:

• اعتلال دماغي (يشتمل على الاعتلال الدماغي لفرينكي). مشكلة عصبية خطيرة، تكون فتاكًا أحياناً تعرف باسم اعتلال دماغي (يشتمل على الاعتلال الدماغي لفرينكي)، كانت قد حدثت لدى الأشخاص الذين تناولوا إنريبيك.

الاعتلال الدماغي لفرينكي هو حالة عصبية طارئة قد تحدث إذا لم تكن في جسمك كمية كافية من فيتامين B1 (الثiamine). سبجي لك الطبيب فحص دم لفحص مستوى فيتامين B1 قبل العلاج بإنريبيك وخالله. قد يطلب منه الطبيب أن تتوقف عن تناول إنريبيك وأن تتناول مكمل فيتامين B1 إذا تطورت لديك أعراض جانبية خلل العلاج بإنريبيك.

توجه إلى الطبيب فوراً إذا عانيت من إسهال، غثيان أو تقيؤات لا تستجيب للعلاج.

توجه لنلقي مساعدة طبية طارئة فوراً إذا تطورت لديك الأعراض التالية:

- ارتياب، مشاكل في الذاكرة أو تعاس
- مشاكل في التوازن والحركة، مثل صعوبة في المشي
- مشاكل في العينين، مثل ازدواجية أو ضبابية الرؤية أو حركات غير سليمة في العينين

توجه إلى الطبيب إذا شعرت بأنه قد طرأ انخفاض سريع على وزنك أو انخفاض الوزن الذي لا يتحسن مع العلاج.

1. لم أعد هذا الدواء؟

إنريبيك معد لعلاج البالغين الذين لديهم تليف نفري (Myelofibrosis) أولى أو ثانوي (بعد كثرة الحمر الحقيقة أو كثرة الصفيحات الأولية)، درجة خطر معتدلة-2 أو مرتفعة.

المجموعة العلاجية: مادة مضادة للأورام، مثبطات بروتين كيناز

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (ارجحية) لفيدراتينيب، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (كما هو مفصل في الفصل 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

- انظر البند "ما هي أهم المعلومات التي على معرفتها عن إنريبيك؟" في بداية النشرة.

قبل بدء العلاج بإنريبيك، أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك تعدادات كريات الدم الحمراء أو الصفائح الدموية منخفضة (انظر الفصل "الفحوصات والمتابعة")

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد (انظر الفصل "الفحوصات والمتابعة")

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكلى (انظر الفصل "الفحوصات والمتابعة")

كان لديك سرطان في الماضي

كانت لديك خثرة دموية، نوبة قلبية، مشاكل قلب أخرى أو سكتة دماغية

كنت مرضعة أو خططين للرضاعة (انظر الفصل "الحمل والإرضاع")

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في البنكرياس (انظر الفصل "الفحوصات والأطفال والمرأهقون")

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاماً. ليست هناك معلومات متعلقة بسلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاماً.

الفحوصات والمتابعة

سيجري لك الطبيب فحوصات دم قبل بدء العلاج، خالله، ووفقاً الحاجة الطبية لفحص:

- مستوى الثiamine (فيتامين B1)

• تعداد الدم الكامل بما في ذلك الصفائح الدموية

◦ كرياتينين، وبيتروجين في الدم مصدرها من البيروريا (BUN) (الذين يشير مستواهما إلى أداء الكبد)

◦ الأميلاز والليزيز اللذين يشير مستواهما إلى أداء البنكرياس

◦ قد يلائم طبيبك الجرعة أو يوقف العلاج استناداً إلى نتائج فحوصات الدم.

إذا كنت تتناول، تناولت مخراً، أو قد تتناول أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

قد يؤثر إنريبيك وأدوية أخرى في بعضها البعض وقد يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوب فيها. تعرف إلى الأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة الأدوية واعرضها على الطبيب والصيدلي عندما تحصل على دواء جديد.

قد تزيد الأدوية التالية خطورة ظهور أعراض جانبية مع إنريبيك:

- كيناتوكارازول، فلوكونازول (يُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)

◦ فلوفروكسامين (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على الشتنجات أو الاختلاجات)

◦ ريتونافير (يُستخدم لعلاج عدوى HIV/AIDS)

يمكن أن تقلل الأدوية التالية نجاعة إنريبيك:

- ريفاميبيزين (يُستخدم لعلاج السل (TB) وعادي آخر)

◦ فينيتوين (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على الشتنجات أو الاختلاجات)

◦ إيفافرنز (يُستخدم لعلاج عدوى HIV/AIDS)

قد يؤثر إنريبيك في أدوية أخرى:

- ميدازولام (يُستخدم المساعدة على النوم أو تقليل القلق)

◦ أوميبميرازول (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على المعدة)

◦ ميتوبروپولول (يُستخدم لعلاج النبحة الصدرية أو ضغط الدم المرتفع)

◦ ميتوفورفين (يُستخدم لخفض السكر في الدم)

◦ بالإضافة إلى سيميفاستلين وديكستروميثورفان

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول الكبسولة مع أو من دون طعام.

قد يساعد تناول إنريبيك مع وجبة غنية بالدهنيات في تقليل أعراض الغثيان والتقيؤات.

الحمل والإرضاع

ليست هناك معلومات حول استعمال إنريبيك لدى النساء الحوامل. إذا كنت حاملاً على إنريبيك، وخلال شهر، على الأقل، بعد تناول الجرعة الأخيرة. تحدثي مع طبيبك حول

الطريقة الأفضل لإطعام طفلك خلال العلاج بإنريبيك.

السيادة واستعمال الماكينات

يؤثر إنريبيك قليلاً في السيادة واستعمال الماكينات.

إذا شعرت بالدوار، فلا تقد سيارة أو تشعل ماكينات حتى تزول هذه الأعراض الجانبية.

معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء

محتوى الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملخ) في كل جرعة، لهذا

يعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

• يجب استعمال إنريبيك دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأنكاً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بإنريبيك.

• لا يجوز تغيير الجرعة ولا التوقف عن تناول إنريبيك، إلا إذا أوصى لك الطبيب بذلك.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:

• 400 ملخ (4 كبسولات مدار كل منها 100 ملخ) للابتلاء مرة واحدة في اليوم.

• قد يقرر الطبيب استعمال جرعة منخفضة أكثر إذا كنت تتناول بعض الأدوية بالتزامن مع العلاج بإنريبيك أو إذا كنت تعاني من قصور عمل الكلى الحاد.

• إذا اتطورت لديك بعض الأعراض الجانبية، يمكن أن يوصي لك الطبيب بجرعة منخفضة أكثر أو إيقاف العلاج بشكل مؤقت أو دائم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

• ابتلع الكبسولات بأكملها، ويفضل مع الماء.

• لا تفتح الكبسولات، تكسرها أو تمتصها. ليست هناك معلومات حول فتح الكبسولات وتنثرها.

• يمكن تناول الكبسولات مع الطعام أو من دونه، ولكن يُ Recommended تناول إنريبيك مع الطعام لتجنب الشعور بالغثيان.

إذا تناولت عن طريق طرق مفرطة أو إذا ابتلع طفل خطأ من الدواء، توخيه حاليًا إلى الطبيب أو إلى عرقفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحبًا معك عبوة الدواء وهذه النشرة.

إذا نسيت تناول الدواء، تخطي الجرعة التي فوتها، وتتناول الجرعة التالية المخطط لها في الوقت العادي في اليوم التالي.

يُمنع تناول جرعة تعويضاً عن الجرعة المناسبة.

يجب الدعاومة على العلاج وفق توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول إنريبيك

• لا يجوز التوقف عن تناول إنريبيك، إلا إذا أوصى لك الطبيب بالقيام بذلك.

يُمنع تناول الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع التذكرة الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلنة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال إنريبيك أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند فراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أن تختفي إلى أي منها.

قد يسبب إنريبيك أعراضًا جانبية جديدة بما في ذلك:

• انظر البند "ما هي أهم المعلومات التي على معرفتها عن إنريبيك؟" في بداية هذه النشرة.

• تعدادات منخفضة من كريات الدم. قد يسبب إنريبيك تعدادات منخفضة من كريات الدم الحمراء (قفر الدم) وتعدادات منخفضة من الصفائح الدموية (thrombocytopenia) لدى بعض الأشخاص، من المحتمل أن تختفي إلى تسريب دم لفحص تعدادات دمك كثيراً. سبجي لك الطبيب فحوصات دم لفحص تعدادات الدم لديك قبل بدء العلاج بإنريبيك وخالله.

• غثيان، تقيؤات، وإسهال. قد يصف لك الطبيب أدوية معينة تساعد على علاج الغثيان، التقيؤات والإسهال.

توجه إلى الطبيب أو تلقي مساعدة طبية طارئة فوراً إذا كنت تعاني من الغثيان، التقيؤات، أو الإسهال ولم تتحسن هذه الأعراض مع العلاج.

• مشاكل في الكبد. سبجي لك الطبيب فحوصات دم لفحص أداء الكبد لديك قبل بدء العلاج بإنريبيك وخالله.

• ارتفاع مستوى الأميلاز والليزيز. قد تطرأ تغيرات على مستوى الأميلاز أو الليزيز في دمك، وقد تدل هذه التغيرات على مشكلة في البنكرياس. سبجي لك الطبيب فحوصات دم لفحص مستوى الأميلاز أو الليزيز في دمك قبل بدء العلاج بإنريبيك وخالله.

• توجه فوراً للفنار لتقنيات، أو تلقي مساعدة طبية طارئة فوراً إذا كنت تعاني من الغثيان، التقيؤات، أو الإسهال.

• ارتفاع في مركب بروتين كيناز (BUN) (الذين يشير مستواهما إلى أداء البنكرياس) قبل بدء العلاج بإنريبيك.

• تناول كرياتينين عندما تتناول إنريبيك بما في ذلك:

◦ تصلب، ألم، ضغط أو ثقل شاذ في الصدر، الحنجرة، العنق أو الفك

◦ ألم أو ازعاج في الذراعين، الظهر، العنق، الفك أو البطن

◦ ضيق في التنفس مع أو من دون ازعاج في الصدر

◦ حرث تعرق بارد

◦ غثيان أو تقيؤ

◦ إحسان بالدوار

◦ ضفت في جزء واحد أو جهة واحدة من الجسم

◦ زيادة خطر حدوث خثارات دموية. لقد حدثت خثارات دموية في أوردة الساقين (خثار في ريد عيقي، DVT) أو في الرئتين (انصمام رئوي، PE) لدى الأشخاص الذين

تناولوا مكثف بروتين كيناز (JAK) آخر لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وهي قد توجه فوراً للفنار لتقنيات، أو تلقي مساعدة طبية طارئة فوراً إذا كنت تعاني من الغثيان، التقيؤات، أو الإسهال.

◦ تناول كرياتينين كيناز (TB) (وعدوى آخر)

◦ فلوفوروكسامين (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على الشتنجات أو الاختلاجات)

◦ إيفافرنز (يُستخدم لعلاج عدوى HIV/AIDS)

◦ يمكن أن تقلل الأدوية التالية خطورة ظهور أعراض جانبية مع إنريبيك:

◦ كيناتوكارازول، فلوكونازول (يُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)

◦ فلوفروكسامين (يُستخدم لعلاج الاصابة بالقولون والقولون والمستقيم)

◦ ريتونافير (يُستخدم لعلاج عدوى HIV/AIDS)

◦ يمكن أن تقلل الأدوية التالية نجاعة إنريبيك:

◦ ريفاميبيزين (يُستخدم لعلاج السل (TB) وعادي آخر)

◦ فينيتوين (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على الشتنجات أو الاختلاجات)

◦ إيفافرنز (يُستخدم لعلاج عدوى HIV/AIDS)

◦ قد يؤثر إنريبيك في أدوية أخرى:

◦ ميدازولام (يُستخدم المساعدة على النوم أو تقليل القلق)

◦ أوميبميرازول (يُستخدم لعلاج الصرع والسيطرة على المعدة)

◦ ميتوبروپولول (يُستخدم لعلاج النبحة الصدرية أو ضغط الدم المرتفع)

◦ ميتوفورفين (يُستخدم لخفض السكر في الدم)

◦ بالإضافة إلى سيميفاستلين وديكستروميثورفان

</div