

إرلوتينيب تيقع 100 ملغ

أقراص مطالية

إرلوتينيب تيقع 150 ملغ

أقراص مطالية

التركيبة

يحتوي كل قرص مطلي من إرلوتينيب تيقع 100 ملغ على: إرلوتينيب 100 ملغ (على شكل هيدروكلوريد الإرلوتينيب)، Erlotinib 100 mg (as erlotinib hydrochloride)

يحتوي كل قرص مطلي من إرلوتينيب تيقع 150 ملغ على: إرلوتينيب 150 ملغ (على شكل هيدروكلوريد الإرلوتينيب)، Erlotinib 150 mg (as erlotinib hydrochloride)

معلومات إضافية

معلومات عن المركبات غير الفعالة والمسببة للحساسية انظر الفصل 2 بند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لغيرك. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

إذا وجدت لديك أيّة أعراض جانبية، راجع طبيب أو الصيدلي. هذا يشمل أعراض جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة (انظر الفصل 4 - "الأعراض الجانبية").

الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين دون عمر 18 عاما.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

تأثيرات الدواء

يحتوي إرلوتينيب تيقع على المادة الفعالة erlotinib. إرلوتينيب تيقع هو عبارة عن دواء يستعمل لعلاج السرطان بواسطة منع عمل البروتين المسبي للنمو المسمى Receptor Epidermal Growth Factor (EGFR).

إذا البروتين معروف بأنه يساهم في نمو وانتشار الخلايا السرطانية. إرلوتينيب تيقع مخصوص للعلاج لدى المرضى ويمكن أن يوصف لك في الحالات التالية:

• علاج مرضي يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع Non-Small Cell (NSCLC) إذا فشل علاج كيماوي سابق من إيقاف المرض لديك.

• علاج أولي لدى مرضى يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع NSCLC Non-Small Cell (NSCLC)، وذلك إذا كانت خلايا الرئة تبدي طفرة في EGFR.

• علاج مرضي يعانون من سرطان رئة متقدم من نوع EGFR ويفي مرضك بغالبيته دون تغير بعد علاج كيماوي أولي.

• علاج مرضي يعانون من سرطان البنكرياس في مرحلة متقدمة أو متشرة بمشاركة العلاج الدوائي الإعتمادي (gemcitabine).

الفصيلة العلاجية:

مضاد للأورام، من مثبطات تيروزين كيناز

2. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) للمادة الفعالة (erlotinib) أو لأحد مركبات الدواء (المفصلة في الفصل 6).
- كنت مرضعة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

نفاذات/اردوهيل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، يجب إيقاف إرلوتينيب تيقع على سكر يسمى لاكتوز. إنها قليل من قيل الطبيب بأن لديك عدم تحمل سكريات معينة، إستشر الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

يحتوي إرلوتينيب تيقع بالنسبة لتأثيراته المحتملة على القدرة على السيادة أو استعمال الماكولات. إذا قيل لك من قيل الطبيب أن يؤثر العلاج بالدواء إرلوتينيب تيقع على الأقل من عشرة الآلاف.

ذلك، من غير المحتمل أن يؤثر العلاج بالدواء إرلوتينيب تيقع على هذه القدرات.

التدخين: يوصي بالتوقف عن التدخين إذا كنت تتتعالج بـ إرلوتينيب تيقع، وذلك لأن التدخين قد يخفض كمية الدواء بالدم.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي إرلوتينيب تيقع على سكر يسمى لاكتوز.

إذا قيل لك من قيل الطبيب بأن لديك عدم تحمل سكريات معينة، إستشر الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

يجب إيقاف إرلوتينيب تيقع على أقل من 23 ملغ صوديوم في كل قرص، وذلك فإنه يعتبر خالياً من الصوديوم.

إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ إرلوتينيب تيقع يتوجب عليك إبلاغ طبيبك بشكل فوري، لكي يقرر فيما إذا كان بالإمكان مواصلة العلاج.

إذا قيل لك من قيل الطبيب أن يؤثر العلاج بـ إرلوتينيب تيقع على الأقل ساعتين قبل وجبة الطعام أو ساعتين بعد انتهاء وجبة الطعام.

إذا جوز تناول الدواء بمشاركة الجريب فروت أو عصير الجريب فروت.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

يجب إيقاف إرلوتينيب تيقع على الأقل ساعتين قبل وجبة الطعام أو ساعتين بعد انتهاء وجبة الطعام.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف

يمكن أن يزداد انتشار الماكولات.

إذا جوز تناول الدواء على سطح الجلد أو الشعور بتنبل في نهايات الأطراف