

נבלין 30 מ"ג: קפסולות בטעם ורוד, המכילה נזיל בטעם צחוב בהיר עד כתום-צהוב, עליה מודפס N30. האזינה היא של קליפסולה אחת בבליסטר (מגשית).

- בעל הרישום וכותבתו: פריאו ישאול סוכניות בע"מ, רח' הקפט 1, שוהם.
- שם הייצן וכותבתו: פיר פברה מדיקומטו, בולון, צרפת.
- נערך בנובמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מס' רשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 - נבלין 20 מ"ג: 13090.30910
 - נבלין 30 מ"ג: 13091.30911

לשם הפניות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

11.11.21

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואין מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעבר, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיזוז על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות היקשר "דיזוז על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לתופע המוקן לדיזוז על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדוח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה:
www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מניע הרעללה! התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויהם ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אין לגרום להתקאה ללא הוראה ואפשרות ארוכת נשימה וניפוי חותם.

מערכת המין-שתן
יות להופיע ביותר
וצר נשימה וניפוי חותם

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התטוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.
 - אחסן במקדר (2°C-8°C).
 - אין לאחסן תרופות שונות באומה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Macrogol 400; Gelatine; Glycerol 85%; Purified water; Anidrisorb 85/70 (sorbitol, 1,4-sorbitan, superior polyols, mannitol); Ethanol anhydrous; Glycerol; Titanium dioxide E171; Yellow iron oxide E172; Medium chain triglycerides Phosal 53 MCT (phosphatidylcholine concentrate); Edible printing ink: E120, hypromellose, propylene glycol.

 - כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
בגבין 20 מ"ג: קפסוליה בצבע חום בהיר, המכילה גולץ צהוב בהיר עד כתום-צהוב, עליה מדפס N20.N.
 - ידועה: כווניות כתזאה מייצור, וუשיה להתבטא כ, התכונות שרירים
שהלא תואמת של
 - שדווחו בשימוש
 - א התרוקנות במשר
 - בטא בהילכה בלתי
ריגילות נאים בלתי ריגילות

- שמי בתוכחות הטעם
- דלקת בגרון ובוושט
- קושי בבליעת מזון או נחלים
- תגבות בעור
- כאב במפרקים
- כאב בלסת
- כאב שרירים
- כאב בחולק גוף שונים נאזרור הגוף
- צמרמותה
- עלייה במשקל
- לחץ דם גבוה
- תוצאות לא מקינות של בדיקות דם
- קושי במתן שתן וסימפטומים נוספים
- תופעות לוואי שאין שכיחות
- מטמורפוז אל מטה מוגברת העצבים:
- אי ספיקת לב שעשויה להתבצע
- לבכרים, שהופכת אותו לחשוף לב זרימות דם בלתי מספקת; רום למוות).
- קוץ נשימה, פירחה מופשטת
- ייימס, הפנים, השפתיים או האגן.

(י'ז)

- בקורסולים, דפיקות לב בלתי רגילה, חוסר שליטה על שרירים עשו רגילה, שינויים בדברו ותנוחה (אטקסיה)
 - משפיעות על מערכת העיכול: עצירות חמורה המלווה בכאב ומספר ימים (חסימת מעיים)
 - הרשימה מטה מפורטת תופעות נבבלבי קפסולות, שכיחותן:
 - ירידה בכמות הנתרן בدم על יתר של הורמן הגורם לצבירת בתסמינים כגון חולשה, עייפות ותרדמת (SIADH) – תסמנות הורמן ADH (ADH)
 - זהום מערכת אלה-דם) מתבטא גבואה והידדרות כלילית במצב הגוף ומערכות העיכול
 - התקף לב (אוטם שריר הלב)

עת השירים
יעילותה להגבר סיכון לדימויים
עתים שניי בתוחשת המגע
ונה
ונם העולוה לגורם לחיזור,

- ocab עד בחזה שאין הפרעה בתפקידו המתקף לב (לעיטם ותסמנים של אלגיות בכל הגוף, התנפחות
- תופעות לוואי שכיחות** מטפורל אחד מתור ערך דלקות • הפרעות עיכול • שלשלול • עצירות • כאב בטן • בחילה • הקאות • ירידה בספירת תא כתפיים יותר לחזויום
- אם הקאת בתוך מספר שעות מלוקחת התרופה, צור קשר עם הרופא שלו; אין להזור על מנת אותהמנה.
- אם נטלת בטיעות מינון גבוה יותר מאשר מידיית לרופא. הרופא שלجلבי ממה שהרופא רשם, יש לפנות צמוד אחר מיןן הנבלביי הנitin לך, אז גם גם אמם קיבלה את המיןן הנכוון של הכימותרפיה, הוגו עדין עלול להציג עמו תסמנים חמוריים. חלק מהתסמנים שעולים להתקפה הינם תסמנים של זיהום (כגון חום, צמרמותות, שיעול, כאבי מפרקים). עלולה להתקפה גם עצירות חמורה. אם מופיעים תסמנים חמוריים אלו, יש לפנות לרופא מיד.
- אם שכחת ליטול את התרופה אין לךות מהנה כפולה על מנת לפחות על המנה שששכחת. יש לפנות לרופא שלך שיקבע זמן חדש לפחות המנה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
- אם אתה מספיק את נטילת התרופה בפעם הראשונה רק מעתה,

571

- יידה בספרית תא לחולשה או לקוצר נשואות
 - יידה בספרית טסיות או לחבלות
 - יידה ברפלקסים מושפעת
 - דלקת בפה
 - נשירת שיער, בדרכו כחישות מוחלה
 - חום
 - ירידת משקל, אובדן תופעות לוואי שכיחותן אחד מתר עשרה מטנו קשיים בקואורדינציה ו-
 - שניים בראיה
 - קוצר נשמה, שיעול קשיי נשמה
 - קארטראש
 - סחרחות חמורה או סחרחות בעת קימה.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בנבלני עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך כלל.

יש לפנות לרופא מכך אם הנrk חש באחד מהתסמינים הבאים בזמן הטיפול בנבלני:

 - תסמים המעדימים על זיהום חמוץ כגון שעול, חום וצמרות.
 - עצירות חמורה המלווה בככאב בטן, ללא התרוקנות במשך ימים.
 - סחרחות חמורה או סחרחות בעת קימה.

חופה? פיקוח רפואי של רופא מוסמך שהקפסולה לא יזוקה, שכן הנוזל שבתוכה הקליל פותחת הביליסטר (מגשית) המכיל את נבליבן לפניה. דרכּ מתן התרופת נטילת נבליבן עם אורוחה קלה עשויה להקל על תבחילה. קתנה זו לא תהיה השפעה קטנית על הגוף. אם הרופא שאלך כי הנזק סובל מים, היועץ ברופא לפני ניטילת נבליבן עלולה לגרום להקה: ראה סעיף 4 "טוניאו". אם אתה מוטל תרופה נגד הקאה/בloating. אם הרופא שאלך רשם לך תרופה נגד הקאה/bloating. נבליבן מוגברת על ידי רופא מומלץ לא לטעון או לטעות לוואו". לפיכך, מומלץ לא בו או אם הרופא שאלך עץ לר Marsh הטיפול נבליבן על ידי רופא.

such as

- גורם לאירועי וולע לגארום למקם בגמאן עם העור, הענין הריריות. אם נצטר מגע, שטוף את האזoor הנגע מוויסcidות עם מים.

אין לבלווע קפסוללה שניזוקה: יש להחזירה לרופא בית המركחת.

הוראות לפיתוח אריזת הבליסטר (מגשית):

 1. יש לאזרז את הבליסטר בעדרת מספריים לאו דווקא הסימון (קו שבר שחורה).
 2. יש לקלף את ציסוי הפלסטיκ הרך.
 3. יש לדחוף את הקפסוללה דרך רדייד האלומניום.

אופן השימוש בתרופה

 - יש לבלווע את הקפסוללה בשלמהה עם מים, רצוי את התרופה עם ארוחה קלה. אין לשותות משקאות עם התרופה, כי הוא עלול לגרום להמסה מהירה מהקפסוללה.
 - אין ללעוג או למצוץ את הקפסוללה.
 - אם לעסת או מצצת את הקפסוללה בטעות, יש לשטוף מהנה של גוףן בבלבליין.

כבע על ידי הרופא בלבד. לפני הרופא יבדוק את ספירת תא גומיות תקבל את הטיפול ואיזה יזרעה לך כמה קפסולות ובאיזה שבוע. מינון זה יקבע בהתאם נימנים של גוףך במטר רביע (מ"ר).

ת ללקחת במנון אחת ותחושב של שטח הפנים של גוףך עברו הטיטיפול. לאחר המנה השילישית את המינון וליחסב את המנה לפי שטח הפנים של גופך. בכל מקרה,

טבאלטן אט' 160 מ"ג. ושביראשו.

ו נהייה ושימוש לא סביר כי הטיפוח להפעיל מכונן, או עלולות להשפיע על פירוט ראה עגייף להנוגה אם הנך חש להימנע מנהיגת.

ו מידע חשוב על התורופה המכילה כמותם מ-100 מ"ג למנה לעיל.

3. כיצד תשתמש בגלבן לצריכה להינו לשחות משקה חם עם התורופה, כי הוא קפסולה בשלמותה עם מים. אין עלועות אליו. מומלץ ליתול את התורופה ביחיד לשחות משקה חם עם התורופה, כי הוא הסה מהירה מדי של הקפסולות.

טופוריות

ול להחמיר תופעות לוואי מסוימות. במיחוד או הרוקח אם אתה לוקחת:

ו אבפלפסיה מיזוחם פטריטית כגון איטראקונזול וקטוקונזול בסורטן בשם מיטומיצין C ההיחסון כגון צ'קלוספורין וטאקוריימוס מחיסון מוחלש ח) לא מומלצים במהלך ע את הרופא שלך אם אתה נדרש לקבל

טיפה ומזרן קפסולות בשלהי תקופת הריון. מומלץ ליתול את התורופה ביחיד עם לולאה.

Digitized by srujanika@gmail.com

- המנוסה בטיפול במחלת התהופה מיועדת לנשא לאו ברוקח לפני נטילת תרופה. יש להשתמש תמיד בבדיקה עם הרופא ואופן הטיפול בתרכז המינון ואופן הטיפול המשך הטיפול בנסיבות הדם שלן, על מנת מילון מתאים לר' החזק לצטריך ללחוק ולמסקל גוף ולבוגר רופאර יחשב את שיעור המנה השבועית הדרישתית לפיק 60 מ"ג למטר מ-3 המנות הראשונות רופאאר יחליט אם להליכן 80 מ"ג למטר רביעי יתכן לרופאאר ישנה אש טריבוריאל ואנו כהן מחושלים בברלבי לערוך גישות במחלקה אם היין בהריון או שאת חושבת כי הינה חייבות להתחילה את הטיפול בנבלון והינן רורה של כניסה להריון בתקופת הטיפול בסיסקי' ליטול את התהופה. יש לפנות מידתו על סיכונים אפשריים לעובר.

אם היין מניקה. יש להפסיק את ההנקה תרופה נבלוני.

כיוון וגברים צרכים להשתמש באמצעות מניעת הריון) בתקופת הטיפול בנבלון מנטלית הקפסוליה האחורה. על גברים לבני התהייעץ בנושא שימור העזר לפמי כיוון שלנבלון עלולה להיות השפעה על חתך

- ספירת תא הדם הלבנים (לויוקוציטים, נטרופילים) הינה נמוכה, או במקורה של זיהום חמור קרים או שארע עד שבעים לפni מועד לקיחת התהופה.
- ספירת טסיות הדם נמוכה (תרכומבוציטופניה).
- קיבלת לאחרונה או שכוכונת לקבול חיסון כנגד Yellow Fever.
- תרופה לאתה דקוק לטיפול ארוך טווח בחמצן.
- בכל מקרה של ספק, היועץ ברופא או ברוקח.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתהופה

לפni הטיפול בתהופה, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מהתקף לב או מכדים עזים בחזה.
- יכולת לבצע פעילויות יומיומיות פחתה מאוד.
- יש לך בעיות בכבד או עברת הקرونות (דייתורפייה) כאשר אזרח הטיפול כלל את הכבד.
- הרופא אמר לך כי הנrk סובל מאי סבלות לסוכרים מסוימים; כי היועץ ברופא לפni נטילת התהופה.

רופא ולש

- הנק מגלה סימנים של זיהום (כגון חום, צמרמות, כאב מפרקים, שיעול).
 - אתה נטול או נטلت לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם.
 - בគונטר קיבל חיסון או קיבלת חיסון לאחרונה.

■ ילדים ותתבגרים

 - הקסולות אין מומלצות לטיפול ילדים ובתתבגרים מהתח לגיל 18 שנים, מאחר שלא הוכיחו עיליות ובתיוחת השימוש בתרופה בגילאים אלה.

■ בדיקות ומעקב

 - יש לעורך בדיקות דם לפני ובמהלך תקופת הטיפול בתרופה זו, על מנת לוודא שאתה יכול ליטול את התרופה.
 - אם תוצאות בדיקות הדם אין תקין, ניתן שהטיפול יידח ויהיה צריך בביוזם בדיקות נוספות עד שתוצאות בדיקות הדם שלך יראו עריכים תקין.

■ אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות

 - אם אתה לוקחת, או אם לך תרופה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או