

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

دورزاتول-أفنيبر محلول قطرات عيون

المواد الفعّالة:

يحتوي كل ملل على:

دورزولاميد (هيدروكلوريد) 20 ملغ/ملل

تيمولول (ماليات) 5 ملغ/ملل

Dorzolamide (as hydrochloride) 20mg/ml

Timolol (as maleate) 5mg/ml

لقائمة المواد غير الفعّالة، انظر البند 6.1 ما هي محتويات الدواء.
انظر أيضا البند 2.6، "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل الطبيب أو الصيدلي خاصتك.
- وُصِف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الطبية وحالتهم.
- هذا الدواء ليس معدًا للاستعمال لدى الأطفال والرضع.

1. لِمَ أُعِدَّ هَذَا الدَّوَاءُ؟

يُستعمل الدواء لخفض الضغط المرتفع في العين وعلاج الزرق.

المجموعة العلاجية: يحتوي دورزاتول-أفنيبر على مركبين فعالين: دورزولاميد الذي ينتمي إلى مجموعة أدوية تدعى "مثبطات إنزيم أنهيدراز الكربونيك". ينتمي تيمولول إلى مجموعة أدوية تدعى "محصرات بيتا". تخفض هذه الأدوية الضغط داخل العين بطرق مختلفة.

2. قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ:

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لدورزولاميد هيدروكلوريد، تيمولول ماليات أو لأي من مركبات هذا الدواء الأخرى (لقائمة المواد غير الفعّالة، انظر البند 6.1).
- كانت لديك حاليًا أو في الماضي مشاكل في التنفس، مثل الربو أو التهاب القصبات الهوائية الانسدادي المزمن والخطير، COPD (مرض رئوي خطير قد يسبب صفيراء، صعوبات في التنفس و/أو سعالًا متواصلًا).
- كنت تعاني من نبض بطيء، قصور عمل القلب أو مشاكل في وتيرة نظم القلب (نبض غير منتظم).
- كنت تعاني من مرض كلوي خطير أو مشاكل في الكلى أو ماضٍ من الحصى في الكلى.
- كنت تعاني من فرط الحامضية في الدم الناتج عن تراكم الكلوريد في الدم (حمض ناجم عن فرط كلوريد الدم).

إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان يمكنك استعمال هذا الدواء، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- قبل بدء العلاج بالدواء أخبر طبيبك إذا كانت لديك أية مشاكل صحية أو مشاكل في العيون سواء حاليًا أو في الماضي:
- مرض قلبي تاجي (قد تشمل الأعراض ألمًا أو ضغطًا في الصدر، ضيق التنفس أو اختناقًا)، قصور عمل القلب، وضغط الدم المنخفض.
 - اضطرابات في وتيرة نظم القلب مثل النبض البطيء.
 - خلل في أداء جهاز التنفس مثل المرض الرئوي الانسدادي المزمن الطفيف حتى المعتدل.
 - مرض تدفق الدم الضعيف (مثل مرض رينو (Raynaud's) أو متلازمة رينو (Raynaud's)).
 - السكري، لأن تيمولول قد يحجب علامات وأعراض مستويات السكر المنخفضة في الدم.
 - فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) لأن تيمولول قد يحجب العلامات والأعراض.

- عليك استشارة الطبيب في حال كنت تعاني حاليا أو عانيت في الماضي من أية مشاكل في أداء الكبد.

أخبر الطبيب بأنك تستعمل الدواء قبل أن تحتاز عملية جراحية لأن تيمولول قد يغيّر تأثير بعض الأدوية المستعملة خلال التخدير.

إضافة إلى ذلك، أخبر الطبيب بأية حالات حساسية أو ردود فعل تحسسية، بما في ذلك الشرى (Hives)، تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة، التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو الابتلاع.

أخبر طبيبك إذا كان لديك ضعف العضلات أو إذا شُخص لديك مرض الوهن العضلي الوبيل الذي يتجسد، من بين أمور أخرى، في ضعف العضلات الخطير.

إذا تطور لديك أي تهيج في العين أو مشاكل جديدة في العين، مثل احمرار في العين أو تورم الجفنين، توجه إلى طبيبك فوراً.

إذا كان لديك شك في أن الدواء يسبب رد فعل تحسسي أو حساسية مفرطة (مثلاً: طفح جلدي، رد فعل جلدي خطير أو احمرار وتهيج في العين)، توقف عن استعمال هذا الدواء وتوجه إلى طبيبك فوراً.

أخبر طبيبك إذا تطورت لديك عدوى في العين، جرح في العين، إذا كنت مقدماً على عملية جراحية في العين، أو إذا تطور لديك رد فعل يشتمل على أعراض جديدة أو تفاقم أعراض قائمة.

عند تقطير الدواء في العين قد يؤثر في كل الجسم.

إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة لينة، عليك استشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء (انظر أيضا البند 2.6 "معلومات مهمة عن قسم من

مركبات الدواء"). يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال هذا الدواء. يمكن استعمالها مجدداً بعد 15 دقيقة من استعمال قطرات العين.

2.3 تناول أدوية أخرى

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

قد يؤثر دورزاتول-أفثير في أدوية أخرى تستعملها، أو قد يتأثر بها، بما في ذلك قطرات عيون أخرى لعلاج الزرق. أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل أو تخطط لاستعمال أدوية لخفض ضغط الدم، أدوية للقلب أو أدوية لعلاج السكري. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعمل،

استعملت مؤخراً أو قد تستعمل أية أدوية أخرى. هذا الأمر هام بشكل خاص إذا كنت:

- تتناول أدوية لخفض ضغط الدم أو علاج مرض القلب (مثل محصرات قنوات الكالسيوم، محصرات بيتا أو ديجوكسين).
- تتناول أدوية لعلاج اضطرابات النبض أو النبض غير المنتظم (مثل محصرات قنوات الكالسيوم، محصرات بيتا أو ديجوكسين).
- كنت تستعمل قطرات عيون أخرى تحتوي على محصرات بيتا.
- تتناول مثبط أنهيدراز الكربونيك مثل أسيتازولاميد.
- تتناول مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs) (يُستعمل بعضها لعلاج الاكتئاب).
- تتناول دواء محاكي اللاودي الذي قد وُصف لك لمساعدتك على التبول.
- أدوية محاكية اللاودي هي أيضاً نوع معين من دواء يُستعمل أحياناً لتنظيم الحركة السليمة للأمعاء.
- تتناول أدوية مخدرة مثل مورفين، تُستعمل لعلاج الألم المعتدل حتى الخطير.
- تتناول أدوية لعلاج السكري.
- تتناول مضادات الاكتئاب المعروفة أيضاً بفلوأكسيتين وباروكسيتين.
- تتناول أدوية من نوع سولفا.
- تتناول كينيدين (يُستعمل لعلاج بعض حالات القلب وبعض أنواع الملاريا).
- تتناول أدوية تسبب انخفاض مستويات الكاتيكولامينات (مثل ريسيريدين).
- تتناول كلونيدين.
- تتناول أيبينفرين بالحقن.

2.4 الحمل والإرضاع

- عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الاستعمال أثناء الحمل

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنتِ حاملاً، إلا إذا كان طبيبك يعتقد أن ذلك ضروري.

الاستعمال أثناء الإرضاع

لا يجوز استعمال دورزاتول-أفثير إذا كنتِ مرضعة قبل أن تستشير طبيبك. قد ينتقل تيمولول إلى حليبك. استشير طبيبك قبل استعمال أي دواء خلال الرضاعة.

2.5 السياقة واستعمال الماكينات

لم تُجرَ أبحاث حول تأثيرات القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات. هناك أعراض جانبية مرتبطة بدورزاتول-أفثير، مثل ضبابية الرؤية، التي قد تؤثر في قدرتك على السياقة و/أو تشغيل الماكينات. لا يجوز لك السياقة أو تشغيل الماكينات حتى تشعر جيدا أو تصبح رؤيتك واضحة.

2.6 معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي دورزاتول-أفثير على كلوريد البنزوكونيوم.

إذا كنت تستعمل عدسات لاصقة لينة، عليك استشارة طبيبك قبل استعمال دورزاتول-أفثير (قد تسبب المادة الحافظة كلوريد البنزوكونيوم تغييرا في لون العدسات اللاصقة) (انظر أيضا البند 6.1، "ماذا يحتوي دورزاتول-أفثير؟").

2.7 الاستعمال لدى الأطفال

هناك تجربة محدودة حول استعمال الدواء لدى الرضع والأطفال. هذا الدواء ليس معدا للاستعمال لدى الرضع والأطفال.

2.8 الاستعمال لدى المسنين

في أبحاث على هذا الدواء، كانت تأثيرات الدواء مشابهة لدى المتعالجين المسنين والمتعالجين الأصغر سنا.

2.9 الاستعمال لدى المتعالجين الذين لديهم خلل في الكبد

أخبر طبيبك في حال كنت تعاني حاليا أو عانيت في الماضي من أية مشكلة في أداء الكبد.

3. كيف تستعمل دورزاتول-أفثير؟

يجب استعمال المستحضر دائما حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يُحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي: قطرة واحدة في العين المعالجة (العيون الخاضعة للعلاج) صباحا ومساء. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. يُمنع الابتلاع! هذا الدواء مُعد للاستعمال الخارجي فقط.

إذا كنت تستعمل هذا الدواء بالدمج مع قطرات عيون إضافية، عليك تقطير القطرات بفارق 10 دقائق على الأقل. يُمنع تغيير جرعة الدواء من دون استشارة طبيبك.

لا يجوز السماح لطرف القنينة بأن يلامس العين أو المناطق المجاورة لها. فهو قد يتلوث بالجراثيم التي قد تسبب عداوى في العين من شأنها أن تؤدي إلى ضرر خطير في العين، حتى فقدان الرؤية. لتجنب تلوث محتمل في القنينة، يجب غسل اليدين قبل تناول هذا الدواء والحفاظ على طرف القنينة بعيدا عن أي سطح. إذا كنت تعتقد أن دواءك قد يكون ملوثا، أو إذا تطورت لديك عدوى في العين، اتصل بطبيبك فورا بشأن متابعة استعمال هذه القنينة.

تعليمات الاستعمال:

اغسل يديك دائما قبل تقطير القطرات.

1. لفتح القنينة أدر السدادة وانزعها.

2. أميل رأسك نحو الخلف وانظر إلى السقف.

3. اسحب بلطف الجفن السفلي نحو الأسفل حتى يتشكل ما يشبه الجيب بين جفنتك وعينك.

4. اقلب القنينة واضغط قليلا عليها حتى تدخل قطرة واحدة في العين وفق تعليمات الطبيب.

5. أغلق عينك واضغط بإصبعك على الزاوية الداخلية من العين (الجهة القريبة من الأنف) لمدة دقيقتين. تساعد هذه الخطوة على منع دخول القطرة باتجاه القناة الدمعية ومن ثم إلى سائر الجسم.
6. كرر المرحلتين 3 و 4، وذلك في حال أوصى لك الطبيب باستخدام القطرات في العين الثانية أيضا.
7. لمنع حدوث عدوى، احرص على ألا يلامس طرف القنينة أي مسطح، بما في ذلك الإصبع والعين.
8. أعد السدادة إلى القنينة عبر إدارتها وتثبيتها بعد الاستعمال فوراً.

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ

إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، إذا وضعت كمية أكبر من اللزوم من القطرات في العين أو إذا ابتعلت من محتوى القنينة، من بين التأثيرات الأخرى، قد تشعر بدوار، صعوبة في التنفس، أو بوتيرة نظم قلب بطيئة. اتصل بطبيبك فوراً. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى فوراً، مصطحباً عبوة الدواء معك.

إذا نسيت استعمال الدواء

من المهم أن تتناول هذا الدواء وفق ما وصفه لك طبيبك. إذا تخطيت جرعة، أكملها في أسرع وقت ممكن. إذا أن الأوان تقريبا لتناول الجرعة التالية، تخطّ الجرعة المنسية وعود إلى جدول مواعيد تناول الدواء الاعتيادي. لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية. عليك إكمال العلاج وفق ما وصفه لك الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة طبيبك.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

إذا كنت ترغب في التوقف عن استعمال هذا الدواء، تحدث مع طبيبك أولاً.

كيف تساهم في نجاح العلاج؟

1. لتجنب الإصابة بعدوى، احرص على ألا تلامس فوهة القنينة أي مسطح (بما في ذلك العين ذاتها). احرص على إغلاق القنينة جيداً.
2. قد لا تكون قنينة القطرة ملبنة تماماً؛ تهدف هذه الخطوة إلى السيطرة بشكل أفضل على وتيرة التقطير.
3. كيف تستعمل قطرات العيون: انظر البند "تعليمات الاستعمال".
4. بعد استعمال الدواء، اشطف يديك جيّداً لتنظيفهما من بقايا الدواء.
5. لتجنب نشر العدوى، لا يجوز استعمال قنينة الدواء ذاتها لأكثر من شخص واحد.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية متعلقة باستعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاصين بك.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال دورزاتول-أقنير أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها، ولكن إذا لم تزل الأعراض الجانبية أو إذا كانت تثير قلقاً، أو إذا تفاقت، عليك استشارة الطبيب.

توقف عن تناول الدواء وتوجه لتلقي مساعدة طبية فوراً إذا تطور لديك أي من العلامات التالية:

ردود فعل تحسسية عامة، بما في ذلك تورم تحت الجلد الذي قد يحدث في مناطق مثل الوجه والأطراف، وقد يؤدي إلى انسداد المسالك

التنفسية وصعوبة في الابتلاع أو التنفس، شرى (Hives) أو طفح حاك، طفح موضعي أو منتشر، حكة، رد فعل تحسسي مفاجئ وخطير يشكل خطرا على الحياة.

يتم تحديد شيوخ الأعراض الجانبية المحتملة المفصلة أدناه وفق استعمال المعايير التالية:

شائعة جدا (تؤثر في أكثر من مستعمل واحد من بين 10)

شائعة (تؤثر في 1 حتى 10 مستعملين من بين 100)

ليست شائعة (تؤثر في 1 حتى 10 مستعملين من بين 1,000)

نادرة (تؤثر في 1 حتى 10 مستعملين من بين 10,000)

غير معروفة (لا يمكن تقييم وتيرة الشيوخ استنادا إلى المعلومات المتوفرة)

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية فيما يتعلق بالدواء أو بمكوناته خلال أبحاث سريرية أو خلال الاستعمال بعد التسويق:

أعراض جانبية شائعة جدا:

حرقة ولسع في العيون، اضطرابات في حاسة التذوق.

أعراض جانبية شائعة:

احمرار العين (العيون) وحولها، دمع أو حكة في العين (العيون)، تآكل القرنية (ضرر في الطبقة الأمامية من مقلة العين)، تورم و/أو تهيج العين (العيون) وحولها، شعور بجسم غريب في العين، نقص الحساسية في القرنية (عدم الانتباه عند دخول جسم غريب إلى العين وعدم الشعور بالألم)، ألم في العين، جفاف العيون، ضبابية في الرؤية، صداع، التهاب الجيوب الأنفية (شعور بشد أو امتلاء الأنف)، غثيان، ضعف/تعب وإنهاك.

أعراض جانبية ليست شائعة:

دوخة، اكتئاب، التهاب القرنية، اضطرابات في الرؤية بما في ذلك تغييرات مرتبطة بكسر أشعة الضوء (في بعض الحالات، بسبب توقف العلاج المقبض للحدقة، الذي يؤدي إلى تقلص بؤبؤ العين)، نبض بطيء، إغماء، صعوبة في التنفس (dyspnea)، اضطراب في المعدة، وحصى في الكلى (يتجسد في أحيان قريبة بالألم شديد مفاجئ من التشنجات في أسفل الظهر و/أو جانب الجسم، الأربية أو منطقة البطن).

أعراض جانبية نادرة:

ذئبة حمامية جهازية (مرض مناعي يمكن أن يسبب التهاب الأعضاء الداخلية)، لسع، أو شعور بالتميل في اليدين أو راحتي القدمين، أرق، كوابيس، فقدان الذاكرة، ارتفاع علامات وأعراض الوهن العضلي الوبيل (ضعف العضلات الحاد)، انخفاض الرغبة الجنسية، سكتة دماغية، قصر النظر المؤقت الذي قد يزول بعد إيقاف العلاج، انفصال الطبقة أسفل الشبكية التي تحتوي على أوعية دموية نتيجة عملية قطع التريبيق الذي قد يسبب اضطرابات في الرؤية، هبوط الجفون (الذي يجعل العين مغلقة جزئيا)، رؤية مزدوجة، غشاء يغطي الجفن، تورم القرنية (مع أعراض اضطرابات في الرؤية)، ضغط منخفض داخل العين، طنين في الأذنين، ضغط دم منخفض، تغييرات في وتيرة أو سرعة النبض، قصور عمل القلب (مرض قلب مصحوب بضيق التنفس وتورم راحتي القدمين والساقين نتيجة تراكم السوائل)، وذمة (احتباس السوائل)، نقص الدم في الدماغ (انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ)، آلام في الصدر، خفقان (تسرع ضربات القلب و/أو ضربات قلب غير منتظمة)، نوبة قلبية، متلازمة رينو (Raynaud's)، تورم أو برد في اليدين وراحتي القدمين وانخفاض تدفق الدم إلى الذراعين والساقين، تشنج الساقين و/أو ألم في الساق أثناء المشي (عرج)، ضيق في التنفس، خلل في أداء الرئتين (شعور بالاختناق)، سيلان الأنف أو انسداد الأنف، نزيف من الأنف، تشنج المسالك التنفسية في الرئتين ما يسبب صعوبات في التنفس، سعال، تهيج الحنجرة، جفاف الفم، إسهال، التهاب الجلد التماسي، تساقط الشعر، طفح جلدي بلون أبيض فضي (طفح شبيه بالصدفية)، انحناء القضيب (الذي قد يسبب التواء القضيب)، ردود فعل تحسسية مثل الطفح، الشرى (Hives)، الحكة، وفي حالات نادرة قد يحدث تورم الشفتين، العينين والفم، صغير أو ردود فعل جلدية خطيرة (متلازمة ستيفنس جونسون، تقشر الأنسجة المتوترة البشرية التسممي (Toxic epidermal necrolysis)).

كما هي الحال مع الأدوية الأخرى المستعملة في العيون، يتم امتصاص تيمولول في الدم. قد يؤدي هذا إلى أعراض جانبية شبيهة بتلك التي تحدث عند استعمال محصرات بيتا القموية.

إن وتيرة شيوخ الأعراض الجانبية بعد الاستعمال الموضعي في العيون منخفضة أكثر مثلا من وتيرتها عند استعمال أدوية معدة للتناول الفموي أو الحقن.

تشتمل الأعراض الجانبية الأخرى المسجلة على ردود فعل تحدث عند إعطاء أدوية من مجموعة محصرات بيتا، وعند استعمالها لعلاج مشاكل في العيون.

أعراض جانبية ذات شيوخ غير معروف:

مستويات منخفضة من السكر في الدم، قصور عمل القلب، نوع من اضطراب في وتيرة نظم القلب، ألم في البطن، تقيؤ، آلام في العضلات لم تحدث بسبب ممارسة نشاط جسماني، مشاكل في الأداء الجنسي، هلوسة، شعور بجسم غريب في العين.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيبك.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزّن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم الذي قد يشكل خطرا على الحياة. انظر البندين "تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدّواء" و "إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى".

لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.date) الظاهر على عبوة الكرتون والملصق.

تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.

بعد فتح العبوة يمكن استعمال الدواء طوال 28 يوما.

• شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25°C.

يجب التخزين في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء.

6. معلومات إضافية

6.1 بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا على –

Mannitol, hydroxy ethyl cellulose, sodium citrate dihydrate, benzalkonium chloride, hydrochloric acid and/or sodium hydroxide, water for injection.

6.2 كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

دورزاتول-أفثير هو محلول صاف وعديم اللون في قنينة تحتوي على 5 ملل وفي طرفها قطارة.

صاحب التسجيل والمستورد:

بيوأفثير م.ض.

شارع الملك داود 1، هرتسليا بيتواح 4666101

المنتج:

توبيلوكس فارما، S.p.A.

بوميتسيا، إيطاليا

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 155-93-34413-00.

تم تحريرها في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.